

鸟

全世界800多种鸟的 彩色图鉴



鸳鸯



红喉鹦雀



布布克鹰鸮



灰猫嘲鸫



白头海雕



北美金翅



折衷鹦鹉



色彩鸮



歌鸫

自然珍藏



图鉴丛书

鸟

全世界800多种鸟的
彩色图鉴



鸳鸯



红喉刺雀



布布克鸱



红翼黑鹂



北美金翅



白头海雕



红帽刺舌



蓝色刺舌



歌鸫

中国友谊出版公司



鸟



自然生态。每册都有栩栩如生的彩色照片和文字简洁、内容丰富的描述，装帧精美，使用方便，就像包罗万象的自然博物馆，是读者学习、了解各类动物、植物、矿物，以及天文、地理知识的理想读物。



ISBN 7-5057-1391-4



9 787505 713918

ISBN 7-5057-1391-4

S·6 定价：63.00元

自然珍藏图鉴丛书

鸟



中国友谊出版公司

自然珍藏图鉴丛书
PDG



自然珍藏图鉴丛书

鸟

科林·哈里森
艾伦·格林史密斯 著



中国友谊出版公司

自然珍藏图鉴丛书

PDG



A DORLING KINDERSLEY BOOK

Copyright ©1993 Dorling Kindersley Limited, London

Chinese Translation © 1996 Owl Publishing House

Original title: Eyewitness Handbooks-Birds of the World

装帧设计: 王少羽

技术编辑: 杨学梅

责任编辑: 杨学梅、张 纯

(京)新登字 191 号

图书在版编目(CIP)数据

鸟/(英)哈里森(Harrison, C.), 格林史密斯(Greensmith, A.)著; 猫头鹰出版社译. —北京: 中国友谊出版公司, 1998.5

ISBN 7-5057-1391-4

I. 鸟… II. ①哈… ②格… ③猫… III. 鸟类—普及读物
IV. Q959.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 19334 号

书名 鸟——自然珍藏图鉴丛书

作者 (英)科林·哈里森、艾伦·格林史密斯

出版 中国友谊出版公司

发行 中国友谊出版公司

经销 各地新华书店

印刷 东莞新丰印刷有限公司

排版 广州市公元传播有限公司

规格 889×1194 毫米 32 开本 12.875 印张 286 千字

版次 1998 年 8 月第 1 版 1998 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—7000 册

书号 ISBN 7-5057-1391-4/S·6

定价 128.00 元

地址 北京市朝阳区西坝河南里 17 号楼

邮编 100028 **电话** (010)64668676

合同登记号 图字 01-97-0110

版权所有, 侵权必究

目 录

引言 · 6

如何使用本书 · 8

鸟类的身体结构 · 10

同种鸟类间的差异 · 12

在花园中赏鸟 · 14

到野外赏鸟 · 15

鸟类的飞行姿态 · 16

辨别关键 · 18

非雀形目 · 38

雀形目 · 244

名词解释 · 396

中名笔画索引 · 404



引言

人类为了模仿鸟类飞行，曾付出了极大的努力，也设计出许多便利而实用的航空工具；鸟类的形象不仅出现在艺术作品中，也出现在硬币和钞票的图案设计上；家禽业一直是重要的社会经济活动，而养鸟、赏鸟和驯鹰等活动，更为人们的生活增添了许多乐趣。

人类所使用的航空工具和鸟类的身体结构有许许多多相似之处，以下图的超音速飞机和黑腰朱鹭为例，二者

的外形都是流线型的，因此能够减少飞行中的空气阻力，即使是低速飞行时，在宽大的翼辅助下也能保持平稳。



动力与技术

飞机的动力、速度和飞行距离都远远超过鸟类，但是鸟类有许多与生俱来的技巧，例如无须助跑就能起飞和着陆，这是飞机无法比拟的。

头盔上的羽饰

以鸵鸟的羽毛装饰骑兵头盔

盔的灵感，来自于王霸

鹑(下图)鲜艳醒目的冠羽，不同的只是王霸鹑的冠羽向一侧倾斜，而不像头盔是向前后开展。

鹅毛笔

早期的人类把大羽毛(通常为鹅毛)中央羽翎的基部剪尖撕开，做成笔尖，利用中空的羽毛管作为储存墨水的笔管，这种鸟羽做成的鹅毛笔是中古世纪重要的书写工具之一(右图)。

削尖的羽毛



权力和财富的象征



第一次世界大战时的德国军徽



美国的功勋奖章和十字勋章



美军帽徽上的老鹰图案



美国国会最高荣誉勋章



面值 500 元的新加坡纸钞上有金黄鸮的图案



面值 1 元的加拿大硬币上有潜鸭的图案



面值 20 元的新西兰纸钞上有新西兰鸮的图案

狩猎鸟、食用鸟和玩赏鸟

鸟类具有飞翔能力，在地球上几乎随处可见，鸟类与人类关系密切，对人类社会有重要的作用。早期的人们以鸟蛋为食物，用鸟骨制作骨针和各种工具，把鸟羽绑在箭杆上调整箭的方向；狩猎鸟（见 108 ~ 117 页）的肉质极为可口，野鸡（见 114 页）是其中最早被驯化饲养成食用鸟的一种，也就是遍布世界的家鸡始祖。在近代，野火鸡（见 108 页）和鹌珠鸡也被驯化了；此外，近代的养殖者利用灰雁驯化而来的家鹅、绿头鸭（见 79 页）驯化而来的鸭类培育出数千种食用鸭和食用鹅，以及具有高经济价值的禽类，利用鸟羽制作扇子及书写用的鹅毛笔，鸭绒制作保暖舒适的羽毛被和羽毛衣，鸟粪可以作肥料；孔雀是最热门的庭园观赏鸟，它的羽毛也因具有装饰价值而倍受人们青睐，鸽子受过训练后可以传递讯息，赛鸽则为人们提供了休闲的乐趣。但自 1680 年以来已有上百

种鸟灭绝，还有许多处于濒危状态，对鸟类的保护日益引起人们的关注。

猎鹰

猛禽很早就被人类驯服了，公元前的亚述王国已有猎鹰活动，中世纪的欧洲特权阶级以猎鹰术消遣，并作为权势的象征；17 世纪后猎鹰活动流行于欧美、中东各国，人们给猎鹰蒙上头罩，系上皮脚带，托在手臂上，经过训练的猎鹰释放后可以像猎犬一样追捕指定的猎物，游隼的适应力强，性格兼具温和凶猛，是最常用的狩猎鹰，此外猎隼、苍鹰、栗翅鹰和小灰背隼都是。



如何使用本书

本书的条目按照鸟类的族群分类，每个条目描述一个鸟种，描述的内容包括外形、栖息地、食性、巢和地理分布等识别特征。条目的顺序按照鸟类的系统分类地位来编排，首先分成雀形目和非雀形目，将同一目中同

科的鸟集中在一起，在每一科中，亲缘关系较近的种也会编排在一起。读者可以对照每一种鸟的栖息地和行为特征(见 18 ~ 37 页的基本类型图解)，也可以直接从索引中条目的学名和常用的俗名来查阅本图鉴。


羽饰图

除了在条目中有特别说明之外，图鉴中所采用的都是雄性成鸟的照片，彩色照片旁的附图，则是该鸟种特别的羽色，在 12 ~ 13 页有详细说明。



地理分布图

分布图上标示的是该鸟种全年或一年中某一段时间的分布范围，以及该鸟种在迁徙时所经过的地区，例如：紫崖燕在北美洲繁殖，然后又迁徙到巴西过冬；在图中分布范围西部的欧亚鸲是留鸟，而东部种群则会在冬季向西部和南部迁移；澳大利亚的丛冢雉一年四季生活在澳大利亚西南部，从不移动到其他地区。



体形大小与轮廓

书中的条目都附有鸟类侧影与本书大小的对比图，书本的侧影分成大小两个尺寸，鸟的身长超过 50 厘米时，就用书的小型侧影来对比；鸟类的身长是指鸟类在完全伸展的状态下，从嘴尖到尾羽末端的长度，书中皆以雄鸟的体形侧影为准。



最常用
的中、英
文名称

羽色：
说明雌鸟和
雄鸟的羽色
是否有差异

解说文：
内容描述鸟
的外形、栖
息地和食性

地理分布：
叙述该鸟种
的地理分布
范围和迁徙
路线


巢：
介绍巢的
结构、巢
材和位置

说明两性羽色相似与否

中文名

拉丁文学名

平均身长：若雌鸟和雄鸟身长不同，则雄鸟身长标示在前，雌鸟在后

科名 梅花雀科	学名 <i>Taeniopygia guttata</i>	身长 12厘米
斑胸草雀(Zebra Finch) 生活在靠近水源的半沙漠，胸和尾布满黑白的斑纹；以种子为食，常群集在一起发出短促具鼻音的鸣声，相当活跃。 · 巢 位于灌木或中空的树枝中，草编成的圆顶巢，侧面开口。 · 地理分布 印尼东部和澳洲。  地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙



黑白相间的尾羽

雌鸟

羽色图：
表明同种间的不同个体，与照片中所示个体的羽色差异

主要图案为彩色照片

体形大小与轮廓：鸟的体形与本书大小的对比

科名 梅花雀科

学名 *Taeniopygia bichenovii*

身长 10厘米

| **双斑草雀(Double-bar Finch)** 羽色灰褐，胸部有两条明显的黑色带纹，集小群于矮草丛或光秃的地面上觅食，在掩蔽物边取食小种子。 · 巢 以草编成，形似横置的瓶子，内衬细草，位于灌丛或草丛中。 · 地理分布 澳洲北部和东部。 地理分布图 | | |
| 羽色 雌雄相似 | 栖所 | 迁徙 不迁徙 |


双翼具斑点

脸部围着一团黑羽


彩色照片中显示出主要的识别特征

地理分布图：从图中可以看出红喉鹦雀的分布区

科名 梅花雀科

学名 *Erythrura psittacea*

身长 11厘米

| **红喉鹦雀(Red-throated Parrot-finch)** 生活在农田和空旷林地，除繁殖期群集取食草籽，也吃昆虫；因一身可与鹦鹉媲美的红绿羽色而得名。 · 巢 位于洞穴中或浓密草丛中隐蔽处，以草编成的圆形巢，开口在侧面。 · 地理分布 南太平洋中的新喀里多尼亚岛。 地理分布图 | | |
| 羽色 雌雄相似 | 栖所 | 迁徙 不迁徙 |


绿色体羽

红色尾部覆羽

迁徙习性：以迁徙、不迁徙、部分迁徙或四处游荡来表示

栖所图例说明

 森林——指针叶林、阔叶林、温带林或雨林

 稀树森林——即树木生长空隙较大的森林

 林缘

 稀树草原、农场

 丛林、灌木、灌丛和林木下层

 荆棘等带刺植物形成的矮树林

 开阔地区——草原、冻原、高地和石楠荒地

 半沙漠

 沙漠

 湖泊、河流及其流域

 高地溪流及附近地区

 海洋

 岩岸或沙岸

 淡水沼泽和湿地


 海边和内陆的岩石或悬崖

 山区

鸟类的身体结构

鸟类是一种飞行动物，全身的结构都是为了适应飞行而设计的。它们的体形短小而结实，内脏由胸骨和骨盆保护着，胸骨上附着用于飞行的肌肉；由于在起飞时必须用脚用力蹬地，降落时也必须利用脚缓冲巨大的冲力，因此腿足强健而富弹性；鸟

翼和人类的手一样都是由前肢演化而成的，虽然指骨大都已退化，但展开发达的翅膀时，就像是扇动大羽毛扇子；喙像灵巧的手，代替鸟类进行各式各样的觅食活动；它们的扇形尾羽附着在一段愈合的尾综骨上，可以在飞行中保持平衡。



鸟类的身体呈流线形，全身被覆羽毛；喙上有坚硬的角质鞘，腿上由一层鳞皮包裹

着；纤细轻盈的骨骼，有助于飞行，颞骨上没有牙齿；翼和尾看上去非常短小。

鸟羽的四种类型

鸟类的特征之一便是体表被覆羽毛，它们的体羽较为细小，覆盖全身，绒羽在体羽下形成良好的隔热层，长而坚硬的翼羽和尾羽用于飞行，尾羽羽翎通常两侧对称，翼羽则不对称。大部分鸟类的翼羽比右图要大得多，甚至比这本书还大。



外形和运动

鸟类的外形千奇百怪，反映出它们各自不同的生活方式。例如，不同形状的鸟喙，正好配合各种特殊的取食方式，同样地，飞行、站立、行走的姿势，以双足跳跃移动或是迈步向前，也与其生活

方式密切相关；有些鸟类的爪能够抓握栖木，有些鸟爪间有蹼膜，可以潜水划行，这些都是适应栖息环境的结果，所以识别鸟类时，必须综合外形、运动方式及其他特征，作整体的观察。



鸬鹚用钩喙
来捕鱼



太阳鸟的喙向下弯，
有利于吸取花蜜



池鹭以短剑般的利喙
抓鱼和戳鱼



鹪鹩以细喙捕
食昆虫



金翅雀尖锥形的硬喙
用于啄食种子



巨嘴鸟以长喙攫取
远处的果实来吃




鸭的宽喙在水中
具滤食的作用




猛禽的喙尖
而带钩


各种鸟类展翼飞行的轮廓都不同，森林猛禽类(a)的翼宽而圆，燕子(b)的翼窄而尖。



隼(c)的翼和尾末端窄而尖，鹰(d)则伸展宽大的翼，二者明显不同。



燕鸥(e)的翼长而优美，信天翁(f)的翼更长，而且在腹侧多出一段。



再观察鸟停栖时的姿势和步态：有的鸟类如苇莺(g)抓握垂直的树枝。鸚(h)常在地上行走，八色鸟(i)则会在地面跳跃行走。



大部分雀类(j)栖息在树冠上层，攀爬在枝叶之上。鸛鸽(k)用尾部来控制停止或转弯，跟在昆虫的后面奔跑。



观察鸟类爬树的方式。旋木雀(l)用尖锐的爪爬树，秧鸡(m)体形窄而腿长，很适合在沼泽植被中钻动。



八色鸟(i)则会在
地面跳
跃行
走。



同种鸟类间的差异

种是鸟类分类体系中的一个等级。同“种”之间的个体可以繁殖出有繁殖力的后代，然而有许多同种的个体特征并不完全相同，例如：雌性和雄性的成鸟

常在羽色上有差异，幼鸟会形成保护色。本页所列举的是同种鸟类的雌鸟、雄鸟和亚成鸟等“家庭成员”，第 13 页则展示出亚种以及同种鸟类的不同色型。

两性羽色相似：
例如草莺(右图)，
但通常雄鸟的鸣
声与雌鸟不同。



雄鸟

雌鸟

羽色部分相似，
但雄鸟的色彩较
鲜艳：如红腹灰
雀(右图)。



雄鸟

雌鸟

羽色部分相
似，但雌鸟的
色彩较鲜艳：
例如小嘴鸫
(右图)。



雄鸟

雌鸟

两性羽色完全不同：以
细尾鹩莺(右图)为代
表，这种差异在
繁殖季节尤其显著。



雄鸟

雌鸟

两性的羽色在繁殖期完
全不同，而且雄鸟在非
繁殖期的部分时间里出
现较暗的羽饰。雄鸟在暗色
时很像雌鸟，二者之间只有
些许的差
别。这种现
象出现在许
多种鸭中，
例如针尾鸭
(右图)。



非繁殖成鸟

雌鸟

雄鸟体形明显
大于雌鸟，例
如雄性大鸨身
长比雌鸟长 20
厘米(右图)。



雄鸟

雌鸟

雌鸟体形明显
大于雄鸟，如
红尾鸢(右图)
及其他猛禽大
多属于此类。



雄鸟

雌鸟

处于繁殖期的雄鸟，尾
部比雌鸟的长，如蓝孔雀
(右图和下图)。



雄鸟

雌鸟



雄鸟

雌鸟

亚成鸟

亚成鸟的羽色和雌鸟类似，但颜色较为暗
淡，如蜡嘴雀(上图)。

亚成鸟与成鸟羽
色完全不同，如夜
鹭(右图)及其他鹭
科鸟类。




成鸟

亚成鸟

亚种

许多同种的鸟类因为生长地区不同，而出现了羽色、体形、鸣声、鸟喙形状或尾长等特征略有差异的情形，这些具有地域性差异的个体，称之为“亚种”。



亚种范例

棕胁唧鹟：
东部亚种



茶腹鹑：
白胸亚种



扑动鹭：
东部亚种



欧亚星鸦：
细嘴亚种



加拿大雁：
有些亚种只有
体形大小不同



杂色鹑：
东南亚种



食腐肉乌鸦：
细嘴亚种



黄鹌鸪：
西部亚种



樫鸟：
黑冠亚种



白鹌鸪：
西部亚种



煤山雀：
凤冠亚种



长尾山雀：
灰背亚种



雉鸡：
环颈亚种



狐色带鹟：
深色的西部亚种



白腹灯草鹟：
俄勒冈亚种



色型

有些同种个体间存在着与地理分布无关的羽色差异，例如雪雁有蓝色和白色两种色型。



色型范例

欧亚蜂鹰：
棕色型



巴布亚吸蜜鹦鹉：
黑色型



杜鹃：
棕色型



木叶鸮：
棕色型



七彩文鸟：
红头型



在花园中赏鸟

郊区以及城镇的公园、庭院，都是很适合鸟类活动的场所，因此如果我们能在庭院中，提供一些对鸟儿有用的设施，例如：放置水盘供它们饮用和沐

浴、尽量增加栖息地类型、安置合适的巢箱吸引鸟儿停留，鸟类自然会把庭院当成它们的家，在家里享受赏鸟的乐趣，就不再是不可能的事了。

巢箱



一些小型雀形目鸟类，如：山雀、歌鸲、鹀鸟等，以及鸭类和猛禽，都能够利用巢箱筑巢，图中的这三种巢箱较适合小型的雀形目小鸟，其他鸟类可能需要较大的巢箱。



小水盘可以盛放饮用水

大水盘是理想的浴盆



鸟类喜欢在浅水中洗澡

水盘

雀形目鸟类喜欢使用放在高处的水盘，可以放置在饲料台上；其他的鸟类则喜欢使用放在地上的浅水盘。



有些食物需悬挂起来，有些则适合放在高处或撒在地上。



椰子适合小型鸟类



面包屑是冬季的应急食物



花生喂食罐

鸟食布丁



混合的种子



油脂和种子的混合球

饲料台

在寒冬里，鸟类的食物被雪所覆盖，将帮助鸟儿度冬的鸟食摆放在饲料台上，可以避免食物被清洁工扫走；这种简易的饲料台，可以在家中自己动手做。



摆放饲料的平台

坚固的支架

到野外赏鸟

走出户外到野外观察和识别鸟类一点都不难，只要常和熟悉鸟类的人同行，练习仔细观察鸟的外形、羽色，听听它们的鸣声，观察它们活动的方式、栖息

地的类型、停栖位置，看它们怎样觅食昆虫，识鸟的能力一定大有进步，还可以开拓视野，在大自然中享受接近鸟类的乐趣是一种有趣又有益的休闲活动。

望远镜


焦距 7~10 倍的轻便型望远镜最适合近距离赏鸟，放大倍数太高，反而使视野变小而不容易瞄准目标。



视野开阔的
轻便型双筒望远镜

笔记本

在赏鸟时迅速画出鸟的草图，是训练眼力最好的方法。这样不但能记录下所有观察到的鸟类，作成观鸟日记，还有助于安排日后的赏鸟计划。



照相机

不妨先在家庭院中练习接近鸟类、调整焦距及拿稳相机等技巧，35mm 的单镜头照相机携带和使用都很方便，是拍摄鸟类照片最理想的工具。



通常
使用短镜头即可

长镜头

在远距离拍摄小鸟时，须使用焦距大于 200mm 的长镜头，而且最好



用三角架把相机架稳，使拍摄效果更完美。



利用的掩蔽物


鸟类对于人的出现十分敏感，不过赏鸟人可以躲在一些简单的掩蔽物后面，鸟类就不致受到惊吓而能从容在原地活动

了；赏鸟人可以搭建一种形如帐篷、可移动的临时掩蔽物(左上图)，将树枝和树叶覆盖在掩蔽物的表面，利用静止不动的汽车(左图)作为掩护，也是一个不错的办法。



永久掩蔽所

有水禽生活的自然保护区，常会兴建这种专门赏鸟用的隐蔽所，来容纳许多参观者。



勿干扰繁殖期的鸟儿

敏感的鸟类一旦受到惊吓就会弃巢而去，影响当年度的繁殖。所以，绝对不可采集鸟蛋，捕捉幼鸟或过分追逐鸟类惊吓它们，也不可以擅自更动鸟巢周围的生态环境。



鸟类的飞行姿态

飞行姿态是鸟类的重要特征，
当一只鸟展翼高飞时，飞行姿态可使赏鸟人一眼就认出它

来，鸟类在求偶期所特有的炫耀式飞行、觅食时的空中盘旋也都有助于识别。



飞行平稳，拍翼均匀，路线笔直，是鸭类(上图)、雁类、鸽类和一些小型鸟类典型的飞行姿态。



有些小型鸟类为了节省能量，会在每次拍翼时使身体升高，然后收拢翅膀前冲，直到下一次拍翼，雀科(上图)就是如此。



许多大型鸟类(上图)仅在空中盘旋或滑翔，每当遇到上升气流就可以升高一些。



啄木鸟(上图)会先连续拍翼使身体升高，然后像雀类那样收拢双翼向下俯冲，呈现波浪式的飞行。

有些大型鸟类(右图)在每次用力拍翼之后都有长距离的滑翔，这是节省能量的飞行方式。



炫耀式飞行

求偶期的鸟类常会以特殊的炫耀式飞行来突显自己以吸引配偶，尤其是在开阔地带生活的鸟类，这种现象最为普遍。例如：斑尾林鸮(下图)从树顶起飞，用力拍翼使身体迅速升

高，再向下俯冲。



雄性草地鹨(右图)从地面起飞，振翼急升时发出微弱的叫声，然后降落下来并发出长长的啁鸣。



北方小辫鸽(上图)以旋转身体的奇特方式炫耀飞行，同时发出粗厉的叫声。

有些大型鹰类(右图)收拢翅膀从高空向下俯冲，然后再张开双翼上升到原来的高度。

某些猛禽和蜂鸟常表演“钟摆式”的炫耀飞行(右图)。



翼上的标记

鸟类在空中展翼飞翔时，翅膀和尾羽上那些色彩鲜明的斑纹才会完全展露。同种鸟类藉着鸟羽所呈现出来的图案相互识别；不同种类的鸟常组成混合食群，捕食时靠得很近，它们藉由彼此外形上的变化，作为遇到危险必须立即飞离的警告信号。

遇警信号

右上图这只雄性苍头燕雀，在起飞时展露出鲜明的警告图案。



翼带

右图的红额金翅在地面活动时体羽颜色较为暗淡，但在展翼飞行时，露出翅膀上颜色鲜艳且反差强烈的带状图案。



翼斑

鸟类的翼斑大多和右图这只雌性黄昏蜡嘴雀的白色翼斑一样，颜色鲜艳，十分耀眼。



涉禽和鸭类的翼



大黄脚鹬



示足鹬



蛎鹬



翻石鹬



滨石鹬



反嘴鹬

在水边生活的鸕鹚科鸟类(上图)，翼上大多具有很特别的白色图案，飞行时清晰可

见；有些鸭科鸟类(下图)的翼羽内侧具有白色或鲜艳的斑纹，称为翼镜。



绿头鸭



桂红鸭



花凫



白秋沙



鬃林鸭



斑背潜鸭

辨别关键

鸟类属于哪一个科，并不代表在野地生活时就会局限在那些习性之下，对许多同科的鸟类而言，它们彼此之间的颜色、体形、栖息地和行为都有很大的差别。此图解并不以科为分类标准，而是根据鸟类的栖息地和觅食方式来分类，因此同科的鸟类可能被区分成不同类

型。以此图解识别鸟类时，可以先在第1级(见次页)鸟类的5种基本类型中，选择一种特征最相似的类型，然后进入第2级，第2级会将第1级5种基本类型的鸟类作更进一步区分，第3级则进一步区分第2级。

第2级：走禽和涉禽



无飞行能力的大型鸟

体形很大，甚至比人还高，大多具有长腿和长颈，翅膀退化，生活在开阔地带，有长距离奔走的能力。



无飞行能力的小型鸟

体形介于鸽子和家鸡之间，翅膀退化或特化，生活在地面或躲藏在植被和洞穴中，有些为夜行性。

第2级：水禽



具蹼足的游禽

蹼趾间有蹼，嘴形宽平，脚较短，大多在水面觅食，有些会探入水中或潜水捕鱼之类的猎物。



不具蹼足的游禽

大多浮在水面觅食，有些能潜水觅食，有些则具辅助划水的叶片状瓣膜脚趾。

第1级

这一级图解依照食性和栖息环境，概略地将所有的鸟分成 5 类，帮助读者作大范围的识别，大部分的鸟类都属于前四种基本

类型，因此可以直接进入第 2 级和第 3 级查询，只有少数鸟类是属于第 5 种食性特别的种类。



走禽和涉禽



水禽



食果鸟、食蜜鸟和食谷鸟



在地面和树上捕食的鸟类



食性特别的鸟类

具短喙的小型走禽

体形在鸽子与家鸡之间，上腿结实，几乎都在地面上活动，以植物种子为食，必要时也能张翅飞翔。



体形中等的走禽

体形大小如火鸡般，后肢强壮有力，有飞行能力，但多在地面活动，筑巢和栖息于大树的枝干上。



具长喙的小型走禽

体形在鸽子与家鸡之间，具细长的喙，可在地面上和岸边觅食昆虫，大多在必要时可以飞翔。



具长腿的大型涉禽

几乎都在浅水和沼泽中涉水觅食，仅少数在草地上取食，均可飞翔，大多具有可伸到地上取食的长颈和长喙。



飞捕猎物的水禽

嘴和脚爪锐利，在水面上飞行，确定猎物的位置后降落到水面捕捉猎物，从不游泳。



从空中俯冲潜水捕食的水禽

在水面上飞行盘旋，确定猎物的位置后，直冲入水中追捕猎物，通常具有非常锐利的嘴。



从水面潜水的水禽

在水面游泳并潜入水中捕食，多数以脚划水，有些种类利用演化成桨状的双翼划水。



浮在水面的水禽

从空中降到水面捕食鱼和浮游生物，大多具有尖端钩状的喙，有些可以在浅水中浮潜。



第2级：食果鸟、食蜜鸟和食谷鸟



食果鸟



大多为栖息在果树上的树栖鸟，吃果实中的果肉或将整颗全部吞食；喙形有多种变化，长短不一有些喙较长，不必在细枝上走动即可以吃到果实，有些具有强壮的短喙，有助于啄取和衔住果实；它们的脚爪大多适于攀握树枝。

第2级：在地面和树上捕食的鸟类



灵活的猛禽

有些利用敏锐的双眼在空中巡行，有些则站在树枝上的制高点观望，一发现猎物就会快速追赶或扑食，并以锐利的喙和爪撕开猎物的皮肉，其中许多属于夜行性鸟类。



地面觅食鸟
善于飞行，但却在地面或离地不远的矮树桩和石块上觅食。



在枝干上觅食的鸟类
喙较为细长，有些为镊子状，长度不一，在树木的枝干上捕食缝隙及树皮中的昆虫，有些能在枯树上凿洞捕食昆虫。

第2级：食性特别的鸟类



食腐鸟
以动物尸体为食，有的在高空翱翔，以敏锐的视觉搜寻地面上的腐尸。



在空中觅食的鸟类
大多像强盗一样在半空中拦劫其他鸟类的猎物，例如军舰鸟，少数以捕捉飞行中的昆虫为食。

食蜜鸟

盘旋在半空中，或直接停在花瓣上把喙伸入花中吸取花蜜，有些种类的舌头部分特化成管状，仅以吸饮花蜜为食，食性专一，有些种类舌尖特化成刷状，也可食取花粉，大也都捕食花朵附近的小型昆虫和无脊椎动物，其中如吸蜜鹦鹉还能取食果实。



食谷鸟

具短而硬实的喙，有些会强烈地弯曲，在植物或地面上取食种子和谷粒，许多笼鸟如金丝雀、太平鸟、织布鸟、麻雀及鸽子、各种鹦鹉、百灵和鸦科鸟类都以种子为主要食物；松鸦和星鸦等食橡果、坚果等大型植物种子，也属于此类。



觅食无脊椎动物的鸟类

以长而强壮的喙深掘入土里，觅食土壤、草丛中种类和数量均十分丰富的昆虫、软体动物等无脊椎动物，具有飞行能力。



捡食昆虫的鸟类

在树冠、森林下层，低矮的灌丛和草堆等植被中觅食，捕食掉落在枝条和叶子上的虫卵及小型无脊椎动物，常聚集成一大群觅食。



坐等猎物的鸟类

捕食方式为停栖在有利的地形上观望，一发现有猎物飞过身旁，立即起飞追击，加以扑食。



追捕昆虫的鸟类

和灵活的猛禽一样，主动追捕猎物，一发现昆虫即快速扑食，许多雀形目鸟类均属于此类。



与其他动物共栖的鸟类

捕食牛、犀牛、长颈鹿等草食性动物身上的寄生虫及被这些大型动物吓走的昆虫，或是跟随数量众多蚂蚁群捕食惊慌逃开的小动物，例如：示蜜鸟靠鸣声引诱人和其他动物来砸开蜂巢，再食取里面的蜂蜡为生。



随机觅食的杂食鸟

这种鸟类的适应性非常强，能随着各种栖息环境吃不同类型的食物，也不局限某些特定的觅食方式，它们食取昆虫、植物的果实和种子，捕食小动物或吃腐尸，也吃人类喂食的各种食物，有时还在人类居住环境中的垃圾堆中觅食。



第3级

鸟类所有的演化都是长期适应环境的结果，它们的外形千奇百怪，为了生存各显神通，构成多姿多彩的鸟类世界，本书所描述的鸟

种都经过了刻意的筛选，以求能涵括所有的种类，其中共描述了 819 种鸟，约占全世界现存 9 600 种鸟类中的 1/11；图解的这一部

走禽和涉禽



无飞行能力
的大型鸟



鸵鸟 39



美洲鸵 38



皇帝企鹅 44

无飞行能力的小型鸟



鸮鸵鸟 42 上



拟鹑类 118 上



小型企鹅类
45 ~ 46 上

具短喙的小型走禽



鹑类
109 下 ~ 110,
113 上



石鹑类
134 下 ~ 135 上



鹑类
42 下 ~ 43



松鸡类
108 下 ~ 109 上



三趾鹑类
118 下



鸮鹑 119 上

分是将第2级的分类作更进一步的区分，明确地指出所属的小类别，如本页下方的“雉类”，或更精确地指出“种”，如本页

下方的鸮鹑和鸮鹦鹉。读者可以根据标示的页码来查阅，如果是本书未列入的某个类似种，也可以大约认识近缘种的习性。

食火鸡 40



鸮鹑 41



缩写符号

页码出处使用的缩写字，用以标明该条目的位置。

上 = 上面的条目

中 = 中间的条目

下 = 下面的条目

鹭鹤
128 下短翅
水鸡
127 上鸮鹦鹉
185 上纽西兰
秧鸡
124 上冠雉类
106 下 ~
107 上鞘嘴鸥类
146 下山鹧类
111 ~ 112走鸨类
135 下 ~
136 上砂鸡类
158雉类
113 下 ~ 115鸮珠鸡
117 下种鸮类
146 上

第3级

走禽和涉禽(续)



具长喙的
小型走禽



鹧鸪类
132 上,
144



水雉类
131



秧鸡类
123 ~ 127



拟鹭 129 上



典型的鹧鸪类
141 ~ 143, 145



体形中等
的走禽



火鸡类
108 上




喇叭鸟类
122 下



叫鹤类
129 下



叫鸟类
70 下



孔雀
116



大眼
斑雉
117 上



具长腿的
大型涉禽



红鹤类 71



鲸头鹳 64



秧鹤 122 上

戴胜 228 下



蟹鸻 132 下



长脚鹬和
反嘴鹬类
133 下 ~ 134 上



鸻类
137 下 ~ 140



蛎鸻类
133 上



冢雉类
105 下 ~
106 上



地犀鸟类
231 下



蛇鹫
100



凤冠雉类
107 下



凤冠鸠类
166 上



鸨类
130



鹤类
65 下 ~ 68 上



朱鹭类
68 下 ~ 69 上



琵鹭类
69 下 ~ 70 上



第3级

走禽和涉禽(续)



具长腿的大型
涉禽(续)



鹭类
58 下 ~ 63



槌头鹳
65 上



鹤类
119 ~ 121 下

水禽



不具蹼足
的游禽



水鸡类
126



白冠鸡类
127 下



鳍足类
128 上



飞捕猎物
的水禽



海雕类 90 ~ 91 上



鸮
88 下



渔鸮类
198 上



从空中俯冲潜水
捕食的水禽



鲑鸟类
55 上



热带鸟类
53 下



褐鹈鹕
54 下



海燕类
52 下



从水面潜水的水禽



潜鸟类
46 下



鸭类
81 下 ~ 86



企鹅类
44 ~ 46 上

水禽



具蹼足的游禽

瘤鹄
73



鸭类
76 ~ 86 上



雁类
72 上,
74 上 ~ 75



鹈鹕类
54



河鸟类 280 中



瓣足鹈鹕类
143 中



海燕类
52 上 ~ 52 中




军舰鸟类
58 上



剪嘴鸥类
155 下



燕鸥类
152 上, 154 ~
155 上



翠鸟类
219 下 ~ 222



鲣鸟类 55 下



燕鸥类
152 下 ~ 153



鸬鹚类
56 上 ~
57 上



海雀类
156 ~ 157



蛇鹈类
57 下



鸬鹚类 47



第3级

水禽(续)



浮在水面的
水禽



鸥类 148 ~ 151



信天翁类
48 ~ 49 上

食果鸟、食蜜鸟和食谷鸟



食果鸟



大嘴鸟类
236 ~ 237



咬鹃类
218 ~ 219 上



鹦鹉类
169 ~ 170,
173, 175 下
~ 176 上,
177 中,
178 上,
179 ~ 185



唐纳雀和
尖喙鸟类
263 中,
242 下 ~ 348



侏儒鸟类
258 下 ~ 260



蕉鹃类
186 ~ 187



啄花鸟类
325 上 ~
325 中



鹎类
273 下 ~ 274



黄鹂类
379 下 ~
380 上



食蜜鸟



蜂鸟类
210 ~
217 上



太阳鸟类
326 中 ~
328 上



吸蜜鸟类
329 中 ~ 333

鹱鸟类
51 下,
53 上



海燕类
49 下~
51 上, 52



贼鸥类
147



棕鸟和
八哥类
374~378



五色鸟
234~235



伞鸟类
261~
263 上, 263 下



连雀类
279 中~
279 下



犀鸟类
230~231 上



和平鸟类
275 下



亮丝鹟
280 上



果鸠类
165~168

亭鸟类
385~386 上



极乐鸟类
386 下~387



鼠鸟类
217 下



旋蜜雀类
347 下~348



夏威夷
吸蜜鸟类
352 下~353 中



鸚鵡类
169~170,
178 上



第3级

食果鸟、食蜜鸟和食谷鸟(续)



雀类
360 ~
365 中



蜡嘴雀类
365 下 ~
369



鸠鸽类
159 ~
164



百灵类
267 ~ 268



鸦类、鹊类和星鸦类
388 下 ~ 392

在地面和树上捕食的鸟类



鸮类
194 ~ 203 上



典型的猛禽
88 下 ~ 90 上,
91 ~ 99



隼类
101 下 ~ 105 上



鹊鸽和鸮类
270 下 ~ 272 上



岩鸮类
283 中 ~
283 下



乌鸦类
393 ~ 395



八色鸟类
264 ~ 265 上



百灵类
267 ~ 268



深山
鸮鸮
185 上



窜鸟类
251 中

鹀类
334~338,
339 中, 341 上



鹦鹉类
171~173 上,
174~185



蜡嘴鹀类
339 上, 339 下~
340, 341 下~342 中



麻雀类
370 上~
370 中



长刺歌雀
356 下



织布鸟类
370 下~373



伯劳类
276~278



贼鸥类 147



澳洲的地面
觅食鸟
266 下, 294 下~
295 上, 314 上,
382



戴胜
228 下



地宝鸟类
227 下



杜鹃类
191~193 上



鸠鸽类
159~164

琴鸟类
266 上



八哥类
374~377



第3级

在地面和树上觅食的鸟类(续)



在枝干上
觅食的鸟类



啄木鸟类
238 ~ 243



砍林鸟类
245



珍珠爬树雀
247 上



觅食
无脊椎动物
的鸟类



欧洲八哥
375 中



拟太阳鸟
265 下



地啄木类
238 上



鞍背鸦
381 下



坐等猎物
的鸟类



美洲五彩
鸟类
232 下 ~
233 上



蜂虎类
224 ~ 225



美洲吃蜂鸟类
232 上



裸鼻鸱类
205 上



广嘴夜鹰
和无须夜鹰
204



佛法僧类
226 ~ 227 上, 228 上

林戴胜类
229



鸱类
323 上 ~
323 中



杂色鸱
323 下



旋木雀类
324



鹪鹩类
280 下 ~
283 上



美洲黑鹂类
355 中 ~ 358



嘲鸫类
285



山鸦类
393 上



翠鸫类
223 下



卷尾类
380 下 ~
381 上



咬鹃类
218 ~ 219 上



短尾鸫类
223 上



翠鸟类
219 下 ~
222 下



霸鹟类
251 下 ~
258 中



姬鹟类
308 下 ~ 309,
314 下



第3级

在地面和树上捕食的鸟类(续)

捡食昆虫的鸟类



杜鹃类
188 ~
191 上



灶鸟类
246 ~ 247



犀鸟类
230 ~ 231 上



刺嘴莺类
312 ~ 313



捕蛛鸟类 328 中



阔嘴鸟类 244



啄果鸟类
325 ~ 326 上



嘲鸫类
284 ~ 285



绣眼类
328 下 ~
329 上



雀鹛和
木叶鸟类
275



美洲黑鹇类
355 中 ~ 359



细尾鹟莺类
310 中 ~ 311



王鹟类 310 上, 315



鹟类 273 下 ~ 274



追捕昆虫 的鸟类



蚁鸟类 248 ~ 250



伯劳和林鸲类
276 ~ 278

厚头嘯鶯类
318~319 上



八哥类
374~378



鸚鵡类
316 下 ~
317



山椒鸟类
272 中 ~
273 上



美洲莺类
349~352 中



旧大陆莺类
301~308 中



鵲类
286~294 上



食蚊鸟和
蚋莺类
251 上, 300 下



鵲类
295~300 中



扇尾鶯类
316 上 ~
316 中



霸鶯类
251 下 ~
258 中



山雀类
319 中 ~
322



鸦类和鹊类
388~392 上



绿鶯类
353 下 ~
355 上



钩嘴鸚类
279 上



钟鹊类
383 下 ~
384 上



斑噪钟鹊类
384 下



第3级

食性特别的鸟类



食腐鸟



美洲鹫类
86 ~ 88 上



鸢类 89 下



巨鹱类 49 下



乌鸦和鹊类
391, 394 ~ 395



在空中
觅食的
鸟类

雨燕类 208 ~ 209



军舰鸟类 58 上



油鸱
203 下



燕鸻类 136 下 ~ 137 上

夜鹰类
205 中 ~ 207 下



与其他动物
共栖的鸟类

牛背鹭
61 下



示蜜鸟类
233 下



牛鹂类
379 上

蚁鸟类
249 中 ~ 250



秃鹰类 91 下 ~ 92



鞘嘴鸥类
146 下



凤头卡拉鹰类 101 上



非洲秃鹫 67



崖燕和
沙燕类
269 ~ 270 中



蜂鸟类
210 ~ 217 上



咬鹃类
218 ~ 219 上



森燕类 383 上



蜂虎类 224 ~ 225



随机觅食的杂食鸟

鹊类和
乌鸦类
392 上, 394 ~ 395



凤头卡拉鹰类
101 上



棕鸟和八哥类
375 中, 377 上



非雀形目

世界上有将近一半的鸟类属于非雀形目的 99 个科，其中包括了所有生活习性各异的大型鸟类，它们有些生活于淡水或海水里，有些栖息于地面、树上或灌丛中，有些飞行能力很强，有些不擅飞行；一般而言，非雀形目鸟类的巢比较简单，有些甚至

直接在地面或岩石上产卵；大部分的幼鸟出生时不能独立生活，但有些雏鸟一出生就全身被羽，能奔跑和独自取食；它们彼此间的鸣声也大不相同，有些种类也和雀形目鸟类一样，能发出复杂、悦耳的鸣声。

科名 美洲鸵鸟科	学名 <i>Rhea americana</i>	身长 130 厘米
----------	--------------------------	-----------

美洲鸵鸟(Greater Rhea)

体形高大，不会飞翔，生活在草木较高、灌丛茂密的开阔的大平原中。以植物的根、叶和种子为食，也取食昆虫和其他小动物；当其在开阔的草原上奔跑时，也会像飞行一样把翅膀张开，以获得上升气流的助力；会游泳，并集群到湖泊或河流中去饮水和洗浴；常喜群居，但老年的雄鸟有时会主动从群体中退出，单独活动；在繁殖季节，雄鸵之间常为争夺配偶而互相用力踢对方；雄鸵会以拍打翅膀，并发出低声吼叫的炫耀行为来恐吓竞争对手或吸引雌鸵；一只雄鸵通常与多只雌鸵交配，并把雌鸵带到巢中产卵，通常

有 12 只雌鸵到同一巢中产下约 15~30 枚的卵，有时达 60 多枚，孵卵和育雏

的工作均由雄鸟独自承担。

·巢 呈浅凹状，位于地面的浅洞，内衬草。

·地理分布 巴西亚马孙河以南到阿根廷中部的旷野上。

头、面和颈部被羽

翅羽蓬松而粗糙

腿强健
脚趾粗短



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鸵鸟科	学名 <i>Struthio camelus</i>	身长 250 厘米/200 厘米
--------	----------------------------	------------------

鸵鸟(Ostrich)

平均身高约 250 厘米，是世界上最高大的鸟类；不会飞翔，翼羽和尾羽蓬松下垂，双腿修长强健，所以奔跑迅速，最高时速可达 64 公里。鸵鸟生活在沙漠、半沙漠和草原等开阔地带，藉敏锐的视力和长距离迁移的能力，寻求安全和食物丰盛的地区；喙扁平，以植物的茎、叶、花和种子为食；在繁殖期，雄鸵常以不断扇动双翅、晃动颈部的炫耀姿势占据领地，只有那些能保卫领地的雄鸵，才能与雌鸵交配。一只雄鸵通常会与 5 只雌鸵交配，这些雌鸵把卵产在同一窝内，最多时可累积 40 枚蛋，不过，原配雌鸵会把多余的蛋移到巢外，只孵化 20 枚；雌雄鸵共同孵卵、育雏，幼鸟长大一点时就与其他巢的幼鸟合并在一起。

· 巢 在地面凹陷处用


脚扒开泥土，并

用身体在沙土

上压成巢，直径可达 3 米。

· 地理分布 从塞内加尔到埃塞俄比亚的非洲东部地区。

· 附注 目前非洲南部有放养，以获取翼羽和尾羽；阿拉伯半岛从前也有鸵鸟分布，现已绝种。



脚上仅具 2 支强健的脚趾

地理分布图


羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 食火鸡科	学名 <i>Casuarius casuarius</i>	身长 183 厘米
---------	-------------------------------	-----------

食火鸡(Southern Cassowary)

体形健壮，无飞行能力的大型鸟类，生活在植被茂密的热带雨林中；羽毛质地粗糙，且有些羽毛尖端特化成长长的发状细丝；翅膀短小，在飞羽着生处只具有羽翮；头部裸露，颈部有红蓝色的垂肉，垂肉的颜色会随着年龄而发生变化；当鹤鸵受到惊扰时，常把头低下钻入密林中，这时头顶的角质冠，便产生了保护作用；利用狭窄的喙取食掉落在地面上的果实，也吃绿色植物、种子和小型动物；大多单独活动，叫声复杂多变，包括有“嗡嗡”声、“嘶嘶”声、低沉的“隆隆”声，以及吼叫声；雌鸵体形稍大于雄鸵，头颈部颜色较明亮，角质冠也较高，在繁殖季节，雌鸵和数只雄鸵交配，并把蛋分别产在各雄鸵的巢中。雏鸟全身裸露，在刚出生的9个月里都由雄鸵照料。

- 巢 位于树下落叶层上，浅凹状巢，内衬草和落叶。
- 地理分布 新几内亚和澳大利亚东北部的雨林中。
- 附注 脚爪强壮而锐利，用于搏斗。



地理分布图



亚成鸟



羽色 雌雄略有不同	栖所  	迁徙 不迁徙
-----------	--	--------

科名 鸸鹋科

学名 *Dromaius novaehollandiae*

身长 210 厘米

鸸鹋(Emu)

体形大但不会飞，生活在较开阔的半沙漠、草原和开阔的林地等栖息地；翅膀短小，隐藏在长而蓬松的体羽中；雌鸟体形比雄鸟略大，头颈部裸露处的蓝色也比较深；奔跑的时速可达 48 公里，但不常奔跑；通常成对或成小群取食草本植物，也捕捉昆虫为食，叫声低沉；雄鸟孵蛋并照顾雏鸟。

· 巢 浅凹状地面巢，巢内空无一物，有时会以被踩倒的植物做底衬。

· 地理分布 澳大利亚除了东部沿海地区和森林茂密处之外均有分布。



雌鸟

上颈部
皮肤裸露

下颈部
羽毛稀疏

翅膀退化

粗糙而
下垂的
羽毛

长脚上覆
鳞皮

脚强健
有力



地理分布图



羽色 雌雄略有不同

栖所

迁徙 不迁徙

科名 无翼鸟科	学名 <i>Apteryx australis</i>	身长 70 厘米
奇异鸟(Brown Kiwi) 不能飞行的夜行性鸟类，生活在森林中，白天躲藏在地洞里，夜晚才出来觅食；视力很差，但嗅觉灵敏，鼻孔位在喙的尖端，喙的基部有敏感的触须，可确定食物的位置，取食时挖开土壤寻找蠕虫，也取食种子和浆果；跑得很快，叫声像口哨声一样高亢；雌鸟产卵 1~2 枚，每枚约是体重的 1/5；雄鸟负责孵蛋，雏鸟孵出后即全身被羽，能独立活动。 · 巢 位在地洞、树根空隙内或空心圆木的凹陷中，无衬里。 · 地理分布 仅分布于新西兰。 地理分布图 鼻孔位在喙的尖端 腿部粗壮强健 羽毛粗糙，呈毛发状		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 鹑鸵科	学名 <i>Tinamus solitarius</i>	身长 45 厘米
孤鸕(Solitary Tinamou) 头小、颈细、腿粗壮、体形笨拙的森林鸟；动作并不十分敏捷，飞行能力弱。受到惊扰时，最常见的反应是身体贴近地面悄悄爬开或蹲伏着隐藏起来，只有在快被发现时才会振翅飞出。平时以身体与树枝平行的姿势，蹲在树上休息，不过要找到合适的粗枝并不容易；腿上有十分粗糙而有保护作用的鳞皮，使它们能在树干上蹲稳；在地面取食掉落的果实和种子，偶尔也吃些昆虫；有时会在林中的浅水坑中洗浴；雄鸟负责孵蛋，离巢觅食时在巢和蛋上盖上枯叶；此外，雄鸟还负责育雏，直到幼鸟能够独立生活为止。 · 巢 林下地面浅凹铺上草茎。 · 地理分布 巴西东部、巴拉圭东南部以及阿根廷北部。 地理分布图 头小 翅膀柔弱 体型笨拙		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙


科名 企鵝科	学名 <i>Aptenodytes forsteri</i>	身长 115 厘米
--------	--------------------------------	-----------

皇帝企鵝(Emperor Penguin)

最大、最重的一种企鵝。在海洋取食期间，身体积满了一层厚厚的脂肪；追捕鱼类时，靠着鳍状翅膀的推进，时速可达 265 米。在冰雪上直立行走，或以腹部触地，藉着鳍像雪橇一样向前滑行；在南极冰面上集群繁殖时，个体间以小号般的鼻音来识别配偶或双亲；在早冬时节交配，雌鸟产下一枚蛋后，就离岸到海中觅食；雄鸟则以直立的姿势，将蛋放在脚上孵化两个月，公企鵝彼此挤在一起取暖，度过极地寒冬的暴风雪；正当小企鵝孵出时，雌企鵝从海中返回，将食物吐出喂食小企鵝，几乎已失去一半体重的雄鸟，开始走向大海取食几个星期，再返回帮助喂食小企鵝。

· 巢 无巢。单枚蛋，幼鸟停在成鸟脚上，藏于长满羽毛的腹部皮肤的褶皱中。

· 地理分布 南极海岸。



地理分布图



亚成鸟

隔热极好的身体

像毛皮一样的致密羽毛


具保护作用的皮肤褶

幼鸟停靠于脚上

向上翘起的脚支撑着幼鸟



尾短而硬



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 企鵝科	学名 <i>Pygoscelis adeliae</i>	身长 70 厘米
阿德利企鵝(Adelie Penguin) 小型企鵝，全身长满像动物的皮毛一样保暖的厚羽毛，十分适合极地的生活；在远离南极海岸的冰冷水域中觅食，大多猎食磷虾(一种似虾的生物)，也吃小鱼。通常在南极的夏天时，筑巢于拥挤的群体中，繁殖期，每只鸟都会返回原巢址，寻找原配偶；一对企鵝每年通常哺育两只幼鸟，已能离巢的幼鸟会聚集在海岸边，等待出海觅食的父母回来喂哺它们。 ·巢 由雄鸟收集的卵石堆成小堆。 ·地理分布 环绕南极的海岸及附近岛屿，在海洋中越冬。 地理分布图 密致而防水的羽毛 腿非常地短 大而多肉的蹼趾		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙

科名 企鵝科	学名 <i>Eudyptula minor</i>	身长 40 厘米
矮企鵝(Little Penguin) 在陆地上时，以夜间活动和不醒目羽色的伪装来逃避敌害；取食方式是在海水中，潜水抓鱼。在非繁殖季节或换羽期，漂浮在开阔的水面上休息；会在黄昏后到海边群集，黎明前又离开；使用地下的洞穴繁殖，换羽期时也栖息在洞中；群集时十分嘈杂、喧闹；双亲数日一轮替换孵蛋及看护幼鸟。 ·巢 沙岸上的洞穴群，有时在海边的山洞或茂密的植被下。 ·地理分布 在澳大利亚南部、东南部以及新西兰的海岸和沿海岛屿上繁殖，出海过冬。 地理分布图 头部的毛色单调而无斑纹 短而厚的羽毛		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙

科名 企鹅科	学名 <i>Spheniscus humboldti</i>	身长 68厘米
--------	--------------------------------	---------

洪氏环企鹅(Humboldt Penguin)

胸部和脸上具有带状斑纹，叫声喧闹似驴鸣，易被误认为是分布于南非、南美和加拉帕哥斯群岛的斑嘴环企鹅的一种；在寒冷但鱼类丰富的秘鲁寒流中取食鳀和沙丁鱼，偶尔捕食生活在浅滩的鱼类和乌贼，会成群潜入水中，将鱼驱赶在一起而捕食，繁殖成功与否与鱼的季节性供应关系密切，于大洞穴群中筑巢，如果找不到合适的土壤打洞，就在山洞筑巢；两只雏鸟就像大多数幼企鹅一样，在换第一次成羽之前，会长胖到看起来比亲鸟稍大些。

- 巢 靠近海边的洞穴、岩洞或是岩缝中裸露的洼地。
- 地理分布 秘鲁和智利北部。
- 附注 人类大量的采集石材和化学肥料，破坏洞群并运走土壤，迫使它们只能在山洞或岩石裂缝中筑巢。



裸露的桔黄色皮肤

黑色带纹

鳍状翅膀

有蹼的短趾



地理分布图



亚成鸟

羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 潜鸟科	学名 <i>Gavia immer</i>	身长 91厘米
--------	-----------------------	---------


白嘴潜鸟(Great Northern Diver)

在北方繁殖区随处可见，似哭又似笑的叫声，回荡在巢栖所在的海岸和岛屿旁的淡水湖上；呈流线型的头和身体，利于潜水捕鱼，但离水上岸的行走姿势则十分笨拙。

- 巢 以水边低矮的植物材料堆积而成。
- 地理分布 在北美洲北部、格陵兰和冰岛繁殖，冬季移栖至欧洲和北美的西北部海岸。



冬羽




地理分布图



强壮的剑形喙

颈上的条状斑纹

羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 鸕鷀科	学名 <i>Podilymbus podiceps</i>	身长 38 厘米
--------	-------------------------------	----------

斑嘴巨鸕鷀(Pied-billed Grebe)

常出现在溪流和池塘上，具有厚实的喙；春季成对或家族群活动，冬季则在湖泊和较大的池塘上聚成一大群，捕食鱼和昆虫的动作十分敏捷。

- 巢 以腐烂的植物置于浅水中或浮于水生植物间。
- 地理分布 在美洲大部分地区繁殖，北方和南方的种群在冬季迁往较温暖地区。

冬羽

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 鸕鷀科	学名 <i>Podiceps cristatus</i>	身长 48 厘米
--------	------------------------------	----------

凤头鸕鷀(Great Crested Grebe)

头顶有冠羽，头两侧有栗色、似披肩的羽饰，成对活动于湖泊和河流中，捕食鱼、昆虫以及其他水生动物。

- 巢 浮于浅水或水生植物群间。
- 地理分布 在欧亚大陆大部分地区、非洲和澳大利亚繁殖，欧亚大陆北部的种群，冬季向南迁徙，最远至地中海和印度北部。

冬羽

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 信天翁科	学名 <i>Diomedea exulans</i>	身长 135 厘米
---------	----------------------------	-----------

漂泊信天翁(Wandering Albatross)

这种巨型的海鸟翅膀狭长，翼展达 3 米，可以毫不费力飞越常出现强风的南半球海洋；由于能在风中利用翱翔节省能量，它们时常飞行数十或数百公里寻找食物；典型取食区是由上升水流将营养物质带到水层表面的水域，常于夜间到水面取食上升至水面的海洋动物，或偶尔进行潜浮，鲑鱼和其他头足纲动物是主要食物，信天翁将食物以液态油脂的方式贮存于胃中，然后消化吸收，或反哺喂食幼鸟。集小群体在裸露的海岛顶部和斜坡上筑巢，以利于在风中起飞。成鸟频繁的发出驴一样的叫声，彼此以展翅、摇头、两喙相击来炫耀，形成配偶后一起度过一生；通常每两年繁殖一次，单枚卵，双亲轮流孵化 11 周，幼鸟飞羽长齐前，须连续喂食鱼和吐哺的液态油脂长达 10 个月，然后在海洋中度过 10 年，从巧克力褐色经过数次换羽，变为几乎全白后始成熟，可繁殖配对，平均能存活大约 30 年。

- 巢 将泥土和植物挖成大型的鼓状巢，在顶部有凹陷。
- 地理分布 环绕南极洲的海洋和岛屿，以及南半球大陆海岸。



地理分布图



亚成鸟



完全成熟鸟的雪白羽毛

极为狭长的翅膀



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 信天翁科

学名 *Phoebastria palpebrata*

身长 85 厘米

灰背信天翁(Light-mantled Sooty Albatross)


羽毛大部分黑色的小型信天翁，背部为浅灰色，飞行时尾部形成完整的楔形；能展开双翅滑翔很长的距离，浮在海面取食鱼、鱿鱼和甲壳类动物；求偶时成对飞行，或在地上面对面炫耀白色新月形眼纹和喙上的条纹；于南半球海洋岛屿上的陡壁突出部分，成对分散筑巢。

· 巢 将土壤和植物挖开堆高，顶部有一深杯状坑。

· 地理分布 南极洲周围的海洋和岛屿，以及南美洲、澳大利亚和新西兰的南部海岸。



飞行中的成鸟



地理分布图

成鸟在地面炫耀



羽色 雌雄相似

栖所  

迁徙 迁徙

科名 水薙鸟科

学名 *Macronectes giganteus*

身长 95 厘米

巨鹱(Southern Giant Petrel)

体形巨大，近似信天翁，飞行时看起来有些驼背；在陆地上行走灵活，在海里和海岸上争相取食鲸等动物的尸体，或捕杀较小的海鸟；繁殖鸟群栖于岛屿或大陆海岸上。

· 巢 地面上的浅洼，周边有卵石或干草。

· 地理分布 在南极洲海岸和岛屿上繁殖，冬季在海洋中越冬。



地理分布图



普通型

白化型

蹼足

羽色 雌雄相似

栖所  

迁徙 迁徙

科名 水薙鸟科

学名 *Fulmarus glacialis*

身长 47 厘米


北方白腹穴鸟(Northern Fulmar)

头圆嘴厚，身体圆胖，有灰色到深蓝灰色等不同色型。飞行时不断地快速振翅与伸展翅膀，十分有力；在海面捕鱼，或潜入几米深的水中，取食在浮游生物间游荡的小动物；也会群聚在鱼船周围，取食鱼的碎渣。单独或嘈杂的群体，在海岸悬崖上筑巢。


- 巢 在悬崖或岩石裸露的突出处产卵。
- 地理分布 在大西洋北部和太平洋北部的海岸上繁殖，冬季扩散到海上。



深色型



地理分布图



羽色 雌雄相似

栖所  

迁徙 迁徙

科名 水薙鸟科

学名 *Daption capense*

身长 39 厘米

海角薙(Cape Petrel)

身上有花格子状的羽色图案，常在捕鲸船周围像鸽子一样群集，以快速拍翅与展翅滑翔交替飞行，游泳或潜水捕食小鱼，及在浮游生物间游动的其他动物；小群或群体在海岸和岛屿上繁殖。

- 巢 位于岩石的突出处或岩缝，以疏松的碎石片堆成的浅洼。
- 地理分布 在南半球大陆海岸及岛屿上繁殖，于海洋越冬。



飞行中的成鸟



地理分布图



羽色 雌雄相似

栖所  

迁徙 迁徙

科名 水薙鸟科	学名 <i>Pterodroma cookii</i>	身长 33 厘米
---------	-----------------------------	----------

库氏圆尾鹱(Cook's Petrel)

快速而飘忽不定地飞行于海上，翅上有醒目的斑纹可识别。取食在海上漂浮的小型海洋浮游生物，可以在很小的繁殖区域活动，也可以在广阔的海洋中游曳；为躲避捕食者，通常在夜晚的海岸繁殖。

- 巢 位于森林斜坡高处，洞中的洼地。
- 地理分布 新西兰两端小岛，冬季遍布太平洋海域。

飞行中的成鸟

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 水薙鸟科	学名 <i>Pachyptila turtur</i>	身长 27 厘米
---------	-----------------------------	----------

鲸鸟(Fairy Prion)

一生中大部分的时间都在海上飞翔。夜间群集，掠过海面以喙舀取海水，喙上有板状齿，用以从水中过滤小的甲壳类、鱿鱼和其他水生动物。繁殖时期在夜间成群聚集于小岛上，刚到达时会发出温柔的“咕咕”声，洞中的配偶也以相似的叫声应答，在陆地上时，细弱的腿以蹲得很低的姿态笨拙行走。

- 巢 以喙和脚在地上挖洞，隐蔽在植物或岩缝中。
- 地理分布 繁殖于南半球的大陆上，在海上越冬。

飞行中的成鸟

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 海燕科	学名 <i>Oceanites oceanicus</i>	身长 17 厘米			
长脚白腰海燕(Wilson's Storm-petrel) 麻雀般大小，飞越海洋时，双腿悬在空中摇晃，从海中啄食小甲壳类、鱼和软体动物。 · 巢 位于高出海岸的斜坡，为洞中的坑，营群巢。 · 地理分布 繁殖于南极海岸和南半球的海岛上，在海洋中越冬。  地理分布图  细弱的腿 不适于陆上行走  <tr><td>羽色 雌雄相似</td><td>栖所  </td><td>迁徙 迁徙</td></tr>			羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 迁徙
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 迁徙			

科名 海燕科	学名 <i>Hydrobates pelagicus</i>	身长 15 厘米
景风海燕(European Storm – petrel) 小型的黑色海鸟，臀部白色，常振翅在水上低飞，腿部在水面上发出嗒嗒声；啄取浮游的小动物，也追随渔船吃些碎屑；繁殖群在近海岛屿上，晚间回到巢穴时，会发出刺耳的颤声。  地理分布图  飞行中的成鸟  栖息时的成鸟 · 巢 岩洞中的浅坑。 · 地理分布 繁殖于南极洲东北部和地中海西部的岛屿，在海上越冬。		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 迁徙

科名 潜海燕科	学名 <i>Pelecanoides urinatrix</i>	身长 23 厘米
潜海燕(Common Diving - petrel) 飞越海洋，钻进波涛中啄食水生动物的海鸟，冬季四散到海上过冬。 · 巢 洞穴尽头，群巢位于岸边斜坡上。 · 地理分布 南半球的岛屿及南极洲以外的		
 地理分布图	大陆海岸上。  带钩的喙	体形小巧  飞行中的成鸟  体形小巧
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 迁徙

科名 水薙鸟科	学名 <i>Puffinus puffinus</i>	身长 34 厘米
---------	-----------------------------	----------

普通薙(Manx Shearwater)

体背黑色、腹面白色的海鸟，在海上时而快速振翅低飞，时而斜向滑翔；在水面或浮潜水中摄食小鱼、鱿鱼、甲壳动物，捡拾渔船上掉落的碎屑。巢群位于多山的近海岛屿上，常可见它们在近海成群漂浮，天黑之后，才在一片啼叫声中上岸入巢。

- 巢 洞穴、岩石缝或岩洞中的浅坑，有时以草衬垫。
- 地理分布 沿北大西洋海岸繁殖，在中部海洋越冬，最南远至大西洋南端。



狭长而渐细的双翼

地理分布图



成鸟

羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 热带鸟科	学名 <i>Phaethon lepturus</i>	身长 80 厘米
---------	-----------------------------	----------

白尾热带鸟(White-tailed Tropicbird)

身体呈流线形，尾及翅细长，靠潜入海中取食鱼、鱿鱼和甲壳类动物；雌雄两性都具有白而细长的尾羽，在巢域上空像表演杂技般地炫耀飞行。

- 巢 在缝隙、裸地上或突出的岸石下产卵。
- 地理分布 在太平洋、大西洋和印度洋的岛屿上繁殖，分布区域扩及整个海域。



地理分布图



亚成鸟



坚实的喙呈剑状

飞行中的成鸟

双翼修长

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 鹈鹕科	学名 <i>Pelecanus crispus</i>	身长 170 厘米
--------	-----------------------------	-----------

卷羽鹈鹕(Dalmatian Pelican)

羽毛白色是其最明显的特征，翅尖端黑色，冠羽短，喙下有粉红色或橙色的喉囊；喜群居，群体合作取食，一起将鱼群赶进浅水处，然后钻进水中将鱼和水一起吞入，等吞入的东西充满喉囊后，再抬起头将水排出；繁殖时群集在沼泽中。

- 巢 在飘浮的植物上，以细枝和草构成平台。
- 地理分布 在欧亚大陆的亚得里亚海到中国大陆中部繁殖，南向埃及和印度北部过冬。



地理分布图



亚成鸟




羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 鹈鹕科	学名 <i>Pelecanus occidentalis</i>	身长 115 厘米
--------	----------------------------------	-----------

褐鹈鹕(Brown Pelican)

两种潜水捕鱼的鹈鹕中的一种。取食时会伸展双翅从空中向下猛冲，在撞击水面的一刻翅膀向后伸；常出现在海岸和港湾处，通常很驯服；主要的食物是鱼，大多靠潜水捕得；巢群通常位于沿岸岛屿上。

- 巢 地面的浅坑，内衬羽毛和碎石；有时只是一堆混合材料，或是在灌丛或树上由枝条堆成的平台。
- 地理分布 从加拿大西部到秘鲁北部的太平洋海岸，以及从美国北部到巴西北部的大西洋海岸，北部种群在此范围内向南迁移。



地理分布图



亚成鸟



羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 鲣鸟科	学名 <i>Morus bassanus</i>	身长 80 厘米
--------	--------------------------	----------

北方鲣鸟(Northern Gannet)

身体呈高度流线型，适于潜水捕鱼，有时从高达 45 米处垂直俯冲入水；时常集群取食，捕捉如鲱鱼和鲭鱼等浅水鱼；飞行能力很强，飞行时振翅和滑翔交替，常成群排成一纵队；在很高的斜坡、悬崖顶上或宽阔的悬崖边上营群巢，两巢相隔的距离，约与两鸟栖坐时两喙的距离相等；富侵略性，叫声深沉而刺耳；幼鸟经 5 次换羽后方能长出成羽。



地理分布图

· 巢 筑于地上或岩石突出部分的海草和碎石堆。

· 地理分布 繁殖于北大西洋沿岸，冬季向南移栖，远至美国东部和非洲西部。



亚成鸟

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 鲣鸟科	学名 <i>Sula nebouxii</i>	身长 81 厘米
--------	-------------------------	----------

蓝脚鲣鸟(Blue-footed Booby)


沿岸分布，外形和北方鲣鸟很像，但体重轻得多，尾羽也较长，这些特点使它能潜入浅水中捕鱼；会一小群同时从一定高度俯冲下来，在远离海岸的岛屿集小群筑巢；求偶时展示它们的蓝脚，孵卵时蓝脚也能保温。




地理分布图

· 巢 通常无巢材，卵产在平地上。

· 地理分布 从墨西哥西北到加拉帕戈斯群岛的东太平洋岛屿，以及南美洲到秘鲁北部的海岸。



亚成鸟

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 鸬鹚科	学名 <i>Phalacrocorax auritus</i>	身长 80 厘米
--------	---------------------------------	----------

双冠鸬鹚(Double-crested Cormorant)

常见于河流、淡水湖和海岸上，横穿头部的两个冠，仅在炫耀时竖起一段很短的时间，十分少见；潜入水中游泳、捉鱼时，以有蹼的大脚推动；巢群位于海岸上或是在广大内陆的水域旁。

- 巢 位于树上或岩石突出处，由细枝条构成的大平台。
- 地理分布 繁殖区由阿拉斯加和纽芬兰南部到墨西哥和古巴的中部。北方种群在此范围内向南迁移。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 鸬鹚科	学名 <i>Phalacrocorax carbo</i>	身长 91 厘米
--------	-------------------------------	----------

鸬鹚(Great Cormorant)

广布全世界，可在湖泊、河流、港湾和沿岸水面等任何大片水域发现它；在水中取食时游得很低，常凝视水面确定鱼的位置后再潜水追捕猎物，然后将鱼带到水面，吞进宽大的咽喉。与其他种鸬鹚一样，羽毛的防水性差，所以经常可看见站立着将翅膀伸开晾干；振翅飞翔，偶尔滑翔，飞行平稳；繁殖时，胁腹和头部有白色斑，羽色富有光泽。

- 巢 由海草和碎石构成的巨型杯状巢，位于平坦的岩石或悬崖突出处，或位在树上用枝条筑成。



地理分布图





- 地理分布 北美洲东部、欧亚大陆大部分地区、非洲部分地区、亚洲南部和东南部、大洋洲部分地区。


羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 鸬鹚科	学名 <i>Phalacrocorax gaimardi</i>	身长 75 厘米
红腿鸬鹚(Red-legged Cormorant) 喙细长狭窄，在眼睑的周围有星状斑，背和翅有白色斑点；由于游泳时羽毛湿润，所以除了颈部的白斑外，看上去全都是黑色的；拱起身体潜水时，露出鲜红的腿部是其识别特征；栖息于靠海岸的水域，虽不擅与同种群居，却与其他种鸬鹚和鲑鸟混群取食、休息；以鱼、鱿鱼和甲壳动物为食，成对或集小群繁殖，繁殖期的头部羽毛间会长出白色的头发状羽毛。 · 巢 位在岩洞隐蔽处的岩石突出部分，低矮的海草堆。 · 地理分布 南美洲从秘鲁到智利南部的太平洋海岸和岛屿，绕过南美洲南端到阿根廷的大西洋海岸。  地理分布图  亚成鸟 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 蛇鹈科	学名 <i>Anhinga anhinga</i>	身长 90 厘米
蛇鹈(Anhinga) 特征为头小，喙直，颈细长，因而别名蛇鸟；与鸬鹚外形相似，不同之处为颈和尾较大，喙尖不带钩；栖于淡水沼泽，潜水捕鱼，取食时用喙将鱼刺穿，然后带到水面吞食；和鸬鹚一样会伸展翅膀晾干羽毛。 · 巢 树上由枝条搭成的平台。 · 地理分布 由美国东南部延伸到巴西南部 and 阿根廷北部。  地理分布图   雌鸟		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 部分迁徙

科名 军舰鸟科	学名 <i>Fregata minor</i>	身长 100 厘米
军舰鸟(Great Frigatebird) 常在风中展翅翱翔飞越海岸和海洋，取食时，从天空猛冲向海中捕鱼，或像海盗一样袭击，迫使其它海鸟吐出食物供自己享用。繁殖时，雄鸟以红色的喉囊充气鼓大炫耀。 · 巢 低矮的灌丛或树上由细枝搭成的简易平台，通常位于岛上。 · 地理分布 沿美洲中部、巴西南部、非洲东部、亚洲东南部和澳大利亚北部的海岸线、太平洋、大西洋南部和印度洋上的岛屿繁殖。  雌鸟  地理分布图  长而有钩的喙		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 部分迁徙

科名 鹭科	学名 <i>Ardea cinerea</i>	身长 97 厘米
苍鹭(Grey Heron) 体型巨大，灰色，常可见其在湖边、池边或沼泽地，警觉地伸颈站立。取食时会丝毫不动地站着，或慢慢地涉水张望，弯曲的颈使其头部能迅速向前伸出，捉住鱼及任何小动物；飞行时头向后缩进肩膀，腿伸出，扇动宽大的翅缓缓飞翔，通常很安静，但偶尔也发出刺耳的叫声。 · 巢 由枝条堆成的平台，每年都会添加巢材。 · 地理分布 欧亚大陆、非洲。		
 地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 鹭科		学名 <i>Ardea herodias</i>		身长 127 厘米	
大青鹭(Great Blue Heron) 美洲鹭中最大的一种，出现于淡水和咸水栖息地，在水流缓慢的沼泽和死水中猎食鱼、蛙和其他生物，有时也涉入齐腹深的水中找鱼，或在陆地上的开阔地区，潜近或站着不动守候，捕食鼠、地鼠等动物。 · 巢 位于树上、灌丛中或沼泽地面，由枝条构成的浅平台。 · 地理分布 在中北美洲的大部分地区繁殖，北方种群向南迁移越冬，最远迁徙至委内瑞拉。 · 附注 纯白型的大白鹭出现在加勒比海和美国东南部。  地理分布图		 亚成鸟 			
羽色 雌雄相似		栖所   		迁徙 部分迁徙	
科名 鹭科		学名 <i>Egretta novaehollandiae</i>		身长 65 厘米	
白面鹭(White-faced Egret) 体形细长，常笔直站立；出现在岸边礁石上、海滨泥地、河流、湖泊、沼泽和草地，常在地上或水中缓慢行走，时而停下守候或啄刺猎物，以鱼、蛙、虾为食，有时也吃蜥蜴和小鸟，以及活动区域的蝗虫和害鼠；和许多鹭一样，有时会建立暂时的取食领域，防止其他同类进入；宏亮的叫声为单一的“呱呱”声，也能发出低沉的喉音；在非繁殖季常出现在开阔地面，但繁殖期将巢筑在树上，然后立在巢旁，将头、颈、背上长而尖的羽毛竖起炫耀，一对或数对结合成松散群巢。 · 巢 位于树上，由枝条和细枝构成，顶部中间有浅凹。 · 地理分布 新几内亚南部、新喀里多尼亚、澳大利亚和新西兰。  地理分布图		 典型的直立姿势  亚成鸟 			
羽色 雌雄相似		栖所    		迁徙 不迁徙	

科名 鹭科	学名 <i>Ardea goliath</i>	身长 150 厘米
-------	-------------------------	-----------

巨鹭(Goliath Heron)


全世界最高大的鹭，出没在大湖和沼泽的边缘，涉水比其他鹭深得多，栖息于泥滩、美洲的红树林、河流和纸莎草沼

泽地，在非繁殖季单独或成对生活。有每天到同一地区取食的倾向，常在热带水域浓密的漂浮植被中猎食，或涉入齐腹深的开阔水域，缓缓接近或站着不动守候猎物，攻击前先放低身体、头颈向后弯曲，蹲伏在水面上，颈上有纽结能使颈立刻伸直，使头向前探，鱼、蛙、小型哺乳动

物、爬行动物和无脊椎动物多被其利喙刺穿，或被夹入喙中；下腹有特殊的绒毛斑，巨鹭将

喙插进羽毛中，将这些绒毛分解成粉末，粉末吸收鱼的粘液，再用中前趾上的梳状爪将两者一同清除，这是理羽的一部分过程。叫声低沉、音调重复而沙哑；飞行缓慢而笨重，腿略微下垂；通常成对筑巢，有时筑于其他鸟类混合群的边缘。

- 巢 筑于沼泽植物、灌丛、低树的顶部，或地面上用由枝条和芦苇茎构成的平台。
- 地理分布 非洲部分地区、阿拉伯半岛和印度半岛。



地理分布图



亚成鸟



羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鹭科	学名 <i>Egretta thula</i>	身长 60 厘米
-------	-------------------------	----------

雪鹭(Snowy Egret)

以羽色纯白，头、颈、背上悬有漂亮的饰羽而闻名；繁殖季节，雌雄两性在巢边将饰羽竖起彼此炫耀，非繁殖期，仅见黑喙和鲜黄色腿部；主要生活于淡水或咸水沼泽中，白天取食，四处找寻鱼和任何小沼泽动物为食，或用脚探索，或扰动水底的猎物；成群栖于树上，在树上筑群巢。

- 巢 筑于树上，由枝条和细枝构成平台。
- 地理分布 北从美国，南至智利南部繁殖；北方和南方种群向温暖地区迁移越冬。



地理分布图



亚成鸟

· 附注 19 世纪末几乎被猎捕灭绝，导致公众抗议，而开始成立鸟类保护组织。




羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 鹭科	学名 <i>Bubulcus ibis</i>	身长 50 厘米
-------	-------------------------	----------

牛背鹭(Gattle Egret)

小而健壮，短颈，喙粗大；特征是时常可见其在开阔地的牛群中行走，捕捉牛用脚赶起的昆虫，啄食从牛身上飞起的蝇类，并不时飞到牛身上停歇；除昆虫外也捕食任何能发现的小动物，在树上或靠近水边的地上集群栖息，筑群巢于树上、灌丛、芦苇或沼泽中，以及岩石岛屿上。

- 巢 筑于树上，由枝条和芦苇茎构成的浅杯状巢。
- 地理分布 南北美洲，欧洲南部及非洲、亚洲和大洋洲。



地理分布图



繁殖羽



羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鹭科	学名 <i>Butorides virescens</i>	身长 46 厘米
-------	-------------------------------	----------

小绿鹭(Green Heron)

生活于咸水或淡水的密致植被中，很容易被忽略；取食时安静地在水边等候，捕捉鱼、蟹和其他水生动物；有时会将一些小物体放在水上作为“诱饵”引诱鱼类，具有取食领域，防卫同类进入。

- 巢 树上、灌丛、水边，或悬于水上的枝条和芦苇构成的薄平台。
- 地理分布 在中北美洲繁殖，越冬区从美国西部和南部到南美洲北部。




地理分布图



短颈

末端尖细的羽毛

亚成鸟


羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 鹭科	学名 <i>Nycticorax nycticorax</i>	身长 65 厘米
-------	---------------------------------	----------


夜鹭(Black-crowned Night-heron)

体形小而粗壮，夜间在沼泽中猎食，常整个白天与同类一起集群栖息；以昆虫、鱼、蛙为食，有时偷袭雏鸟，鸣声为深沉的“呱呱”声。

- 巢 筑于树上、灌丛或芦苇丛上，由枝条构成轻而薄的平台。
- 地理分布 除了北美洲北部、欧亚大陆北部和大洋洲以外，世界各地都有分布。



地理分布图




对称的头羽

短颈

短而强壮的腿

亚成鸟

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 鹭科	学名 <i>Cochlearius cochlearius</i>	身长 50 厘米
-------	-----------------------------------	----------

船嘴鹭(Boat-billed Heron)

除喙较宽阔外，外形看似夜鹭；喙触觉灵敏，能在黑暗中感觉猎物，只要一接触鱼、虾和昆虫等小生物，喙就会张开来吸入水流，猎物随之而入，故适于在黑暗的夜间猎食；生活在河口沼泽区的红树林、淡水湖、咸水湖和沼泽中，成对或集小群在树上或灌丛中栖息、筑巢。

- 巢 筑于红树林或其他沼泽树上，由细枝构成的简单平台。
- 地理分布 从墨西哥到阿根廷北部。



地理分布图





适于夜间猎食的大眼

亚成鸟

羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鹭科	学名 <i>Tigrisoma lineatum</i>	身长 75 厘米
-------	------------------------------	----------

栗虎鹭(Rufescent Tiger-heron)

亚成鸟醒目黑黄相间的羽色，以及成鸟的斑纹是其名字的由来；在广阔的热带雨林中常可发现，生性胆怯，在水流缓慢的沼泽中或低地河边，以及红树林中活动，主要在夜间取食，独自慢慢潜行或丝毫不动等待虾和昆虫；受干扰时常站立不动，以避免暴露行踪，但如被迫须离开隐蔽处，就会藏身于树林中。

- 巢 通常筑于树上的高处，由细枝和植物茎构成简单的平台。
- 地理分布 从洪都拉斯东部到巴拉圭和阿根廷北部。



地理分布图





粗大的喙

伪装用的羽色

绿色的长腿

亚成鸟

成鸟


羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鲸头鹳科	学名 <i>Balaeniceps rex</i>	身长 120 厘米
---------	---------------------------	-----------

鲸头鹳(Shoebill)

与鹳外形相似，大而具钩的喙十分容易识别，仅分布在非洲东部和中部的淡水沼泽中。单独或成对生活，大多停留在小面积的沼泽地里；喜欢在植被茂密的深沼泽、河流或湖泊中捕食，有时也在湿草地或较浅的水中觅食，取食时，以长而直的脚步来分散体重，小心翼翼地缓步行走，常跨过漂动的水生植物，并常停下来守候猎物，一发现水中有肺鱼、鲶鱼、蛙、水蛇和小甲鱼，就伸长颈部、翅膀和全身，趋前往水中戮击，由于常随着猎物衔起一大团水草，而不得不翻转喙部，使食物从水草中分离。飞行中头部缩回肩上，腿后伸，用力振翅，飞翔缓慢而有力，也会借助上升气流盘旋翱翔到一定的高度；繁殖期成对单独活动，在水面上较高的植被中筑巢；曾发现亲鸟在炎热天气里用喙将水带回，喷洒在雏鸟身上。

- 巢 较大型的 platform，用灯心草、草本植物和树叶筑成，通常巢的最底部位于水中，四周植被茂密。
- 地理分布 非洲的淡水沼泽地中，从苏丹南部延伸到赞比亚和扎伊尔东南部。



飞行中的成鸟



地理分布图

冠部具一小撮羽毛

头部巨大

典型的直立姿势

双翅大而宽

长脚趾可以分散体重

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 槌头鹳科	学名 <i>Scopus umbretta</i>	身长 50 厘米
---------	---------------------------	----------

槌头鹳(Hamerkop)

喙和羽冠形成锤头的形状，十分易于识别。在河流、湖泊以及沼泽边缘的浅水中，捕食两栖类、小鱼和其他水生生物。通常成对或以小家族的形式出现，常待在固定的区域内，但在干季时也会游荡到较远处。飞行时腿向后伸，综合扇翅和滑翔的动作，扇翅时颈部向后缩，滑翔时则向前伸展。

- 巢 筑于靠近水边、水面的树枝上或悬崖峭壁，由树枝堆成的大型巢，形似炉灶，前端有小出口，巢里衬泥土。

- 地理分布 非洲和马达加斯加岛。



地理分布图



羽冠向后延伸

飞行中的成鸟

大而宽的翅膀

羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鹳科	学名 <i>Mycteria americana</i>	身长 102 厘米
-------	------------------------------	-----------

林鹳(Wood Stork)

与朱鹭相似的大型鹳，常见于林木茂盛的沼泽地中，在树上栖息和筑巢。走路安详沉静，缓慢而从容地扇翅飞翔。在泥塘、沼泽、湿草地中捕食鱼、甲壳类、软体动物和昆虫，能以喙在泥浊的水中感觉水中动物而捕捉猎物。

- 巢 位于树冠顶部，用树枝筑成的薄平台。
- 地理分布 从美国东南部、墨西哥，纵贯美洲中部和南部直达阿根廷。



地理分布图



亚成鸟



头部裸露，浸入泥水中觅食时会弄湿羽毛

翅端呈黑色

羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 鹳科	学名 <i>Mycteria leucocephala</i>	身长 102 厘米
-------	---------------------------------	-----------

白头鹳(Painted Stork)

翅和背部呈粉红色，翅的内侧有微细的交错状小方格纹，是其识别特征。出没在淡水湖泊、沼泽和稻田里，涉水时会把喙半张开，在水下来回摆动，一旦碰到了鱼、蛙和其他小生物，马上咬紧不放，这种取食方式尤其适合在混浊的泥水。白天在食物资源丰富的地区成群觅食，晚上集群栖息。通常在水生或水边的树上营群巢，巢群密布在相邻处，常和其他的鹳、白鹭和鸬鹚共用筑巢地区。

- 巢 由树枝构成的大平台，中间凹陷，位于树上。
- 地理分布 印度半岛、中国大陆西南部和亚洲东部的部分地区。

头部裸露，浸入泥水中
取食不会弄湿羽毛

喙下弯

翅内侧的方格纹

翅外侧呈粉红色

用以涉水的长腿

亚成鸟

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 鹳科	学名 <i>Ciconia ciconia</i>	身长 115 厘米
-------	---------------------------	-----------

白鹳(White Stork)

在溪流、池塘和沼泽的浅水中漫游，捕食蛙和其他小型生物，也会在草地和稻田里觅食。飞翔缓慢，扇翅连续而有规律，偶尔伸展腿和颈滑翔，特别是在迁徙时，也会在上升气流中盘旋翱翔到一定的高度。繁殖时成对或成小群各自分散，然后成群地迁徙越冬。

- 巢 较大的树枝平台，中间凹陷，内衬根茎和青草，位于树木或建筑物上。
- 地理分布 繁殖地分散于欧洲到印度北部，越冬区为非洲的部分区域、巴基斯坦和印度。

典型的飞行姿势

喙红色

翅膀宽而圆

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 鹳科	学名 <i>Leptoptilos crumeniferus</i>	身长 150 厘米
-------	------------------------------------	-----------

非洲秃鹳(Marabou Stork)

生活在草地和沼泽中，偶尔靠近人类居住区。以各种动物的尸体为食，有时与兀鹰争夺食物，有时在垃圾堆中寻食，也捕食昆虫、鱼、鼠和鸟等活的猎物，会偷袭红鹳的蛋、雏鸟和成鸟。裸露的头部使它在取食腐肉等较脏的食物时不会弄脏羽毛，裸露的颈部下方悬吊着膨胀的肉垂，用于求偶时进行炫耀。飞翔时沉重而缓慢地扇动翅膀，并借助上升气流翱翔到一定的高度。成群栖息营巢，炫耀时，规律而缓慢地抬头和低头，并发出呼噜声和噓声。

· 巢 为群巢，筑在树木或悬崖上，由大量的树枝构成，中央凹陷，内衬细枝和绿叶。

· 地理分布 撒哈拉以南的非洲大部分地区。



羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鹳科	学名 <i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>	身长 145 厘米
-------	---	-----------

凹嘴鹳(Saddle-billed Stork)

身材高挑，腿长，喙宽壮且颜色鲜艳。出没在水域中，有时站在水中用力啄击其所见到的鱼，有时在水生植物间行走随意戮击，有时在浊水中以喙来回摆动，靠触觉捉鱼，偶尔也以脚搅拌浊水以惊扰鱼类。成对分散在树上栖息、筑巢，求偶炫耀时，会展翅奔跑，露出带有斑纹的羽毛。

· 巢 由树枝构成平台，内衬以芦苇、苔草和泥土，通常位于水边的灌丛或树上。

· 地理分布 撒哈拉沙漠以南的非洲地区。

· 附注 雌鸟眼睛上有黄色虹膜，一般身高约为 130 厘米，比雄鸟略小。




地理分布图



喙上有黄色斑纹

腿关节呈红色，与众不同

雌鸟

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 朱鹭科	学名 <i>Threskiornis aethiopicus</i>	身长 75 厘米
--------	------------------------------------	----------

黑腰朱鹭(Sacred Ibis)

喙向下弯曲，通常出现在沼泽地、河流或湖泊边，也在草地(尤其是被火烧过的)、农田甚至城镇边缘的垃圾堆中，大多只待在土壤和泥中探取食物，捕食各种小动物、鸟类的蛋和雏鸟，也吃腐肉和禽畜的内脏，取食范围十分广泛。翅膀很宽，顶端呈黑色，飞翔时颈部伸长，拍翅与滑翔交替进行，成群飞翔时通常排成 V 字形。在觅食和栖息时组成大小不一的群体，并且筑密集的群巢。幼鸟不具长喙，直接从亲鸟的喉部取食。

· 巢 位于树上、灌丛中或地面上，由嫩枝和树枝构成的平台，内衬草和树叶。

· 地理分布 撒哈拉南部南也门北部和伊拉克南部。

· 附注 古埃及人视其为圣物。



地理分布图




秃头，头颈为黑色

背部有饰羽

亚成鸟

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 朱鹭科	学名 <i>Eudocimus ruber</i>	身长 60 厘米
美洲红鹮(Scarlet Ibis) 羽色鲜红，总是成群地在沙滩、咸水湖、红树林和沼泽里觅食，并一起在沼泽中的大树上过夜，因此十分显眼。喙细长弯曲，以泥滩中的蟹类、软体动物和沼泽地中的小鱼、蛙和昆虫等小动物为食；叫声高亢而忧伤。 · 巢 通常位于水面上方，筑于树顶的平台，由树枝堆成，筑群巢。 · 地理分布 南美洲东北部，从委内瑞拉到巴西南部的海岸和沼泽地中。		
 全身羽毛为鲜红色 喙弯曲，便于探取食物 翅端黑色 半蹼足  亚成鸟  地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙

科名 朱鹭科	学名 <i>Platalea leucorodia</i>	身长 90 厘米			
琵鹭(Eurasian Spoonbill) 具优雅冠羽的大型白色涉禽，出没水草和其他植被稀少、底部宽浅具泥沙的水域中；常成小群在海边、咸水湖、湖泊和洪水冲击过的沼泽地中活动。喙端宽平，经常伸长颈部用喙在水中来回摆动，涉水时会把喙微微张开，捕捉小鱼、甲壳类和水生昆虫等水生动物。飞翔时将颈和腿伸展开来，缓慢而有节奏地扇翅，交替着滑翔，有时也在上升气流中翱翔。 · 巢 由芦苇、树枝和草构成，位于芦苇丛或海岸沼泽的地面上，亦有由树枝和植物茎干构成的树上平台。 · 地理分布 繁殖于欧亚大陆和非洲西南部的部分地区，在非洲、印度半岛、中国的部分地区和亚洲东南部过冬。  地理分布图  冠羽下垂 喉部裸露 全身羽毛呈白色 用以涉水的长腿 亚成鸟  <tr><td>羽色 雌雄相似</td><td>栖所   </td><td>迁徙 迁徙</td></tr>			羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 迁徙
羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 迁徙			

科名 朱鹭科	学名 <i>Ajaia ajaja</i>	身长 80 厘米
--------	-----------------------	----------

粉红琵鹭(Roseate Spoonbill)

裸露的绿色头部和玫瑰色羽毛，使它的外貌既漂亮又奇特。粉红琵鹭通常成群在海边的浅水区，与长满红树的河湾、咸水湖、洪水冲击过的沼泽和泥地中涉水，并用前端宽平的喙在水中来回摆动，捕捉偶然碰触到的小鱼。

- 巢 筑在树顶的群巢，由树枝构成，内衬树叶，比较脏。
- 地理分布 从美国南部到阿根廷中部。

头部的绿色裸皮

喙宽而平

红色翅斑

亚成鸟

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 叫鸟科	学名 <i>Chauna torquata</i>	身长 91 厘米
--------	---------------------------	----------

冠叫鸭(Southern Screamer)

体形大小似鸭，生活于沼泽和湿草地上。头小脚大，十分不成比例。喙小而具钩，用以取食树叶、芽以及绿色植物。翅大而宽，前缘的骨质刺向前突出，是与对手和捕食者争斗的武器。飞翔有力，有时在上升气流中盘旋翱翔，可以达到相当的高度。因飞翔或行走时经常发出尖厉的鸣叫声，因此称叫鸭。

- 巢 由树枝和芦苇构成，位于浅水中或接近水边。
- 地理分布 从巴西南部到阿根廷中部。

头小，具钩状喙

休息时把一只腿藏在羽毛下

尾呈方形

脚大趾长

飞行中的成鸟

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------


科名 红鹤科	学名 <i>Phoenicopterus ruber</i>	身长 145 厘米
--------	--------------------------------	-----------

红鹤(Greater Flamingo)


高而细长，生活在浅湖中或海岸边。专门在含盐度较高的湖中取食，这种水域食物丰富，食物体积较小，多为昆虫、小虾以及矽藻和海藻等，足以养活成群的红鹤。在浅湖中涉水时，会伸长颈部用向上翘的喙在水中滤食，当水流经喙中的梳状薄片时，小动物就被滤下。由于其取食的湖泊少，而且间隔很远，因此它们通常聚集成群，从一个取食地迁移到另一个。

· 巢 顶端凹陷的锥形土堆，密布在河滨泥滩和盐水湖边。

· 地理分布 加勒比海、非洲、欧洲西南部和亚洲，断续分布。



地理分布图



钝而弯的喙

全蹼足

雏鸟
全身具
绒毛，
喙已长出



用于炫耀的羽毛
可伸展开

翅膀
折起



飞行中的成鸟



亚成鸟

羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 雁鸭科	学名 <i>Anseranas semipalmata</i>	身长 85 厘米
--------	---------------------------------	----------

鹊鹅(Magpie - goose)

羽色黑白相间，栖息在热带沼泽、河流和湖泊中。长得很高，长腿和直立向上的姿势是鹅类的特征，而半蹼足在鹅类中少见，大而坚实的喙适于挖掘，雄性头顶凸起呈半球状。繁殖后会几千只聚集成群，在草地和农田中游荡取食，或涉水取食沼泽植物的根和种子。受惊吓时会飞起停在光秃的树上，飞行时，宽阔的翅膀缓慢而有规律地扇动。

- 巢 筑于芦苇茎部的平台，位于浅水中。
- 地理分布 澳大利亚和新几内亚南部。

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 雁鸭科	学名 <i>Dendrocygna eytoni</i>	身长 60 厘米
--------	------------------------------	----------

尖羽树鸭(Plumed Whistling - duck)

身体直立，体态苗条，颈和腿均长，此为鸭类的典型特征。飞翔时，头和颈伸直，并稍稍下垂，看上去有些驼背。配偶终生生活在一起，群居，常在水边聚集成群喧哗；当生活的湿地呈季节性干旱时，则迁徙到另一个地区。在干燥地面上取食树叶、草籽和生长在洼地的植物，干旱季节也取食沼泽地的苔草和灯心草。

- 巢 通常隐蔽在离水较远的灌木丛中，筑于地面的凹陷处，内衬草类，亦有的位于植被当中。
- 地理分布 澳大利亚北部和东部。
- 附注 成群聚集时，彼此间会发出响亮而尖厉的叫声，英文俗名由此而来。

地理分布图


羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 雁鸭科	学名 <i>Cygnus olor</i>	身长 152 厘米
--------	-----------------------	-----------

瘤鹄(Mute Swan)

淡水湖泊和河流栖息地中，最大、最重的游禽。成鸟具红色的喙，亚成鸟的喙则呈灰色，与他种天鹅的黄色喙明显不同。流线型的身体，利于游泳，腿短而粗壮，颈部长而易弯曲，可以伸入水中取食水生植物和根。常在水中游动寻食，在陆地上行动笨拙，因此从不冒险远离水面。翅端渐尖，飞翔时颈部前伸。非繁殖期，在湖面、河湾和河湖上聚集成群；配偶终生生活在一起，筑巢期间有强烈的领土意识，严禁其他天鹅进入。天性安静，不曾发出呼噜、嘶嘶和沙哑的声音。

- 巢 位于小岛、湖滨、河流与小溪边的芦苇丛里，由植物的根、茎、叶筑成底座。
- 地理分布 散布于欧亚大陆，已引入北美洲、南非、澳大利亚和新西兰等地区。



地理分布图



羽色 雌雄略有不同	栖所  	迁徙 不迁徙
-----------	--	--------

科名 雁鸭科	学名 <i>Anser anser</i>	身长 90 厘米
--------	-----------------------	----------

灰雁(Greylag Goose)

通常在河流、湖泊和沼泽中游动，有时也在草地和牧场上行走奔跑。体形强壮，喙短而坚实，用于撕扯茎叶、挖掘树根。飞行有力，露出翅膀上的蓝灰色覆羽，呈直线飞行，常排成 V 字形队伍。生性机警多疑，稍遇干扰就会发出响亮而粗厉的警报声。

- 巢 地面浅凹，内衬树叶，用绒羽将内部垫成杯形。
- 地理分布 除俄罗斯北部和西伯利亚北部之外，遍布欧亚大陆，往南到非洲北部、伊朗、印度和中国过冬。
- 附注 白色的家鹅即是由灰雁驯化而来。



地理分布图




东部型

颈部的带纹

西部型




羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 雁鸭科	学名 <i>Anser caerulescens</i>	身长 70 厘米
--------	------------------------------	----------

雪雁(Snow Goose)

繁殖于北极苔原地带的沼泽中，挖掘根和地下茎为食，也食取树芽和树叶，群居，甚至繁殖期时，各对配偶间也距离得很近。繁殖后成群迁徙到沼泽地和海滨过冬，有时群集成数千只，鸣叫声为粗糙的“咯咯”声。

- 巢 地上的天然浅窝，呈杯状，内衬树叶。
- 地理分布 繁殖于北美洲的北极地区，南至墨西哥过冬。
- 附注 有白色型和蓝色型(身上有灰羽和蓝羽)两种色型。



地理分布图



蓝色型

喙短而有力



羽色雪白

白色型



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 雁鸭科	学名 <i>Anser canagicus</i>	身长 65 厘米
--------	---------------------------	----------

皇雁(Emperor Goose)

身体浅黑色，头部白色，在近北极苔原地带的海岸边繁殖，以家族群居于滨海的岩石岛屿上过冬。食物包括绿色植物、海藻、贝壳类。

- 巢 内衬绒毛和苔藓的浅窝。
- 地理分布 繁殖于阿拉斯加和西伯利亚海岸苔原，过冬时南移到美国西部和堪察加半岛。
- 附注 由于长期浸入水中取食，头部和颈部有时会被水中的铁盐染成桔黄色。

亚成鸟 桔色染斑

身体笨重 短腿

条纹状的羽色

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 雁鸭科	学名 <i>Branta canadensis</i>	身长 115 厘米
--------	-----------------------------	-----------

加拿大黑雁(Canada Goose)

体色以浅黑色为主，脸上和胸部具白斑。原生活在苔原和大草原，但近几十年来积极地寻找新的繁殖区，已扩展到林地中的淡水地带及城镇等容易取得青草和低矮植物为食的地区；通常在离地不远处飞行，成群排成 V 字形队伍，并发响亮的叫声。

- 巢 位于近水干旱陆地上的天然凹陷，内衬青草和绒羽。
- 地理分布 繁殖于北美洲和西伯利亚东部，南移到新墨西哥州、中国东部和日本过冬，已被引入欧洲西北部。
- 附注 有数个不同的亚种，其中一些略大于绿头鸭（见 79 页）。

颌部的白色带纹

尾部覆羽呈白色 腿短而有力

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 雁鸭科	学名 <i>Branta ruficollis</i>	身长 55 厘米
--------	-----------------------------	----------

红胸黑雁(Red-breasted Goose)

十分稀有的北极候鸟，在山地的苔原地带繁殖，以青草和苔草为主食，也吃阔叶植物、根、块茎，冬天则取食谷物。飞翔的队形呈斜线或参差不齐，与他种雁类的 V 字队形迥异；常发出粗糙而尖厉的双音节叫声。

- 巢 位于凸起的地面上，洞内衬绒羽和羽毛。
- 常筑巢于游隼(见 105 页)巢的附近，因为游隼会攻击那些靠近巢边，试图偷袭黑雁及其雏鸟的捕食者，因此反而提供了保护。
- 地理分布 于西伯利亚的极地繁殖，在黑海、里海和咸海附近过冬。
- 附注 因在过冬区被过度捕猎，目前已处于绝种边缘。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 雁鸭科	学名 <i>Alopochen aegyptiacus</i>	身长 75 厘米
--------	---------------------------------	----------

埃及雁(Egyptian Goose)

生活在沼泽、湖泊、河流中，有时游泳潜水，但大多在陆地上活动，啄食青草、植物的叶和种子、谷物，偶尔也吃昆虫；雄鸟的叫声轻柔而沙哑，雌鸟则是如喇叭般的“嘎嘎”声。配偶终生生活在一起，繁殖期过后聚集成群，在树林中过夜。

- 巢 植被下的地面、悬崖、岩石、树洞。
- 地理分布 尼罗河上游河谷地带及撒哈拉以南的非洲地区，已引入英国。
- 附注 虽称为雁，但实际上是麻鸭的一种。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------


科名 雁鸭科	学名 <i>Tadorna tadorna</i>	身长 68 厘米
花凫(Common Shelduck) 羽毛由黑、白、栗褐三色间杂，冬季在河湾和河滨的泥地上群集生活，也出没在内陆半干旱地区的盐水湖中。在潮间带的泥滩或浅水中，捕食小的水生贝壳、甲壳动物及昆虫的幼虫，也吃水草。在内陆筑巢，但雏鸟一孵出后就被带到水边，繁殖期过后，成鸟群聚迁徙，以完成一年一度的换羽，由于在换羽期丧失飞翔能力，都在远离大海的泥滩等安全地带换羽，以避免捕食者。 · 巢 树上或河堤上、灌丛下的洞穴，内衬绒羽。 · 地理分布 在欧洲南部、西北部、亚洲中部、中国北部和西伯利亚东部等地繁殖，南到非洲西北部、巴基斯坦和中国西南部过冬。  地理分布图   		
羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 部分迁徙

科名 雁鸭科	学名 <i>Nettapus auritus</i>	身长 33 厘米
厚嘴棉凫(African Pygmy Goose) 生活在池塘和咸水湖中，以睡莲种子为食，也吃水面或水中的植物、昆虫和鱼，很少走动，大多待在水里，用短腿游泳，栖息在飘浮的树干和树枝上。 · 巢 位于树木、白蚁冢和悬崖上的洞穴，内衬白色的绒羽。 · 地理分布 撒哈拉以南的非洲大陆和马达加斯加岛。  地理分布图   		
羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 部分迁徙/四处游荡

科名 雁鸭科	学名 <i>Aix sponsa</i>	身长 47 厘米
--------	----------------------	----------

林鸳鸯(Wood Duck)

生活在林木茂盛的湖泊和河流中，取食橡树子、坚果、种子、绿色植物和小型无脊椎动物，是少数几种能在树枝上栖息、筑巢的鸭类之一。幼鸭一孵出，就在母鸭叫声的呼唤下，跳出巢中，随着母鸭到水中活动。



· 巢 树洞或巢箱，内衬绒羽。

· 地理分布 南
到古巴的北美
洲地区。



雌鸟



地理分布图



羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 雁鸭科	学名 <i>Aix galericulata</i>	身长 47 厘米
--------	----------------------------	----------

鸳鸯(Mandarin Duck)

胆小的林栖鸭类，白天在高出水面的灌丛中休息，黄昏则在林地边的溪流和湖泊中取食。雄鸟头部有浓密弯曲的冠羽，翅内侧为大片的桔黄羽色，喜在阔叶林地，尤其是栎树林中活动。取食栎树的坚果，其他植物的种子、坚果、蜗牛、昆虫和小鱼等。



雌鸟

· 巢 树洞内衬绒羽，位于水面。

· 地理分布 繁殖于亚洲东部，南移到中国南部过冬。

· 附注 被引入英国当观赏鸟，使该地成为全世界鸳鸯种群的重要分布地。



地理分布图



羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 雁鸭科	学名 <i>Anas crecca</i>	身长 37 厘米
--------	-----------------------	----------

绿翅小水鸭(Common Teal)


经常在浅水塘中活动的小型游禽，由于被沼泽植被遮掩，因此不易被发现；受惊扰时会由水面急速飞起，露出绿、白、黑三色相间的翼斑；冬天以种子为主食，夏天则吃小动物；与其他生活在水中的鸭类一样，雄鸟能够发出哨声，而雌鸟只能“嘎嘎”地叫。

· 巢 干燥草地上的浅窝，内衬绒羽，位于沼泽植被中。

· 地理分布 繁殖于美洲和欧洲，南移到中美洲、美洲、印度和亚洲东南部过冬。



地理分布图



羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 雁鸭科	学名 <i>Anas platyrhynchos</i>	身长 58 厘米
--------	------------------------------	----------

绿头鸭(Mallard)

出没在内陆所有的水域，不受人干扰和环境改变的影响，偏爱植被茂盛的地区。取食时把喙伸到水中，当水流经喙时，水中的种子、树叶、昆虫就会被喙内的梳状薄片滤出。可以把身体倒立，也会潜到水底淤泥或水草中寻找食物，有时在陆地上取食。

· 巢 位于地面或断裂在地的树干，内衬茎、叶、羽毛的浅窝。

· 地理分布 繁殖于欧亚大陆和北美洲大部分地区，南到墨西哥、非洲北部和亚洲东南部过冬。

· 附注 许多农场饲养的鸭类，都是由绿头鸭驯化而来的。



地理分布图



羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 雁鸭科	学名 <i>Anas acuta</i>	身长 65 厘米
--------	----------------------	----------

北方尖尾鸭(Northern Pintail)

体形瘦长，雄鸟具细长的尾羽，飞行快速，翅膀发出“嗖嗖”的响声。成对或聚集成小群，出没在开阔的浅水地带，芦苇丛或植被较高的沼泽中则较少见。白天在水面上休息，晚上潜入水中，倒立取食水底植物的根、种子和块茎，有时也在岸上或水面寻找种子和小动物，冬天常迁移到海边。



· 巢 内衬植物和绒羽的洞穴。

· 地理分布 繁殖于北美洲和欧亚大陆，南移到中美洲、非洲和印度过冬。



尾长而渐细

雌鸟



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 雁鸭科	学名 <i>Anas cyanoptera</i>	身长 40 厘米
--------	---------------------------	----------

桂红鸭(Cinnamon Teal)

雌雄两性都具有亮蓝色的前翅斑，飞行时会展露出来。繁殖期的雄鸟以鲜艳的红褐色羽毛炫耀，栖息于浅而湿软的内陆水域和流速缓慢的河流边，取食漂浮在水面上的种子和昆虫幼虫，在具有较高植被的沼泽地中繁殖。

· 巢 植物堆上压成的凹陷，内衬绒羽，隐藏在矮树丛中。

· 地理分布 繁殖于北美洲西部、加拿大安大略省西部、中美洲和南美洲的部分地区，南北种群都有迁徙的习性。



蓝色的翅斑



地理分布图



雌鸟



羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 雁鸭科	学名 <i>Malacorhynchus membranaceus</i>	身长 42 厘米
红耳鸭(Pink-eared Duck) 栖息地较干旱，藉雨后短时积水、有小生物的地区来维持生存。在浅水处张开喙，像拖网一样于水中来回摆动，利用喙端特化的垂瓣来汲水，使水流过喙中的细薄片，水从两侧排出前滤出可食的小生物，当积水变干时，就开始游荡寻找新的取食地。 · 巢 树枝或断裂树干上的洞，内衬绒羽。 · 地理分布 澳大利亚东部和西部，主要分布于东南部。  地理分布图  · 粉红色的耳斑 · 垂在喙上的肉瓣 		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 四处游荡

科名 雁鸭科	学名 <i>Aythya valisineria</i>	身长 53 厘米
美洲矶雁(Canvasback) 生活在湖泊、河流、河湾和海滨等开阔水面上，喙和前额形成倾斜的角度，双腿强壮并且长得很开，有利于潜水。常潜入水中取食水生植物和水生贝壳类动物，潜水深度可达 9 米。性群居，冬天一大群聚集，常在内陆草原上的池塘和沼泽等小范围的水域营巢，繁殖后迁到河湾或海洋，飞翔有力而迅速，成群呈斜线队形。 · 巢 位于地面上，由干燥的芦苇和苔草堆成，内衬绒羽。 · 地理分布 加拿大北部和美国西部，南到墨西哥过冬。  地理分布图  · 前额长而倾斜  雌鸟		
羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 迁徙

科名 雁鸭科	学名 <i>Aythya fuligula</i>	身长 43 厘米
--------	---------------------------	----------

泽凫(Tufted Duck)

颈后悬垂细长的冠羽，在野外时，通常生活在深而开阔的河流和湖泊中，已可适应人工环境，因而常在郊区出没。雄鸟呈黑羽色，但腹部和体侧则为白色，雌雄两性都有像钮扣一样的黄色眼睛，是十分显眼的特征。擅长潜水游泳，可以下潜到 14 米的深度，食性广泛，包括水生的小生物和植物等。

- 巢 位于靠近水面的植被中，内衬绒羽和草。
- 地理分布 繁殖于欧亚大陆，南到苏丹南部和印度北部过冬。



雌鸟

黄色虹膜

体侧的白斑

尾部向下倾斜伸入水中



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 雁鸭科	学名 <i>Somateria spectabilis</i>	身长 55 厘米
--------	---------------------------------	----------

王绒鸭(King Eider)

体格粗壮，终年在冰冷的滨海水域潜水取食水生贝类，羽毛浓密，覆有一层厚厚的绒羽，雄鸟具有独特而突出的前额。

- 巢 浅窝内衬着从其体侧啄取的绒羽。
- 地理分布 繁殖于阿拉斯加北部，加拿大和欧亚大陆。南到阿拉斯加南部，新英格兰和堪察加半岛过冬。




雌鸟

突出的前额

向上弯的装饰羽毛

从肩上垂下的羽毛



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 雁鸭科

学名 *Histrionicus histrionicus*


身长 42 厘米

丑鸭(Harlequin Duck)

羽毛上明显的色块，在清澈流动的水面上形成巧妙的保护色。繁殖于冰冷而流速快的河流边，取食附着在岩石和鹅卵石上的水生昆虫，常沿着河道有力的低飞。繁殖后迁移到海边，潜水捕食水生贝类和甲壳纲动物。



雌鸟



地理分布图

- 巢 位于树上或河堤上的洞穴，内衬绒羽。
- 地理分布 繁殖于阿拉斯加、加拿大、格陵兰、冰岛和西伯利亚东部，在海滨过冬。

体形壮实，
适于在汹涌的
水流中游泳



短颈

喙短而
渐细

羽色 雌雄不同

栖所   

迁徙 迁徙

科名 雁鸭科

学名 *Melanitta nigra*

身长 48 厘米

黑海番鸭(Black Scoter)

雄鸟有桔黄色的喙斑，雌鸟双颊灰白色。几乎整年都在海中度过，常聚集成群漂浮在海滨浅水区，或零散的在水面低飞，常一起潜入水中取食贻贝和其他海洋生物。



雌鸟




地理分布图

- 巢 位于地面内衬绒羽的浅窝。
- 地理分布 繁殖于北美洲和欧亚大陆的苔原地带，南到加州、非洲和中国北部过冬。

尾末端坚
挺而渐细

粗壮的体形适于
海中潜水

喙上的
桔黄色斑



羽色 雌雄不同


栖所   

迁徙 迁徙

科名 雁鸭科	学名 <i>Bucephala clangula</i>	身长 50 厘米
--------	------------------------------	----------

鹊鸭(Common Goldeneye)


头大颈细，雌雄两性的眼睛都有金黄色虹膜。夏季在北方森林中的内陆水域边生活，营巢于树洞中；冬季则到河湾、海湾和大的内陆湖泊中过冬。以水生贝类、甲壳纲动物和昆虫为食。



- 巢 筑在树上或巢箱中的洞穴，内衬绒羽。
- 地理分布 繁殖于北美洲和欧亚大陆，远至美国南部、中东和中国过冬。



雌鸟




地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 雁鸭科	学名 <i>Mergellus albellus</i>	身长 43 厘米
--------	------------------------------	----------

白秋沙(Smew)

羽毛光滑而匀称，适于在水下捕鱼，上喙为一排长而尖的齿状结构，前端具小尖钩，可以捉住身体滑溜的鱼。常飘浮在水面，寻找并确定水中猎物的位置，然后潜入水中，用脚推进加以猎捕。在陆地上也能够稳步行走，飞翔迅速而灵活。在北方针叶林带中的淡水湖泊和河边繁



雌鸟

- 巢 树洞巢，内衬绒羽。
- 地理分布 繁殖于欧亚大陆北部，南下到印度北部和中国东南部过冬。



地理分布图




羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 雁鸭科	学名 <i>Mergus merganser</i>	身长 65 厘米
--------	----------------------------	----------

川秋沙(Goosander)

身体流线型，喙窄而长的大型食鱼鸭，善于潜入水中快速游泳以追捕猎物。喙端具钩，上下喙两边都有后倾的尖锐齿状物，利于抓捕身体光滑的鱼类，在河湾、低地河流、湖泊、流速快的河中和高地溪流中捕捉鱼类。常沿着水流方向快速低飞，幼鸟先由捕捉水中昆虫开始，慢慢学习捉鱼。以小家族群形式生活，常聚集在地面或树上。

- 巢 位于树上、海岸、岩壁、石缝中的洞。
- 地理分布 繁殖于北美洲北部和欧亚大陆，南下到美国南部和中国中部过冬。



地理分布图



光滑的冠羽
贴伏在颈背上



雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 雁鸭科	学名 <i>Oxyura leucocephala</i>	身长 46 厘米
--------	-------------------------------	----------

白头硬尾鸭(White-headed Duck)

生活在淡水、河流上游，以及淡水与咸水混合湖中，属“硬尾类”潜鸭。尾巴通常在水面上或水中，只有在炫耀时才竖立起来，喜欢在长有芦苇穗的开阔浅水中，捕食水生动、植物。很少上岸，偶尔笨拙地在陆上行走。

- 巢 树洞或地上的浅窝。
- 地理分布 繁殖于西班牙南部、中东和亚洲中部，呈不连续分布，东部种群往南迁移到印度西北部过冬。



地理分布图



雌鸟



尾部拖曳在水中

喙蓝色，基部膨大

羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 雁鸭科

学名 *Biziura lobata*

身长 68 厘米/53 厘米

麝鸭(Musk Duck)

背部呈圆形，头短小的大型潜鸭，粗喙上悬着奇特的圆盘形肉垂。羽毛发出麝香味，因而得名。食昆虫、蛙类等小型的水生动物，因在陆上行走困难，所以很少离开水面。



地理分布图

- 巢 水边植被中的浅窝，偶尔位于倒下的树上。
- 地理分布 澳大利亚南部。
- 附注 雄性比雌性大得多。



雌鸟



羽色 雌雄不同

栖所  

迁徙 不迁徙

科名 美洲鹫科

学名 *Cathartes aura*

身长 70 厘米

红头美洲鹫(Turkey - vulture)

常在空中翱翔盘旋找寻食物，利用美洲鹫科鸟类特有的敏锐嗅觉，判断动物尸体的位置。除了动物的腐尸外，也捕杀蜥蜴之类的小动物，或偷食鸟蛋和雏鸟。

- 巢 树枝平台，位于树上、峭壁或多岩石地带。
- 地理分布 从加拿大南部延伸到南美洲南端和福克兰岛。



亚成鸟



地理分布图



羽色 雌雄相似

栖所   

迁徙 部分迁徙

科名 美洲鹫科	学名 <i>Gymnogyps californianus</i>	身长 115 厘米
---------	-----------------------------------	-----------

加州兀鹫(California Condor)



地理分布图

大型的食腐鸟，常在宽阔的自然区中巡游觅食。只有在气候和暖的天气里，才能藉着上升热气流向上翱翔，盘旋到所需高度；遇到寒冷多风的气候，就只能在地面上活动。不取食的时候会栖息在一处，不时用嘴梳理羽毛，以打发空闲的时间。

· 巢 单枚卵，产于地上、岩石的突出部或洞穴中。

· 地理分布 美国西部，现在主要见于笼养。

· 附注 因被认为会危害家畜，而被捕杀至濒临灭绝，又因繁殖力低，每两年才繁殖一次，并且要 5~7 年才能成熟，所以种群恢复受到限制而致数量减少，1984 年时只剩下 17 只，80 年代中期开始以人工饲养剩

余的种群，数量有所增加，目前已有试验性地放生。



羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 美洲鹫科	学名 <i>Sarcoramphus papa</i>	身长 75 厘米
---------	-----------------------------	----------

王鹫(King Vulture)

生活在热带雨林中，杂色羽毛、鲜艳的头部以及宽翅和短尾是其特征。天气暖和时，能借助上升热气流盘旋到一定高度；无风的日子，就只能由树枝顶端低飞，或降落到森林中的空地上寻食。常离开森林到有牛羊放牧的热带草原觅食，正常情况下不集群，但有时会聚集在大型的腐尸旁分食。由于体型和力气较大，能比其他食腐鸟优先取食，很少在森林中出现，仅偶尔提取林中搁浅在河中沙洲上的鱼，也捕杀小的爬行类或幼小的哺乳类动物。

- 巢 记载的资料很少，曾发现单枚卵产在林中树干的浅凹里。
- 地理分布 墨西哥到阿根廷北部。



彩色而裸露的头部

膨胀的嗉囊 贮存着刚吃的食物

脚大



亚成鸟



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鸢科	学名 <i>Pandion haliaetus</i>	身长 50 厘米/58 厘米
-------	-----------------------------	----------------

鸢(Osprey)

食鱼的猛禽，常在湖泊、河流和海滨上空盘旋，捕捉水中猎物时两脚在前，举翅向下俯冲，甚至将整个身体浸入水中，然后两脚抓鱼出现在水面继续飞行，把猎物带到树枝上或巢中吃掉。

- 巢 由树枝筑成，位于树上、海岸边、岩石或人造的平台上。
- 地理分布 在各大洲繁殖，过冬时移至南美洲、非洲和亚洲。
- 附注 雌鸟的体形比雄鸟大。




倒伏的冠羽被风吹起

眼睛到后颈的深色羽毛带


捕鱼的长爪



亚成鸟



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 鸢鹰科	学名 <i>Pernis apivorus</i>	身长 50 厘米/58 厘米
蜂鹰(Western Honey-buzzard) 十分奇特的猛禽，大多以攻击黄蜂或野蜂的巢而取得食物。常在追踪观察昆虫后，挖开它们的巢，取食蜂蜜、幼虫或成虫，腿上浓密的羽毛和厚鳞片可以防止被螫咬，有时也捕食老鼠和蛙等较大的动物。繁殖后，会成群迁移到一年四季都有食物的地区。 · 巢 大而脏的杯状巢用树枝堆成，位于枝冠高处。 · 地理分布 繁殖于欧洲大部分地区，西伯利亚西部和亚洲中部，南移至非洲中部以北过冬。 · 附注 雌鸟的体型比雄鸟大，羽色由深到浅有不同的色形，翅下的羽色变化最为明显。 深色型 浅色型 腿后屈 宽阔的翅膀利于盘旋 地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 迁徙

科名 鸢鹰科	学名 <i>Milvus milvus</i>	身长 58 厘米/65 厘米
鸢鹰(Red Kite) 身体细长，尾部呈分叉状的猛禽，飞行速度缓慢，翅膀扇动的幅度大，长时间滑翔，飞翔姿态优美。捕捉鼠、野兔等各种不同大小的动物，动作敏捷，灵活又凶猛。 · 巢 位于树上的大型凹状结构，由小树枝、泥土和羊毛筑成。 · 地理分布 欧洲大部分地区、非洲西北部和中东。 · 附注 雌鸟的体形比雄鸟大。 灰白色头羽 胁羽长 亚成鸟 地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 部分迁徙

科名 鸢鹰科

学名 *Haliaeetus vocifer*

身长 63 厘米/75 厘米

吼海雕(African Fish-eagle)

已特化成为专门食鱼的鸟类，常单只或成对在临近水域的高枝上活动。大多在栖木上观望，然后猛然摆动双脚下扑，捕捉水中的鱼类，也会捕杀水鸟、取食搁浅的鱼和动物的尸体，有时在飞行中捕食，叫声为连续四个音的吼声。

- 巢 通常位于水边的树上，由许多树枝堆成，中间呈碗状，内衬草。
- 地理分布 撒哈拉南部的非洲。
- 附注 雌鸟的体形比雄鸟大。



地理分布图



亚成鸟



从栖木上起飞的姿态



羽色 雌雄相似

栖所  

迁徙 不迁徙

科名 鸢鹰科

学名 *Haliaeetus leucocephalus*

身长 75 厘米/110 厘米

白头海雕(Bald Eagle)

食性很广，捕食鸭、海鸥、海鸟、湖海中的鱼类，以及河中的鲑鱼等各种活的猎物，有时会抢食鸮(见 88 页)捕获的猎物，也食用将死的鱼和动物尸体。

- 巢 由树枝等构成的大型结构，常位于靠近水边的树上。
- 地理分布 在北美洲繁殖，北方种群在美国南部和墨西哥的部分地区过冬。
- 附注 雌鸟的体形比雄鸟大。



地理分布图



亚成鸟



头颈部为纯白色

白色尾羽

捕捉猎物的爪十分有力

羽色 雌雄相似

栖所   

迁徙 部分迁徙

科名 鸢鹰科	学名 <i>Haliaeetus albicilla</i>	身长 70 厘米/91 厘米
--------	--------------------------------	----------------

白尾海雕(White-tailed Eagle)

生活在多岩石的海岸、岛屿、河湾和内陆湖泊中，体形又大又重，叫声连续、短促而尖锐，可以熟练地从湖泊或海洋中捕捉鱼和鸟，也常沿着海岸找寻腐尸。在冬季会选择气候温和的地区作为自己的领域，成对居留，雌鸟的体形比雄鸟大。

- 巢 位于悬崖、岩突和树上，由树枝堆成，每年都增添巢材，内衬小树枝及羊毛。
- 地理分布 繁殖于格陵兰和欧亚大陆北部，北方和东北方种群向南迁移到中东和中国大陆中部过冬。




地理分布图



突出的眉骨，防止日光照射眼睛

白色的尾部

亚成鸟

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 鸢鹰科	学名 <i>Torgos tracheliotus</i>	身长 98 厘米
--------	-------------------------------	----------

肉垂秃鹫(Lappet-faced Vulture)

体形大，比小型食腐鸟占有优势，因此在食腐动物中名列第一。坚实的厚喙能撕咬动物尸体，有助于较小的食腐鸟取食，并有助于取食其他食腐鸟咬不动的皮肤和韧带等部位。单只或成对栖息，几乎整天都在空中翱翔。

- 巢 由树枝堆成的平台，中间凹陷，位于顶端平坦的灌丛和树上。
- 地理分布 非洲、以色列、阿拉伯半岛南部和西部。



地理分布图




食腐动物裸露的头和颈

由裸露的皮肤形成的肉垂

翅宽大，利于翱翔

长腿利于行走

亚成鸟

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鸢鹰科


学名 *Neophron percnopterus*

身长 63 厘米/70 厘米

白兀鹫(Egyptian Vulture)

生活在开阔的平原或半沙漠中，脸部裸露，颈部长满蓬松的粗毛，由于体型小，无法与其他大型食腐鸟争夺腐尸，但可以藉着上升的暖气流来获得高度，从天刚亮就开始飞翔，抢先到达腐尸处取食。有时会袭击鸟的群巢，叼走雏鸟和蛋，进攻鸵鸟巢时，常用喙叼起石头向下抛，直至敲破巢中某颗蛋为止。

- 巢 岩石突出处，由树枝堆成的小平台，内衬粪便、毛发和毛皮。
- 地理分布 欧洲南部、中东、非洲、亚洲西部和印度半岛。
- 附注 雌鸟的体形比雄鸟大。



地理分布图



亚成鸟

羽色 雌雄相似

栖所

迁徙 部分迁徙

科名 鸢鹰科


学名 *Gypaetus barbatus*

身长 100 厘米/110 厘米

胡兀鹫(Lammergeier)

零散分布于山区的大型食腐鸟，翅端渐细，尾部成楔形，常在空中长时间的滑翔和盘旋，取食腐尸上其他食腐动物不能消化的部分，会把骨头从高空抛向岩石打碎。

- 巢 位在岩洞里或悬崖的突出处，用细枝堆成的平台，中间是浅窝，内衬草、毛发、毛皮和骨头等。
- 地理分布 零散分布于欧洲南部、非洲、中东及亚洲中部。
- 附注 雌鸟的体形比雄鸟大。



地理分布图



亚成鸟

羽色 雌雄相似

栖所

迁徙 不迁徙

科名 鸢鹰科	学名 <i>Terathopius ecaudatus</i>	身长 55 厘米/70 厘米
短尾雕(Bateleur) 能灵活地在空中飞翔并长时间快速滑翔的小型鹰。生活在灌丛、开阔的林地及热带和亚热带稀树草原中，栖宿于树上，但多数的时间都在空中。由于尾部较短，在滑翔中能迅速改变方向，飞行时只能见到完整的翅膀。捕捉猎物时，常会在同一地区来回迅速地滑翔、飞行，然后迅速猛扑猎物，有时会在高空拦截其他鸟类，也捕食地面的爬行类、小型的哺乳类和大型昆虫。繁殖期，成对地在空中炫耀，十分壮观，其法文名字意为魔术师或杂技演员即由此而来。  地理分布图 · 巢 由小树枝构成的杯状巢，内衬树叶，位于树冠中。 · 地理分布 撒哈拉沙漠以南的非洲地区。 · 附注 雌鸟体形较大。亚成鸟 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙


科名 鸢鹰科	学名 <i>Melierax canorus</i>	身长 50 厘米/58 厘米
淡色歌鹰(Pale Chanting-goshawk) 有长翅和长尾的大型鹰，栖息在干旱的荆棘丛或半沙漠等开阔地带。捕食猎物时，往往先站在栖木上等候，然后迅速起飞猛扑蜥蜴、小鸟或小型哺乳动物，甚至较大的昆虫。飞行动作完美，结束时会降落在另一根栖木上或盘旋回到起飞的地方。成鸟常成对生活，而且每对都占据一定的领域，夜晚栖息在树林中，中午则在树荫下躲避炎热。  地理分布图 · 巢 树枝构成的平台，中间有浅窝，内衬毛发、粪便、草和皮毛，位于荆棘靠近树冠部的分叉处。 · 地理分布 撒哈拉以南。 · 附注 雌鸟体形比雄鸟大。 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 鸢鹰科	学名 <i>Circus cyaneus</i>	身长 43 厘米/50 厘米
--------	--------------------------	----------------

灰泽鸢(Hen Harrier)

生活在旷野、沼泽、空旷草原和沙丘等开阔地带，以昆虫和小动物为食。捕食时，双翼会稍微展成“V”字形，在低空快速滑翔，搜索地面上的食物，这种姿势可惊起小型或受伤的鸟、小型啮齿类和大型昆虫。

- 巢 由小树枝、草和芦苇堆成，位于植被浓密的地面上。
- 地理分布 在北美洲和欧亚大陆繁殖，南移至中美洲、非洲北部和亚洲东南部过冬。
- 附注 雌鸟的体形比雄鸟大。



地理分布图



羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 鸢鹰科	学名 <i>Accipiter nisus</i>	身长 28 厘米/38 厘米
--------	---------------------------	----------------

雀鹰(Eurasian Sparrowhawk)

生活在林地和灌木丛中，正在特化为飞捕猎物为食的种类。常低飞并在树林和灌木丛中作快速的特技表演，捕捉失去警觉的猎物，有时经过短暂而迅速的追逐而将猎物捕获。

- 巢 由树枝堆成的松散结构，内衬细枝，筑于树上。
- 地理分布 繁殖于欧亚大陆和非洲北部，北方种群南移到北非、印度北部和中国南部过冬。
- 附注 雌鸟的体形比雄鸟大。




地理分布图



羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 鸢鹰科	学名 <i>Parabuteo unicinctus</i>	身长 45 厘米/58 厘米
栗翅鹰(Harris's Hawk) 体形较大，生活在热带和亚热带的半沙漠、半干旱林地和灌丛等干旱地区。常从栖木上突然飞起，猎食沙漠中的兔子、鼠、蛇、蜥蜴和鸟类。具较明显的群体合作行为，与他种鸢鹰不同，它们常三只鸟共同捕捉和分享猎物，族群也会群体合作，由一只鹰先靠近并驱赶隐藏起来的鸟，其他鹰则在旁边等候，准备追捕。通常一只筑巢的雌鸟由两只以上的雄鸟来喂食，有时雌鸟会与两只雄鸟交配，幼鸟则由整个群体来照顾。 · 巢 由树枝、树根和茎叶筑成，内衬树叶、草和树皮，比较整洁，筑于树上或较高的丝兰和仙人掌顶部。 · 地理分布 美国南部到中美洲的智利和阿根廷。 · 附注 雌鸟的体形比雄鸟高大。  地理分布图  亚成鸟  栗色的翅斑		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙

科名 鸢鹰科	学名 <i>Buteo jamaicensis</i>	身长 48 厘米/63 厘米
红尾鸢(Red-tailed Hawk) 生活在开阔地的典型猛禽，在上升的暖气流中盘旋翱翔搜寻猎物，也常停栖在较高的树上等候猎物，一遇哺乳类、爬虫类、鸟类及较大的昆虫即加以捕食。生活在农田和森林的混合地带以及半沙漠中，尤其是树木稀疏的地区。 · 巢 树枝堆成的大平台，杯状浅窝内衬枝叶，位于树上。 · 地理分布 北美洲、中美洲和加勒比海。有些种群在这个范围以内迁徙。 · 附注 雌鸟体形比雄鸟大，色有深色型、赤褐色型和浅色型。另有分布于阿拉斯加和加拿大西部哈伦鹰(见 13 页)亚种。		
 地理分布图	 翅大而宽 用来抓握猎物的爪十分强健 成鸟	
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙

科名 鸢鹰科	学名 <i>Buteo buteo</i>	身长 50 厘米/55 厘米			
鸢(Common Buzzard) 体形粗壮，双翅宽而钝圆，尾部宽阔，生活在农田、山丘、林间空地和森林边缘，常在空中连续翱翔数小时搜寻猎物，或停栖在树上和电线杆上等候，一发现猎物即猛扑而食，所捕捉的动物小至甲虫，大至野兔，有时也吃小型腐尸。 · 巢 用大量的树枝和根茎堆成，有杯状凹陷，位于树上或岩石的突出处。 · 地理分布 欧亚大陆。过冬时南迁到非洲、印度和亚洲东南部。 · 附注 雌鸟体形比雄鸟大，有浅色、深色和赤褐色三种色型。  赤褐色型   地理分布图  <tr><td>羽色 雌雄相似</td><td>栖所 </td><td>迁徙 迁徙</td></tr>			羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙			

科名 鸢鹰科	学名 <i>Harpia harpyja</i>	身长 90 厘米/102 厘米
--------	--------------------------	-----------------


角雕(Harpy Eagle)

脚、爪强劲有力的大型鹰，是中美洲和南美洲热带雨林中最具优势的猛禽，平时在树枝间灵活飞行，捕捉森林中的猴子、树獭、负鼠和蛇等动物。

- 巢 粗枝构成的大型巢，中间为杯状凹陷，位于很高的叉枝上。
- 地理分布 从墨西哥到阿根廷北部。
- 附注 雌鸟的体形比雄鸟大。



地理分布图







羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鸢鹰科	学名 <i>Pithecophaga jefferyi</i>	身长 95 厘米/102 厘米
--------	---------------------------------	-----------------

食猴雕(Philippine Eagle)

全世界最大的猛禽之一，生活在热带雨林中，是典型的森林猛禽。翅大而宽、末端圆、尾长，这种构造使其能在树枝间迅速而灵活地飞行。典型捕食方式是在树枝间移动，停在栖木上等候猎物，有时亦可见其在热带雨林上空翱翔，捕食森林中的猴子、飞狐和犀鸟等大型鸟类。叫声为连续的长嘘声，与其强壮的体形比较起来，叫声显得微弱，产单枚卵，可能每两年繁殖一次。

- 巢 由树棍和细枝构成的大型巢，位于粗枝的分叉处，在高于四周的树木上筑巢。
- 地理分布 菲律宾群岛。
- 附注 雌鸟体形比雄鸟略大，因热带雨林消失，导致其濒临灭绝。



翅宽而圆，可在森林中的树枝间作特技飞行

脚大而有力

尾长

地理分布图


羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鸢鹰科	学名 <i>Aquila chrysaetos</i>	身长 75 厘米/90 厘米
--------	-----------------------------	----------------

金雕(Golden Eagle)

在高海拔的开阔地带捕食，飞行有力，技巧娴熟，经常在风暴中嬉戏。典型的捕食方式是飞行速度快慢不定，然后倾斜向下俯冲，伸出双脚捕捉猎物，以野兔类哺乳动物为主食，但冬天也吃松鸡和腐肉。

- 巢 由树根堆成的大型巢，内衬细小的材料，位于悬崖或树上。
- 地理分布 在北美洲的大部分地区、欧亚大陆、非洲北部和中东等地繁殖，欧亚大陆北部、中部和东部种群有迁徙行为，冬季南移至喜马拉雅山脉和中国大陆。
- 附注 雌鸟的体形比雄鸟大。



古铜色的羽毛

亚成鸟

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 鸢鹰科	学名 <i>Hieraaetus morphnoides</i>	身长 47 厘米/53 厘米
小雕(Little Eagle) 冠羽短，腿部被满羽毛，体形小而结实。在林木稀疏的地区，盘旋翱翔搜索，或站在栖木上等候猎物，然后从低空接近幼小的野兔和其他小型哺乳类、鸟类、爬虫类及昆虫，加以捕食。 · 巢 由树枝构成的杯状巢，内衬树叶，位于高大的树中。 · 地理分布 澳大利亚、新几内亚和印尼摩鹿加群岛。 · 附注 雌鸟的体形比雄鸟大，具深色和浅色型。  紧贴头部的冠羽 脸部黑色 地理分布图 深色型 浅色型		
羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙

科名 鸢鹰科	学名 <i>Polemaetus bellicosus</i>	身长 80 厘米/83 厘米
猛雕(Martial Eagle) 冠羽蓬松，腿密布羽毛，体形较大，生活在开阔地带。常盘旋翱翔搜寻猎物，偶尔也会在栖木上等候，捕食动物的种类很多，捕食时展开翅膀和尾部，倾斜俯冲攻击猎物。 · 巢 位于大树的分叉处，由树枝堆成的盆状巢，具有小的杯形凹陷，沙漠以南的非洲大部分地区。 · 附注 雌鸟的体形稍大于雄鸟。  冠羽紧贴头部 喙厚实而成钩状 强壮的腿密布羽毛 地理分布图 亚成鸟		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙

科名 蛇鹫科

学名 *Sagittarius serpentarius*

身长 150 厘米

蛇鹫 (Secretary Bird)

栖息在草地和开阔地带的大型猛禽，已完全适应陆栖地面捕食，很少飞翔。体形高大而瘦长，并具长腿、小脚和长颈，外形十分奇特，长翅和长尾在行走、奔跑，以及在地面领域争斗时保持平衡。由于外形看似工业时代时，耳后总夹有一支羽毛笔的法庭文书人员，因此别名文书鸟。步伐大而稳重，每走一步头向前点一下，通常用喙啄或用脚踩踏猎物，捕食蛇的时候，则展开翅膀不停地变换姿势，使蛇迷惑而无法展开攻击。食物包括昆虫、蛙、蜥蜴、鸟类和啮齿类动物。



飞行中的成鸟

· 巢 由树枝构成的平台，中间凹陷，内衬青草、粪便和未消化的食团，筑于灌木或乔木的顶端。

· 地理分布 撒哈拉沙漠以南的非洲地区。

· 附注 蛇鹫与生于南美洲的草地鸟类红腿叫鹤极为相似，但蛇鹫只分布在非洲地区。



强壮纤细的
体形，有利于
在开阔的地面上捕食

长翅，很少
用来飞行

尾羽很长
用于平衡

双腿强健，善于在草
地上行走奔跑

脚太小而无法攫住猎物，
仅能用以踩踏





地理分布图

羽色 雌雄相似

栖所

迁徙 不迁徙

科名 隼科	学名 <i>Polyborus plancus</i>	身长 53 厘米/63 厘米
凤头卡拉鹰(Crested Caracara) 具有适于在草地和灌丛中奔走的长腿，脚则像其他隼科鸟类可以灵敏地转动，帮助爪抓握、翻转猎物，或在地上摩擦，能在地面行走和捕食；呈直线飞行，与其他种类的隼不同，飞行中露出翅和尾部的白斑；除了动物腐尸以外，还捕食昆虫、蛙、爬虫类和受伤的小鸟，有时也袭击鸟类和乌龟的巢；名字源于粗厉刺耳的“咯咯”声。 · 巢 巨大而不规则的构造，由树枝构成，位于树上或地面。 · 地理分布 美国南部、美洲中部和南部，延伸到好望角和福克兰群岛。 · 附注 雌鸟的体形比雄鸟大。		
		
地理分布图	亚成鸟	
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 隼科	学名 <i>Herpetotheres cachinnans</i>	身长 46 厘米/55 厘米
笑隼(Laughing Falcon) 体型大而重的森林隼，深色的脸罩上方有由变硬的羽毛形成的蓬松羽冠，以此为其识别特征。由于受惊扰时会发出听起来像笑一样的叫声，所以称笑隼。平时的叫声是数次重复的单音或双音，多数时间栖息在树上等候地面上的猎物，捕食蛇类，迅速猛扑啄击蛇类后脑或把头直接咬下来，然后带到栖木上，在喙或脚帮助下将蛇吃掉，也吃蜥蜴、小型哺乳类和无脊椎动物。飞行时快速拍翅和水平滑翔交替，但很少飞行，也极少翱翔。 · 巢 树上的浅窝或其他鸟类的废巢。 · 地理分布 中美洲和南美洲。 · 附注 雌鸟的体型比雄鸟大。		
		
地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 隼科	学名 <i>Falco sparverius</i>	身长 29 厘米/32 厘米
-------	----------------------------	----------------

美洲隼(American Kestrel)

体型小而外形优雅，飞得很快，翅膀快速向下扇动，栖息时尾羽会不停地上下摆动。以行动缓慢的小型猎物为食，常在空中盘旋并垂直扑向猎物，偶尔也在栖木上等候，夏天以昆虫为主食，冬天则大量捕食鼠类和小鸟；叫声为重复的“呵－嘞－”或“呵－嘞－”声。

- 巢 位于天然的洞穴或裂缝里，无遮蔽物的凹陷，有时也利用巢箱或大型鸟在树上的旧巢。
- 地理分布 北美洲、中美洲、南美洲和加勒比海群岛。
- 附注 雌鸟比雄鸟略大。




雌鸟




地理分布图



雄鸟



羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 隼科	学名 <i>Falco tinnunculus</i>	身长 33 厘米/37 厘米
-------	-----------------------------	----------------

红隼(Common Kestrel)

生活在开阔地带，正逐渐适应城镇环境。经常在空中盘旋，搜寻地面上的老鼠、田鼠、蝗虫、甲虫等猎物，发现后，先慢慢下降，然后猛扑而食。也常在城镇和郊区捕捉麻雀，带到栖木上去吃，有时还去掉麻雀的毛。选择视野较宽广处歇息，飞行幅度小，但扇翅很快，并交替滑翔，有时则借助上升的气流翱翔，常遭欧洲八哥(见 375 页)和燕科(见 269~270 页)鸟类群起围攻。

- 巢 位于悬崖、建筑物的突出处或树洞中，为天然的浅窝，也利用其他大型鸟的旧巢。
- 地理分布 欧亚大陆和非洲。北部和中部种群南迁到南非、印度、中国和日本过冬。
- 附注 雌鸟的体形比雄鸟大。






雌鸟



地理分布图



羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 隼科	学名 <i>Falco columbarius</i>	身长 27 厘米/32 厘米
灰背隼(Merlin) 体形比红隼小，但攻击性强，飞行速度快，具有较强的捕食能力。栖息在干燥泥沼、沼泽、草地和低洼海岸等开阔地带。在飞行中捕食，常以不规则的路线飞翔，在捕杀猎物时则全速出击。低空飞行，并利用树木和山脊作掩护，最常捕食的是飞鸟，也会猛扑老鼠一类的动物和蜻蜓。 · 巢 筑于石楠丛中的浅窝，有时也利用树木和灌丛中其他大型鸟类的旧巢。 · 地理分布 北美洲和欧亚大陆。冬季南移到南美洲北部、非洲北部、印度北部以及越南南部过冬。 · 附注 雌鸟的体形大于雄鸟。  地理分布图  雄鸟  雌鸟   大眼睛 胸部条纹		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙

科名 隼科	学名 <i>Falco berigora</i>	身长 43 厘米/50 厘米
褐隼(Brown Falcon) 虽然和最大最凶猛的游隼(见 105 页)体形一样，但攻击性很弱，只捕食行动迟缓的小型猎物。腿较长，翅膀则较宽，与其他的隼不同，占领一定范围的栖息地，但更喜在开阔地区活动。捕食时，常站在制高点上长时间等候，一看见地面上的小型哺乳类动物、幼鸟或受伤的鸟、爬虫类和昆虫，即猛扑而食，叫声粗厉刺耳。 · 巢 利用乌鸦等大型鸟的旧巢，或把巢建于白蚁冢上。 · 地理分布 新几内亚南部和澳大利亚大部分地区。 · 附注 雌鸟的体形比雄鸟大，有淡褐色胸羽和浅色羽毛两种色型。  地理分布图  浅色型   眼大 褐胸型 腿比多数隼类长		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 隼科	学名 <i>Falco subbuteo</i>	身长 30 厘米/37 厘米
-------	--------------------------	----------------

燕隼(Eurasian Hobby)


翅膀狭窄渐尖，尾长的小型猎隼，快速拍翅后能迅速水平飞翔，飞行速度之快足以捉住燕子(见 270 页)和雨燕(见 208~209 页)。视觉敏锐，能在光线微弱处猎食蝙蝠及蜻蜓等大型昆虫，用脚将这些猎物攫走，并在飞行中吞食。

- 巢 树上大型的巢，或利用松鼠的旧巢。
- 地理分布 繁殖于欧亚大陆及非洲西北部，向南迁徙至非洲南部、印度、中国大陆南部及越南南部过冬。
- 附注 雌鸟的体形比雄鸟大。



地理分布图



羽色 雌雄略有不同	栖所 	迁徙 迁徙
-----------	---	-------

科名 隼科	学名 <i>Falco biarmicus</i>	身长 34 厘米/50 厘米
-------	---------------------------	----------------

地中海隼(Lanner Falcon)

身体强健，分布于沙漠，以及热带和亚热带稀树草原区，偶尔在悬崖上栖息和营巢，在开阔的林地中也有分布。捕食时，自空中迅速俯冲，撞击果蝠、白蚁以及小型鸟类，或贴近地面快速飞行，捕食地面的鹧鸪(见 111~112 页)、鹌珠鸡(见 117 页)以及小黑鹑等小型雉类(见 130 页)，如果可供捕食的鸟类很少，老鼠及洞栖的大型沙漠蜥蜴也会成为其捕食的对象。平时很少发出叫声，繁殖期，成对亲鸟不断发出刺耳的叫声。

- 巢 悬崖或建筑物突起处的空隙，以及其他大型鸟类的弃巢均可成为其营巢地点。
- 地理分布 欧洲东南部、中东以及非洲大部分地区。
- 附注 雌鸟的体形比雄鸟大。



地理分布图



羽色 雌雄略有不同	栖所 	迁徙 部分迁徙/四处游荡
-----------	---	--------------

科名 隼科	学名 <i>Falco peregrinus</i>	身长 38 厘米/48 厘米			
游隼(Peregrine Falcon) 属猛禽类，取食时会快速飞过鸟类的头顶，然后突然快速俯冲，用脚撞击猎物，再反转身体抓住往下掉落的受害者，并将其带走。据悉在俯冲的最后阶段，时速可达 400 公里。 · 巢 通常在岩石突出处的裸露部分。 · 地理分布 除南极洲外，各大洲均有分布，有些种类在冬季迁徙。 · 附注 雌鸟体形比雄鸟大，是隼类最常被驯养的一种。在不同亚种中，胸部颜色有橙色到浅灰色的差异，而且在不同的分布区有不同色型。  地理分布图  胸部浅色型  胸部橙色型  背部的黑色深浅不一 <tr><td>羽色 雌雄略有不同</td><td>栖所 </td><td>迁徙 迁徙</td></tr>			羽色 雌雄略有不同	栖所 	迁徙 迁徙
羽色 雌雄略有不同	栖所 	迁徙 迁徙			

科名 冢雉科	学名 <i>Leipoa ocellata</i>	身长 60 厘米
眼斑冢雉(Malleefowl) 生活在浓密的常绿桉树灌丛中，配偶鸟生活在自己的领域内。有筑土堆的习性，雄鸟首先撒一些细枝和树叶填在洞穴中，当这些细枝被雨水打湿后，在上面覆盖土壤，形成一宽 5 米、高 1.5 米的土堆；其后雄鸟便一直忙于照料这个土堆，包括适时打开，混和里边的东西，并封闭洞口，以控制因腐烂发酵而产生的热量。主食金合欢的种子、花蕾、嫩枝和昆虫。 · 巢 雌鸟在每个繁殖季产下约 24 枚卵，将其埋入土堆，利用有机物腐化散发出的热量孵蛋。 · 地理分布 澳大利亚南部。		
 地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 冢雉科	学名 <i>Alectura lathamii</i>	身长 70 厘米
丛冢雉(Australian Brush-turkey) 体形修长，类似雉类的鸟，颈部细而裸露，并垂悬着一堆多皱的皮褶(颈垂)。林栖，取食昆虫、浆果和种子，雄鸟会向后扒土，将枯枝、落叶和泥土，堆成一个高出其身体数倍的巢垛，利用巢材腐化使巢温上升，并时常以喙检验温度变化，以增减巢材，保持巢温稳定。 · 巢 雌鸟在巢垛上掘洞，每掘一洞产一枚蛋于其中，靠腐物的热量孵化，幼雏孵出时身被覆绒羽，从巢垛里钻出即可独立生活。 · 地理分布 澳大利亚东部和东北部。  头颈部的裸皮 黄色颈垂 尾羽扁平 约克角种  地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 宝冠鸟科	学名 <i>Ortalis vetula</i>	身长 60 厘米
小灰头稚冠雉(Plain Chachalaca) 与雉类的习性相似，体形纤细，颈、腿、尾均十分细长。栖于森林、灌木丛或其他浓密的植被中，常结成小群在地面活动，于树枝间觅食浆果、嫩芽和树叶。黎明和黄昏时，常一齐发出粗厉的叫声，英文俗名因此而得。成群栖宿于植丛中，幼鸟振翼爬向亲鸟，然后钻入亲鸟翼下。 · 巢 由细枝构成的扁平巢，位于树冠中稠密的枝叶间。 · 地理分布 得克萨斯州东南到尼加拉瓜。  雄鸟 短翅  适于攀抓树枝的脚趾  地理分布图		
羽色 雌雄略有不同	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 宝冠鸟科	学名 <i>Pipile pipile</i>	身长 68 厘米
---------	-------------------------	----------

鸣冠雉(Common Piping-guan)

习性似雉类，身体纤细，腿长，趾强健，适于在树枝间攀行。在林冠中层和上层的树枝间行走、跳跃或飞行，主食浆果、嫩芽和树叶，偶尔也吃小动物。常集群活动，喜栖于视野开阔的高枝上，并大声鸣叫。繁殖期鸣冠雉在树冠顶飞行，使飞羽发出响亮的呼呼声来炫耀。

- 巢 由稀疏的细枝构成，位于树冠上层。
- 地理分布 南美洲的亚马孙和奥里诺科河流域。



长有冠羽的头部

细长的颈

喉垂

适于在树枝间行走的脚趾

细长的尾



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 宝冠鸟科	学名 <i>Mitu mitu</i>	身长 90 厘米
---------	---------------------	----------

大刀嘴凤冠雉(Razor-billed Curassow)

体形健壮，适于在树枝间活动，但多数时间在森林的地面上觅食，只在栖宿以及受惊扰时到树上。喙短，向上弓起形成一个两侧平、中间突出的薄脊，形似剃刀刀刃，其名由此而来，不过这种特征似乎仅是一种装饰。主要取食散落的浆果，以及嫩芽、树叶、种子，偶食昆虫。

- 巢 由树叶和枝条构成的浅盘状巢，位于较低或中等高度的枝叶间。
- 地理分布 巴西中部、秘鲁东部和玻利维亚北部的亚马孙河流域，巴西东部曾有小群的分布纪录，但可能已经灭绝。



具冠羽的笨重头部

体形粗壮

强壮的腿适于在树枝间行走

尾宽阔具圆边



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 雉科

学名 *Meleagris gallopavo*

身长 125 厘米/91 厘米

野火鸡(Wild Turkey)

活动于林缘和林间空地，性机警而隐蔽。在地面觅食浆果、坚果、种子和植物，也食无脊椎动物。冬季野生的火鸡常集群生活，有些群体仅由雌性或雄性组成。春季，雄鸟展尾炫耀以吸引一小群的雌鸟聚集，配对后，由雌鸟单独营巢。


- 巢 位于植丛地面上的浅坑，衬以稀疏的树叶和枝条。
- 地理分布 加拿大南部、美国和墨西哥北部，呈斑块状分布。



雌鸟



地理分布图



尾羽
全部展开

羽色 雌雄不同

栖所

迁徙 不迁徙

科名 雉科

学名 *Tetrao tetrix*

身长 55 厘米/43 厘米

黑琴鸡(Black Grouse)

栖于林缘和灌木丛中的猎禽，有时停栖或栖宿于树上。主食树芽，夏季也吃昆虫。春天时雄鸟在被公认的“求偶场”进行竞争性炫耀，在空中跳跃，翅膀呼呼作响，并发出激昂像打喷嚏一样的噗噗声，以吸引求偶场的雌鸟，雌鸟与雄鸟交配后独自营巢。

- 巢 浅的地面巢，隐于很高的植被中。
- 地理分布 不列颠群岛到西伯利亚东部。

伸长的
尾羽



尾羽

短粗
的腿

直立炫耀
的姿势



地理分布图



雌鸟

羽色 雌雄不同

栖所

迁徙 不迁徙

科名 雉科	学名 <i>Centrocercus urophasianus</i>	身长 80 厘米/55 厘米
艾草榛鸡(Sage Grouse) 栖息于由艾草形成的广阔灌木丛地带，冬季在平原活动，夏季则移至山脚。以艾草叶和昆虫为食。春季时，雄鸟在一定距离之外群集炫耀，它们举起颈部，不断地充胀胸部的气囊，并发出深深的噗噗声，雌鸟选择一只雄鸟交配，然后自行营巢。 · 巢 位于艾草灌丛下的地面浅坑。 · 地理分布 北美洲西部的内陆地区。  地理分布图  雌鸟  颈背的发状羽冠 长而尖的尾羽 举起的飞羽		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 雉科	学名 <i>Callipepla californica</i>	身长 28 厘米/25 厘米
加利福尼亚鹌(California Quail) 栖于开阔林地、灌丛和农田的小型狩猎鸟，常集群活动。虽然飞行能力较强，但大多行走或奔跑，停落、栖宿于低枝上浓密的遮蔽中，在地面取食种子、绿色植物和昆虫。 · 巢 地面上的浅坑，排放着一些从巢上遮蔽物采下的枝条。 · 地理分布 北美洲西部。 被许多国家引入，作为公园中的观赏鸟，其中一些被野放而形成地理种群。  地理分布图  雌鸟  雌雄两性都有向前伸出的点头羽冠 具条纹的胁部		
羽色 雌雄不同	栖所    	迁徙 不迁徙

科名 雉科

学名 *Colinus virginianus*

身长 25 厘米

北方山齿鹑(Northern Bobwhite)

在野外灌木丛和开阔的林地中常见的鸟类，一年中大多时间都不醒目，只有当春季站在石块、树桩等较低的栖物上，发出宏亮鸣声，才能引人注目。春季，成对或成家族群觅食，并在秋后聚集成小群，常在地面行走、奔跑，常冒险到空旷的地区。遇惊扰时，会先蜷缩于灌木丛间，然后扇动着翅膀从一个藏身点低飞到另一个藏身点。夜宿时，群体头朝外，在地面上挤成一堆，以便遇惊扰时能迅速飞散。取食种子、嫩芽、树叶和根，以及昆虫和小型无脊椎动物。

· 巢 位于草地等开阔地带，浅盘状的地面巢，上置枯死的植物。


· 地理分布 美国东部至墨西哥，被引入国当作观赏鸟，野放而形成地理种群。



地理分布图

站立
鸣叫的姿势

腹面具白斑



羽色 雌雄不同

栖所

迁徙 不迁徙

科名 雉科

学名 *Cyrtonyx montezumae*

身长 22 厘米

彩鹑(Montezuma's Quail)

生活在干旱山区的林鸟，头部很大，与其他鹑类明显不同。生活于栎树与杂草混生的峡谷地带，也见于针叶树散生的山坡上。大多在地面活动，遇惊扰时，蜷缩并隐身于草丛间。因羽冠后弯贴伏于颈背上，所以雌雄鸟的头部看上去都很大。雄鸟蜷缩时，棕灰色羽冠可以把面部黑白相间的醒目羽饰遮盖起来。夏末，雌雄共同筑巢，繁殖后聚集成小群活动。取食种子和昆虫，也刨扒植物根茎为食。

· 巢 位于地面草丛里的浅坑，内铺一些杂草。

· 地理分布 从美国西南部到墨西哥南部。



地理分布图

颈背的
厚羽冠

胸部和体
侧的白斑

乌黑发亮
的下腹部

强健而
善于刨掘的趾



雌鸟

羽色 雌雄不同

栖所

迁徙 不迁徙

科名 雉科	学名 <i>Francolinus afer</i>	身长 38 厘米
-------	----------------------------	----------

裸喉鹧鸪 (Red-necked Francolin)

生活于干热地带的典型鹧鸪，红色的面颊和喉部格外醒目。栖息于灌木丛、开阔的林地、森林边缘和有林木的峡谷。成对或成家族群活动，有时也允许其他种的同类在领地内共同觅食，主要取食种子、嫩芽、树叶和浆果，也刨掘根茎，并摄取昆虫和无脊椎动物为食，遇危险时奔跑逃窜而并不飞起。

- 巢 用身体卧压出的浅坑，内铺杂草，隐藏在浓密的植被中。
- 地理分布 从加蓬和肯尼亚南部到南非海岸的非洲大陆。

眼周围裸露的皮肤

喉斑

脚适于奔跑和刨掘

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 雉科	学名 <i>Perdix perdix</i>	身长 32 厘米
-------	-------------------------	----------

竹鸡 (Common Partridge)

最普通的猎禽，人们为了狩猎需要，常刻意保存一些种群。春季时成对生活，秋季结集成多达 20 只的小群。在农田觅食种子、谷物和昆虫，遇惊扰时，蜷缩在杂草间，伪装成土块或草皮，如果被侵扰，便从隐身处迅速飞起，贴着地面飞行，此时翅膀会发出尖亮的哨声。

- 巢 位于杂草中较开阔地面的小浅坑，内铺枯枝落叶。
- 地理分布 从欧洲到中国大陸西部，已引入北美洲。

雄鸟

雌鸟

亚成鸟

雄鸟特有的警戒姿势

地理分布图

羽色 雌雄略有不同	栖所	迁徙 不迁徙
-----------	----	--------

科名 雉科	学名 <i>Coturnix coturnix</i>	身长 18 厘米
鹌鹑(Common Quail) 世界上最小的猎禽之一。叫声由三种清脆的声调组成，十分特别，白天和晚上均可听到。常隐藏在干草丛或田地里，遇危险时多奔跑逃窜，有时勉强做短距离的低飞，但在长距离迁徙的过程中，表现出很好的飞行能力。在地面觅食草籽、花蕾、嫩芽和树叶。 · 巢 隐于浓密的植被中，以脚刨掘地面，并用身体压成浅坑，内铺干草。 · 地理分布 繁殖区由欧洲延伸到西伯利亚中部、蒙古、伊朗、印度北部、非洲和马达加斯加岛，欧亚大陆的种群在非洲中部和印度过冬。  地理分布图  面部的 条纹 枯草般的 保护色  雄鸟		
羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 迁徙

科名 雉科	学名 <i>Tragopan temminckii</i>	身长 63 厘米
红腹角雉(Temminck's Tragopan) 生活于常绿山地或混合林，栖息于海拔 4600 多米，常单独活动，与其他非原产地的鸟类一样，非常易于驯化。主食植物的花蕾、嫩芽和种子，也吃昆虫。雄鸟喉部有多彩的肉褶，炫耀时可充胀起来，几乎盖满前胸。 · 巢 位于灌丛或低树上，扁平状，以巢址附近的细枝筑成。 · 地理分布 中国西藏及中部、印度东北部、缅甸和越南北部。  地理分布图  斑斓多彩 的羽色  雌鸟		
羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 不迁徙

科名 雉科	学名 <i>Lophophorus impejanus</i>	身长 62 厘米/55 厘米
-------	---------------------------------	----------------

棕尾红雉(Impeyan Monal)

体形笨重，斑彩的羽色却十分迷人。尾短，腿强健，并有一个类似鹰隼的钩喙，雄鸟柔软而闪闪发亮的胸羽，远看十分醒目。山地种，生活在海拔 2500~5000 米开阔森林地带的杜鹃科植被中，常单独或 3~4 只的小群活动，围成圈站立在积雪中。取食杂草、种子、块茎、球茎、浆果和昆虫。

- 巢 用脚刨挖、以身体压成的浅坑，位在山壁陡峭的突出岩石上或枯树残干下的草丛里。
- 地理分布 阿富汗、巴基斯坦北部、印度北部和中国西南的喜马拉雅山区。
- 附注 雄鸟的羽冠总是竖立的，而雌鸟的羽冠则通常下垂。



羽冠末端渐宽

毛部褐色

下腹羽毛柔软闪亮



地理分布图



雌鸟



羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 雉科	学名 <i>Gallus gallus</i>	身长 55 厘米/43 厘米
-------	-------------------------	----------------

野鸡(Red Junglefowl)

小群生活在雨林边级及次生林植被中，取食植物性食物和无脊椎动物。性胆怯，曾发现有单独由雄鸟组成的群体。

- 巢 隐匿于低层密植被中，由身体压成浅坑，内铺干草和竹叶。
- 地理分布 从喜马拉雅东部经南中国大陆到马来西亚半岛、印尼和菲律宾。



雄鸡和有亲缘关系的家鸡(已被驯养品种)外形相似



地理分布图



雌鸟



羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 雉科	学名 <i>Phasianus colchicus</i>	身长 83 厘米/58 厘米
-------	-------------------------------	----------------

雉鸡(Common Pheasant)

体羽华丽，行动机警，生活于灌木丛、农田和沼泽地带。繁殖季节成对活动，秋季结集成小群，取食草籽、浆果、谷物及昆虫。

- 巢 用身体压成的浅坑，内铺以干草，位于地面或生长浓密的低层植被中。
- 地理分布 由欧洲到亚洲及中国，已引入北美及澳大利亚和新西兰饲养。
- 附注 在分布区内，亚种间的羽色和斑纹差别很大；蒙古亚种和环颈雉常作为笼鸟与狩猎鸟。




地理分布图



雄鸟有条纹的长尾



雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 雉科	学名 <i>Polyplectron bicalcaratum</i>	身长 75 厘米/55 厘米
-------	-------------------------------------	----------------

孔雀雉(Grey Peacock-pheasant)

翅和尾上有许多“眼状斑”，雄鸟的眼状斑为紫罗兰色，雌鸟为黑色及白色。性胆怯，出现于潮湿的森林低洼带，也可于海拔 1800 米的山地发现，刨掘植物和昆虫为食。

- 巢 隐藏于稠密的植被中，裸露的地面浅坑以身体压成，内铺枝叶。
- 地理分布 印度东部、缅甸、泰国、老挝、越南、中国西南大陆。



眼状斑纹

炫耀时，雄鸟将尾部和双翅展成扇形

适于刨掘的大脚



地理分布图

羽色 雌雄略微不同	栖所 	迁徙 不迁徙
-----------	--	--------

科名 雉科	学名 <i>Pavo cristatus</i>	身长 213 厘米/85 厘米
-------	--------------------------	-----------------

蓝孔雀(Blue Peafowl)

野生的蓝孔雀(俗称孔雀)生活于热带落叶林中，在林中的开阔地或耕地上觅食种子、浆果及植物的茎叶，也吃昆虫及鼠类等小动物。雄鸟长而多彩的尾屏仅是一种装饰物，由大约 150 根从体背下方长出的羽毛组成。真正的尾羽短而色淡，隐于尾屏之下，雌鸟没有尾屏，雄鸟的尾屏在冬季也会消失。雌雄鸟及幼鸟在头顶上都有一个扇形的小羽冠。求偶时，雄鸟抬起尾巴，使尾屏开展成一个对称的扇形，并振动栗色的翅膀，在雌鸟面前表演，并发出响亮且传得很远的叫声。一只开屏的雄鸟很快就能引来一小群雌鸟，在它的保护下，这群雌鸟与它共同生活数天，在此期间与雌鸟逐一交配，然后每只雌鸟独自营巢繁殖。雌雄孔雀都可十分敏捷地飞到高枝上栖宿。


- 巢 隐藏在多刺植被下的浅盘状巢，空巢或铺上树叶和杂草。
- 地理分布 印度半岛，包括斯里兰卡。



地理分布图



雌鸟



鲜艳亮丽的“眼状斑”

展成半圆形的尾屏

羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 雉科	学名 <i>Argusianus argus</i>	身长 185 厘米/70 厘米
大眼斑雉(Great Argus Pheasant) 独自生活于热带雨林，以树叶、浆果、嫩芽、种子和无脊椎动物为食，其求偶时的炫耀行为在鸟类中最为壮观。首先在林地上踩踏出一片地，然后雄鸟开始发出响亮清脆的叫声，并翘尾展翅形成一个巨大的扇形，展现次级飞羽上闪闪发亮的“眼状斑”，以引来许多雌鸟与之交配，雄鸟在雌鸟离开后独自营巢，仍继续向其他雌鸟炫耀。 · 巢 在林地上用身体压成浅坑，内铺树叶，隐于繁茂的枝叶间。 · 地理分布 马来西亚、苏门答腊、婆罗洲。 眼状斑隐于合拢的翅内 一整列眼状斑 雌鸟 巨大的次级飞羽 地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 雉科	学名 <i>Acryllium vulturinum</i>	身长 60 厘米
鸢珠鸡(Vulturine Guineafowl) 形似秃鸢的裸露头颈，颈背的羽翎，细长的蓝色胸羽使其外形显得十分特殊。喜栖于稠密的灌丛和林缘的地面，这种环境可以提供开阔的空间并防御天敌侵袭。虽然善于飞行且栖宿于树上，但遇惊扰时多奔跑逃窜。非繁殖期小群觅食、栖宿，并用粗短的叫声相互联系，在水洼附近常见一大群成对繁殖。以长而强壮的爪挖掘地下的种子、嫩芽、树叶、块茎、花蕾、脱落的浆果，以及昆虫为食。 · 巢 隐于低层植被中，身体压成地面浅坑，上铺稀疏的树叶。 · 地理分布 非洲的索马里、埃塞俄比亚和肯尼亚。 · 附注 最大型的鸢珠鸡类。 头颈部的皮肤裸露 排列紧密的棕色小羽翎 胸羽细长 地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所    	迁徙 不迁徙

科名 拟鹑科	学名 <i>Mesitornis unicolor</i>	身长 30 厘米
褐拟鹑(Brown Mesite) 生活于热带雨林中的稀有鸟类，在地面觅食种子、浆果和小昆虫。圆头和尖喙类似雀形目鸟类，身体结实笨重，尾部出奇地宽，翅短圆，不善飞翔。腿足强健而轻，因此可以敏捷地行走和奔跑。筑巢于树上，巢址位于可以上下走动的斜干上或树枝交叉处。 · 巢 由细枝编成的浅盘状巢，内铺稀疏的杂草或树叶。 · 地理分布 马达加斯加岛东部。 擅长在光线微弱处发现食物的大眼 翅短圆，较少用于飞行 大而宽的尾 地栖鸟的长腿 轻巧的脚 头部小而圆  地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 三趾鹑科	学名 <i>Turnix sylvatica</i>	身长 13 厘米
林三趾鹑(Small Button-Quail) 开阔林地、灌丛和草地中的地栖鸟类，外形和行为均与鹌鹑相似。但嘴较细长，时常隐避，可由柔和低沉的叫声判定其位置，雌鸟略大于雄鸟，羽色也较鲜亮，在繁殖、鸣叫和建立领地居于支配地位。雄鸟孵蛋并照料长有绒羽的幼鸟。 · 巢 位于草丛地面上的浅坑，内铺细杂草，并习惯用草茎和树叶把巢遮盖起来。 · 地理分布 西班牙南端，非洲部分地区及巴基斯坦、印度、菲律宾等东南亚国家。 闪亮的浅色虹膜 干草般的保护色 足强壮，没有后趾  地理分布图 		
羽色 雌雄略有不同	栖所   	迁徙 不迁徙

科名 领鹌科	学名 <i>Pedionomus torquatus</i>	身长 17 厘米
领鹌(Plains Wanderer) 居住在干旱开阔的草地上，体形小巧，有强健的腿和脚、明亮的眼睛和细长的嘴，与林三趾鹌的外形相似。行动谨慎，有时振翅扑飞，有时出现在篱笆或土丘上，偶尔也松懈地抬脚站在草丛上，以种子和昆虫为食，雌鸟羽色比雄鸟多彩闪亮，繁殖时居于主导地位，雌鸟可与几只雄鸟交配，而孵蛋和照顾幼鸟的任务主要由雄鸟承担。 · 巢 草丛或小灌丛旁边的地面浅坑，内垫杂草。 · 地理分布 澳大利亚东南部内陆地区。  地理分布图  雄鸟  雌鸟		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 四处游荡



多花纹的颈部


棕色胸斑

雌鸟

雄鸟

地理分布图

· 地理分布 澳大利亚东南部内陆地区。

科名 鹤科	学名 <i>Grus canadensis</i>	身长 105 厘米
加拿大鹤(Sandhill Crane) 体形最小的鹤类，体羽灰色，与红色冠部和白色脸颊形成鲜明的对比。用湿嘴梳理羽毛时，使水中的铁盐沾在羽毛上而带有暗红色。生活于开阔的沼泽草地，迁徙时聚成嘈杂的大群，觅食时成对分散，以种子、花蕾、谷物、嫩芽、树叶、昆虫、鼠类等小动物为食。 · 巢 在湿地以植物茎叶堆成呈浅窝状的大型巢。 · 地理分布 繁殖于西伯利亚东北部、北美洲至佛罗里达，过冬区在墨西哥以北的北美洲。  地理分布图  小型鹤特有的细长体形  大腿覆盖着羽毛  裸露的红饰斑  下垂的繁殖羽  草地型鸟类以大跨步行走		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 迁徙

裸露的红饰斑


小型鹤特有的细长体形

大腿覆盖着羽毛

下垂的繁殖羽

草地型鸟类以大跨步行走

地理分布图




科名 鹤科	学名 <i>Grus japonensis</i>	身长 140 厘米
-------	---------------------------	-----------

丹顶鹤(Japanese Crane)

全世界最大的一种鹤类，栖息于广阔的河滩沼泽地带。身材高大，在栖地中具有很大的优势，能正确判断敌情，所以总安然举步，并不时停下来啄食鼠、蛙、较大的昆虫和一些种子、嫩芽及树叶。飞行时伸直颈和双腿，振翼缓慢而有节奏，间有滑翔，群飞时排列成“人”字形或呈斜线，飞行能力卓越。迁徙路线和觅食地点通常固定不变，配对后雌雄之间的关系更加亲密，常相互炫耀，抬头并肩站在一起，发出似喇叭的嘹亮叫声，然后跳舞，狂舞的丹顶鹤不断抬头、低头，拍打双翅，动作笨拙地向空中跳跃，有时会叼起树枝或草束抛向空中，动作与平时温和的举止截然不同。每次产 2 枚蛋，幼鸟孵出后，其中一只很快就会夭折，幸存者紧随双亲生活，靠亲鸟哺喂小昆虫等食物，直到下一个繁殖季。

- 巢 以周围的植物茎叶堆积而成的浅窝。
- 地理分布 繁殖于日本、西伯利亚东部和中国北部，在朝鲜、中国东北和日本南部过冬。



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 鹤科	学名 <i>Grus grus</i>	身长 112 厘米
-------	---------------------	-----------

灰鹤(Common Crane)

生活在沼泽地，除了头顶的红色和可以传得很远的叫声，外形无特别之处。求偶炫耀和飞行中都会发出叫声，以昆虫、蛙、鼠、种子和植物茎叶为食，冬季栖息于农田等干燥的环境。

- 巢 芦苇、杂草和植物堆成，中间有浅窝，位于沼泽地或浅水中。
- 地理分布 繁殖于欧亚大陆，于欧亚大陆南部、非洲西北和东北部、印度和中国过冬。
- 附注 灰鹤的繁殖需要大面积无干扰的沼泽、草地、茂盛的灌木丛或林地，但 20 世纪以来人类的开垦，使它们的栖息地明显减少。




裸露的
红色饰斑

下背的垂羽
炫耀时会
竖起



地理分布图



亚成鸟

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 鹤科	学名 <i>Balearica regulorum</i>	身长 105 厘米
-------	-------------------------------	-----------

东非冕鹤(Grey Crowned-crane)

灰色体羽上有白翼斑，在飞行和炫耀时特别醒目，栖息于沼泽地带，取食昆虫、青蛙和蟾蜍，以及谷物等植物。飞行时颈和腿微微下垂，姿态笨拙，通常栖宿在树上，配对后的亲鸟会翩翩起舞，并发出两种声调响亮的鸣声，藉以相互炫耀。

- 巢 芦苇、灌木和杂草堆成平坦的巢团，隐藏在沼泽植被中。
- 地理分布 近缘种的黑冕鹤，曾在撒哈拉南部边缘和苏丹发现踪迹。




长而尖的羽冠

红色喉垂

白色翼斑

颈和胸有长羽毛



地理分布图



亚成鸟

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 秧鹤科	学名 <i>Aramus guarauna</i>	身长 65 厘米
--------	---------------------------	----------

秧鹤(Limpkin)

嘴、颈、腿和脚细长，翅膀短圆，属热带和亚热带森林沼泽中的涉禽，善游泳，白天隐居，黄昏和晚上活动，会发出尖啸的“咯咯”声，两侧扁而尖的嘴有助于吸取蜗牛肉，故以水中的大型蜗牛为主食，也取食软体动物，及蠕虫、爬虫类等各种水中生物。

- 巢 由树枝和灌木枝所筑，位在地面、湿地及中低高度的树上。
- 地理分布 从佛罗里达州经加勒比海地区至阿根廷。




两侧扁平的嘴适于吸取蜗牛肉



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 喇叭鸟科	学名 <i>Psophia viridis</i>	身长 50 厘米
---------	---------------------------	----------

喇叭鸟(Dark-winged Trumpeter)

常展开翅膀，发出宏亮似吹喇叭的恐吓声而得名，表示友好时会发出低沉的隆隆声。通常在地面上活动，弓背行走，凭藉长而强壮的腿快速奔跑，翅膀软弱无力，飞行十分费力，喜欢栖宿于很高的树上。集成小群，在地上觅食鹦鹉和猴子从树上摇下来的浆果、坚果、昆虫；对其繁殖行为所知甚少。

- 巢 树木枝叶构成的松散结构，位于高树的树洞、敞开的树干或光秃的枝桠分叉上。
- 地理分布 巴西境内亚马孙河中、下游地区。



背部弓起

强健的腿 善于行走



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 秧鸡科	学名 <i>Rallus aquaticus</i>	身长 28 厘米
--------	----------------------------	----------

秧鸡(Water Rail)

性情胆怯的沼泽鸟类，叫声尖亮，只在有植被掩护的安全环境较胆大活跃，尤其不轻易靠近开阔地带，夜晚时才敢冒险到开阔地带觅食。以探针似的长嘴啄取水生昆虫、蜗牛、青蛙或其他小动物，也以嘴像凿斧一样劈剥小鸟和鼠类的外皮，善于低头快跑和游泳。

- 巢 位于芦苇、苔草丛基部，杂草编成的杯状巢。
- 地理分布 繁殖于欧亚大陆、北非和中东，部分种群向南迁徙到中东和亚洲西南部过冬。



地理分布图



白色的尾下覆羽

体腹灰蓝色



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 秧鸡科	学名 <i>Gallirallus philippensis</i>	身长 30 厘米
--------	------------------------------------	----------

黄斑秧鸡(Buff-Banded Rail)

常出没在海边、淡水湖、沼泽、湿地水域岸边等有杂草灌木的地方，羽色毛斑点并具条纹，与生活环境中的树叶和低层植物色泽接近，有保护作用。性情羞怯，白天隐藏在稠密的植被中，黄昏和晚上才大胆地出来活动，遇惊扰则摇摆双腿笨拙地飞离。种群终年固守一地，也有些种群则会长距离迁徙。食物包括昆虫、无脊椎动物、种子和植物。

- 巢 地面浅坑，内铺杂草和树叶，隐藏在距水面有一定距离的稠密植被中。
- 地理分布 菲律宾、苏拉威西、新几内亚、澳大利亚、新西兰和西太平洋群岛。



地理分布图




细长体形适于在灌木草丛间穿梭

身体拱起 头颈向上 伸展的姿势



羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 秧鸡科	学名 <i>Gallirallus australis</i>	身长 53 厘米
新西兰秧鸡(Weka) 体型粗壮，不善飞行，生活在植被茂盛的草原、灌木丛和林缘。不畏惧人，常可见其轻摇尾巴，不慌不忙地四处踱步，遇到危险时可快速逃窜或逃走。在地面取食，食性广泛，包括蚯蚓、野鼠、小型鸟类、鸟蛋、植物种子和嫩草等。 · 巢 苔草和禾草的浅杯状巢，隐于草丛或枯枝间。 · 地理分布 新西兰。 · 附注 被隔离的岛屿种群之一，具有不善飞翔、体形变大等岛屿种特征。  地理分布图  翅弱小而不善飞翔 两腿强健，相距较宽		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 秧鸡科	学名 <i>Sarothrura lugens</i>	身长 15 厘米
栗头侏秧鸡(Chestnut-headed Flufftail) 生活于热带草原中草木丰茂的林垦地和沼泽湿地，常躲在浓密的植被中，又具夜行性，因此很难发现，通常只能听到独特的叫声。以蚂蚁等昆虫为主食，也吃植物种子，英文名字“FLUFFTAIL”源于纤细而质地松软的尾羽。 · 巢 尚无记录。 · 地理分布 分布于赤道至津巴布韦北部等非洲热带地区。 · 附注 非洲的 9 种绒尾秧鸡之一，鸣声宏亮而尖厉，与众不同。  地理分布图  雌鸟 膨松、柔软的尾羽		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙


科名 秧鸡科	学名 <i>Gallinula chloropus</i>	身长 33 厘米
--------	-------------------------------	----------

红冠水鸡(Common Moorhen)

警觉性高，叫声尖厉，生活在水边，也在陆地上行走，游泳时会不停地点头。以昆虫、小型水生物、水生杂草、种子和浆果为食。

· 巢 芦苇秆或其他植物的茎干筑成简单的碗状巢，建于茂盛的植被中或漂浮于水面上。

· 地理分布 非洲、欧洲和美洲的部分地区，以及南至爪哇群岛，东至太平洋西岸的亚洲地区。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 秧鸡科	学名 <i>Porphyrio martinica</i>	身长 33 厘米
--------	-------------------------------	----------

紫青水鸡(Purple Gallinule)

外形类似黑水鸡，但羽色更鲜亮，体形、颈和腿都较修长，成鸟腿部为金黄色，额板亮蓝色。生活于气候温暖，植被高而茂盛的湖泊、池塘、航道及湿沼泽地带，能以长脚趾轻松地涉水或在漂浮的睡莲上行走，从不远离藏身的植被，有时冒险到开阔地取食。以向前纵跃的方式行走，偶尔双腿下垂作短距离飞行。常跳上芦苇、稻米、灌丛或小树上取食无脊椎动物、青蛙、水生植物种子和浆果。

· 巢 以新鲜或干枯的灯心草、狗尾草的茎叶筑成的杯状巢，位于沼泽地、近水边植物或水面以上的灌木丛中。



地理分布图



· 地理分布 美国东南、中美洲、西印度群岛至南美，主要在阿根廷北部。



羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 鳍足科	学名 <i>Podica senegalensis</i>	身长 58 厘米/50 厘米
--------	-------------------------------	----------------

鳍脚鹈(African Finfoot)

喙细长与头、颈、身体形成优美的流线型，善于游泳，可将整个身体浮在水面上，也常将身体浸入水中，只露出头颈部。宽大而具肉质瓣蹼的脚，作用像“桨”一样，生活在枝干伸展到水面上的水边树林和灌木丛中，活动隐蔽，在陆上和水中的活动时间几乎相等，以昆虫和水生动物为食。

- 巢 草和植物茎筑成大型扁平巢，位于水边稠密植被或部分浸水的枝干上。

- 地理分布 撒哈拉以南。

- 附注 雌鸟体羽比雄鸟鲜亮，在产卵时居主导地位，雄鸟负责守护巢及幼雏。



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 鹭鹤科	学名 <i>Rhynochetos jubatus</i>	身长 55 厘米
--------	-------------------------------	----------

鹭鹤(Kagu)

栖息在山地边缘，有林下植被和溪流的森林中，矮胖的蹲踞式体态、粗壮的腿、强健的喙都适于陆栖。已失去飞行能力，仅能从山坡上向下滑翔。行走时常敲打地面，寻食蚯蚓和其他小生物；求偶炫耀时会将蓬松的冠羽竖成呈高耸的扇状，或张开翅膀，展示飞羽上栗、白、黑三色相间的花纹。非繁殖期成松散的小群，繁殖期成对活动，常发出嘈杂的咯咯声，黄昏时配偶间以一种有节奏的声音保持联系。

- 巢 以枝叶筑成松散的地面巢。
- 地理分布 太平洋西南的新喀里多尼亚。



地理分布图

冠羽竖起

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 鸨科	学名 <i>Otis trda</i>	身长 100 厘米/80 厘米
-------	---------------------	-----------------

大鸨(Great Bustard)

具长颈和长腿，在草原栖息地中可以看得很远，行走缓慢而稳健，很少飞行。春季雄鸟选择同一块“求偶场”，集群向雌鸟炫耀求偶，雌鸟负责筑巢抚育幼雏，以蚯蚓及其他小动物为食。

- 巢 于农田或高草丛中的地面浅凹。
- 地理分布 繁殖于西班牙部分地区、摩洛哥、欧洲东部、亚洲中部和东部，冬季在繁殖区的南部过冬。



地理分布图



炫耀时
扭动双翅

炫耀中的雄鸟

雌鸟


羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鸨科	学名 <i>Eupodotis afra</i>	身长 53 厘米
-------	--------------------------	----------

小黑鸨(Black Korhaan)

身体结实健壮，栖息于草原及其他开阔地区。体背都具保护色，可避免被空中的捕食者发现。雄鸟颈和腹部为醒目的黑色，停栖于高处或炫耀飞行时，会反复发现刺耳的“科-瑞-科”声，炫耀时，先拍翅向上飞，然后振翼悬足缓慢落下。成对生活且共同维护领地，步调沉稳昂首行进，取食地面上的新鲜植物，也食昆虫。

- 巢 矮树丛中或草地上用身体压成的浅坑。
- 地理分布 非洲南部。




地理分布图



背部的
保护色

长腿善于
行走

雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 水雉科	学名 <i>Hydrophasianus chirurgus</i>	身长 55 厘米
--------	------------------------------------	----------

水雉 (Pheasant-tailed Jacana)

生活于湖泊和沼泽中，藉长腿、长趾、长爪分担体重，使之能在漂浮的水生植物上行走。以无脊椎动物、蛙和鱼为食，一只雌鸟可以和十只雄鸟交配，雄鸟孵化抚育自己的幼雏。

- 巢 位于漂浮的植物叶上，以干的水生杂草或其他植物筑成。
- 地理分布 印度半岛、中国中部向南经东南亚到爪哇和菲律宾等地。
- 附注 雌鸟与雄鸟外形相近，但雌鸟体形较大，羽色更鲜亮。



冬羽

尾细而下垂

繁殖期时雌雄两性都有长尾

黑色翅端

双翼白色

长趾和长爪



地理分布图

羽色 雌雄略有不同	栖所  	迁徙 部分迁徙
-----------	--	---------

科名 水雉科	学名 <i>Jacana spinosa</i>	身长 24 厘米
--------	--------------------------	----------

距翅水雉 (Northern Jacana)

有长腿、长趾及长爪，可在水面漂浮的植物上行走。很少游泳，偶尔飞行，飞行时双腿下垂且速度缓慢。长距离飞行时，双腿向后伸展，爪突出，落地后将翅折起。雌雄均会举起翅膀，露出翅下的鲜黄色斑块互相炫耀，雌鸟比雄鸟大，繁殖期由雌鸟控制较大的领域，领域内有四只雄鸟，每只雄鸟有巢，孵化由雌鸟产的卵，并抚育幼雏。

- 巢 以干的水生杂草在漂浮的植物上筑巢。
- 地理分布 中美洲及加勒比海地区的大岛屿上。



柔软的肉垂

亚成鸟

长趾及长爪



地理分布图


羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 彩鹬科	学名 <i>Rostratula benghalensis</i>	身长 25 厘米/28 厘米
--------	-----------------------------------	----------------

彩鹬(Greater Painted - snipe)

生活在浅水沼泽区，终日藏身在矮草丛或芦苇丛中，藉羽色的保护而不易被发现。以喙插入水中探寻食物，取食蚯蚓、甲壳动物、昆虫和植物种子。在繁殖初期，雌鸟常在领域上空炫耀飞行，并发出轻微似鸫的叫声；一只雌鸟可与多只雄鸟交配，雄鸟负责孵化并抚育幼雏。

- 巢 用植物在沼泽植被中堆积而成。



地理分布图

- 地理分布 分散在非洲、亚洲及澳大利亚的东部和北部。
- 附注 雌鸟比雄鸟体形大，且羽色鲜艳。



利于夜间取食的大眼睛

雌鸟羽色较暗而且羽纹较粗

适于涉水的长腿

雄鸟

雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 蟹鸻科	学名 <i>Dromas ardeola</i>	身长 40 厘米
--------	--------------------------	----------

蟹鸻(Crab Plover)

生活于沙岸或潮滩上，取食动作和斑鸻类似，通常先奔跑，然后突然戮击捕食地面上的蟹，硬喙可啄碎蟹壳。飞行低而慢，常成群取食，停栖时在沙滩上聚成大群落。

- 巢 长达 1.5 米以上的坑穴，在岛屿或海边沙丘上群巢密布。
- 地理分布 印度洋、红海和波斯湾的沿岸地区，部分种群冬季南迁至马达加斯加岛和马来半岛。
- 附注 世界 220 种滨鸟中，唯一会筑洞巢的一种鸻鸟。



地理分布图



飞行时长腿后伸

亚成鸟

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 蛎鹬科	学名 <i>Haematopus ostralegus</i>	身长 43 厘米
--------	---------------------------------	----------

蛎鹬(Eurasian Oystercatcher)

生活于沙岸或泥岸上，十分胆大，具有黑白两色的羽毛和鲜明的橙红色喙，常发出细长的“科-累-坡”声。飞行时露出翅上大而白的条纹和白色的尾部，冬季的种群常在开阔的岸边或港湾取食，以刀锋般的喙击碎甲壳动物、蠕虫和小鱼。求偶时，雄鸟常低垂着喙不停地跑来跑去，并发出嘈杂的颤音，或缓慢振翅飞行来炫耀。

- 巢 在砾石堆、沙土或草丛中以身体压成的凹坑。
- 地理分布 繁殖于欧洲北部、亚洲中部和东北部，冬季南迁到非洲、印度和中国南部。



地理分布图



扁平如刀锋的喙

飞行时露出翅上的白条纹

亚成鸟



羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 反嘴鹬科	学名 <i>Himantopus mexicanus</i>	身长 35 厘米
---------	--------------------------------	----------

高跷(Black-necked Stilt)

双腿修长的岸边鸟类，善于在水中来回摆动长喙，取食水生昆虫和其他小型无脊椎动物，有时也将喙插入淤泥中觅食。飞行时露出窄长、上下均为黑色的翅膀。集群活动，有时和他种鸟聚集成混合群。生活在淡水或海水沼泽等浅水区域，由于栖息地容易干涸，或仅有一段时期适于营巢，因此常四处游荡寻找新的巢址。

- 巢 在开阔的干燥地带或矮草丛中，先用脚在地面挖坑，然后依靠体重压成凹巢，内衬细树枝。遇水位上涨时，迅速在草丛中以茎叶堆成坚固的杯状巢。
- 地理分布 繁殖于从加拿大边境到巴西南部的美洲地区，北部种群冬季在繁殖区内南迁。



黑色颈背

翅狭长



地理分布图




羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 迁徙/四处游荡
---------	---	------------

科名 反嘴鹬科	学名 <i>Recurvirostra avosetta</i>	身长 43 厘米
---------	----------------------------------	----------

反嘴鹬(Pied Avocet)

喙细长而向上弯曲，长腿，趾间有蹼，喜在海水及淡水交汇的水域活动，出没在港湾、海滨泻湖及咸水湖边。在浅水地带取食，站在水中摆动头部，将喙不断地来回摇摆以探寻水中的小动物，也会直接啄取食物，有时则像鸭子一样倒立在水中取食，筑巢于水边开阔地带。

- 巢 地面凹洞，裸露或衬以巢边的植物茎秆、禾草或鹅卵石。
- 地理分布 繁殖于不列颠群岛的远东地区的欧亚大陆，冬季南迁至非洲、巴基斯坦和中国。




长而向上弯曲的喙


翅狭长

趾间有蹼，为其他滨鸟少有的特征

亚成鸟



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 石鹬科	学名 <i>Burhinus oedicnemus</i>	身长 40 厘米
--------	-------------------------------	----------

欧洲石鹬(Stone Curlew)

生活在半沙漠、亚热带荒原、田地等开阔地带。白天隐蔽，受到惊扰时只奔跑而不起飞，夜晚则可以飞到远处觅食，通常在黄昏或天黑后活动，捕食昆虫和其他无脊椎动物。个体在夜晚相遇时，相互炫耀并发出嘈杂的叫声，凄厉的叫声在远处可听见。

- 巢 以脚在地面挖出凹坑，用身体压成形，有时内衬小石子。
- 地理分布 繁殖于欧洲西部和亚洲中部，冬季时南迁到非洲、印度和东南亚的部分地区。



羽纹是很好的保护色


大眼 利于夜晚取食

翼上有白色条纹

强壮的腿适于旱地上觅食



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 石鸻科	学名 <i>Burhinus giganteus</i>	身长 55 厘米
--------	------------------------------	----------

滨石鸻(Beach Thick-knee)

身体笨重，常出现在平坦的沙滩，特别是靠近陆地的红树林沼泽中，有时也在珊瑚礁上活动。白天常懒散地停栖在树阴中或站在海边水中休息，黄昏及夜晚，则以有力的喙在岸边取食蟹及其他生物。很少飞翔，沿着岸边高视阔步，即使遇到危险，也只是奔跑逃离。飞行时，浅灰色翅膀上露出两道明显的白色翼斑。

· 巢 在沙滩上以身体压成的浅凹，靠近冲上岸边的木块或其他废弃物边。

· 地理分布 东南亚、澳大利亚和新喀里多尼亚群岛的海岸线上。



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 燕鸻科	学名 <i>Pluvianus aegyptius</i>	身长 22 厘米
--------	-------------------------------	----------

尼罗鸻(Egyptian Plover)

生性大胆，身体上有一三角形的黑色斑块，与白色、灰色、栗色的羽色形成对比；适于在热带地区及大河边炎热的沙滩上生活，取食地面或飞行中的昆虫。可以快速低飞，常成对或集小群，鸣声为短而尖的高音。繁殖期常把卵埋在沙中，以防空中的天敌发现，并常用腹部的羽毛携带河水来湿润卵。

· 巢 沙岸上的浅凹。

· 地理分布 热带非洲。



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 燕鵒科	学名 <i>Cursorius temminckii</i>	身长 20 厘米
--------	--------------------------------	----------

黑腹走鵒(Temminck's Courser)

在干燥而适于奔跑的大片开阔地带栖息，也常在矮草地、灌木林及焚烧过的荒地中活动。体形修长，常露出栗、黑相间的腹部站立，警觉地四下张望，飞行时会快速而剧烈地扇动。用细而弯的喙取食地面的昆虫和其他无脊椎动物，也吃植物种子。繁殖期在平坦开阔的地带成对活动，只在幼雏刚孵出的几天里喂食，随后幼雏就开始学习自己取食，通常亲鸟仍会坚持继续喂食，直到幼雏会飞为止。

- 巢 在裸地或松软的沙土上用脚挖出浅坑，再用身体压成型。
- 地理分布 撒哈拉以南的非洲开阔地区。
- 附注 包括走鵒、燕鵒、石鵒、蛎鵒、山鵒和鹬科等许多水边生活鸟类，亲鸟在幼雏刚孵出的几天里都有喂雏行为。其他没有喂雏行为的鸟类，幼雏孵出后几小时就可以活动，并自行取食。

两道纹在颈后会合

身体修长

适于快速奔跑的长腿

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 燕鵒科	学名 <i>Stiltia isabella</i>	身长 23 厘米
--------	----------------------------	----------

澳洲燕鵒(Australian Pratincole)

翅长，形似燕子，生活于岸边，在空中和地面取食，飞行时振翅动作生硬而有力。也常在开阔的地带奔走，捕食地表的昆虫，有时跳起捕食低飞的昆虫。栖息于海滩、湖边等开阔地带，有时在距水 2 公里外的地带也可见到。

- 巢 用脚挖出浅坑，再以身体压成凹坑，有时衬小石子。
- 地理分布 繁殖于澳大利亚，冬季移栖至澳大利亚北部、新几内亚、苏拉威西、婆罗洲。

长翅

短尾

黑色腹部

亚成鸟

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 燕鸥科	学名 <i>Glareola nordmanni</i>	身长 25 厘米
--------	------------------------------	----------

黑翅燕鸥(Black-winged Pratincole)


生活于岸边，可像燕子一样在空中捕食昆虫。眼大，嘴宽阔，翅长而窄，尾部分叉，长脚适于在地面取食昆虫，飞行时可见黑色翼羽。群集，在黎明和黄昏取食，繁殖期群集在平原湖泊的边缘，有低矮植被的沼泽或裸露的泥沼地，通常在地面休息、筑巢，由于羽色与栖地相近而不易被发现。

- 巢 裸露的浅地洞，位于稀疏的植被中或裸地上。
- 地理分布 繁殖于亚洲中部，在撒哈拉以南的地区过冬。



体腹白色


长而宽的翅膀



地理分布图



冬羽

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 鸻科	学名 <i>Vanellus vanellus</i>	身长 30 厘米
-------	-----------------------------	----------

小瓣鸻(Northern Lapwing)

生活在农场或放牧用的矮湿草地上，春季，雄鸟常在巢区上空进行“翻筋斗”一样的飞行，并发出狂噪的“坡—乌—特”声。取食时靠视觉发现食物，先跑几步，然后突然啄击蚯蚓、昆虫和其他小型无脊椎动物。繁殖期过后开始集群，迁徙到温暖湿润的过冬区，大多向西迁移。

- 巢 在开阔地或草丛中，先用脚挖浅坑，再用身体压成凹坑，把伸颈即可取得的植物茎、叶衬在巢内。
- 地理分布 繁殖于欧亚大陆，大多在欧洲过冬，或南迁至非洲北部和印度西北部。



细长的黑色冠羽

夏季，雌鸟的喉与面羽比雄鸟的白



地理分布图



雄鸟夏羽



雌鸟夏羽



冬季雌雄羽色

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 鸻科	学名 <i>Anitibyx armatus</i>	身长 30 厘米
-------	----------------------------	----------

黑铁匠鸻(Blacksmith Plover)

警觉性高，平时很安静，只有在受惊吓时才会发出打铁似的响亮叫声。生活于湖泊、大河边湿润的矮草地、稀疏灌木丛等较开阔的地区，常单独或成对活动，非繁殖期时偶尔群集。飞翔时会鼓动宽大的翅膀，露出白色的翼下覆羽，尾部白色，尾端呈黑色，翅膀前端具有尖锐的刺，用于打斗，以昆虫、蠕虫和软体动物为食。

- 巢 以脚在地面挖出浅坑，再用身体压成凹坑，衬上稀松的干粪块、小鹅卵石及植物的茎。
- 地理分布 赤道以南的非洲开阔地区。

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 鸻科	学名 <i>Pluvialis dominica</i>	身长 25 厘米
-------	------------------------------	----------

金斑鸻(American Golden Plover)

背部具金色斑点，腹部黑色，面部围绕着白色羽毛，外形独特；背部的羽色是苔原地带最好的保护色，不易为天空中的天敌所发现，黑色的腹部则是醒目的炫耀饰羽。繁殖于北极较干燥的苔原地带，冬季在海滨、沼泽或草原上过冬。典型的捕食方式是先快速奔跑，然后啄击地面的蠕虫、昆虫及其他无脊椎动物，藉着其狭长渐尖的翅膀可以迁徙到远方。

- 巢 浅凹巢，内有薄的衬垫物，位在视野开阔、易察觉天敌的位置。
- 地理分布 繁殖于北美洲北部，冬季在巴西南部、阿根廷北部和乌拉圭过冬。

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 鸻科	学名 <i>Pluvialis squatarola</i>	身长 28 厘米
-------	--------------------------------	----------

灰斑鸻(Grey Plover)

生活于苔原地带，羽色黑白相间，具有狭长渐尖的翅，飞翔能力强，能长距离迁徙。冬季为灰色体羽，体腹白色，黑色胁羽，发出“希-乌乌-”的叫声。在退潮后的泥滩上取食，取食时缓慢行走，啄取泥中的蠕虫、小贝类、甲壳动物及其他无脊椎动物。

- 巢 高出地面，较干燥处的浅凹，内衬稀疏的苔藓、地衣碎片等。
- 地理分布 繁殖于北美洲北部、欧亚大陆北部的苔原地带，冬季移栖至世界各地的海滨。

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 鸻科	学名 <i>Eudromias morinellus</i>	身长 22 厘米
-------	--------------------------------	----------

小嘴鸻(Eurasian Dotterel)

利用短暂的夏季在高山地带繁殖，雌鸟比雄鸟大，繁殖羽也较鲜艳，在繁殖中居主导地位。向雄鸟炫耀求偶，有时一只雌鸟可以与多只雄鸟交配，产卵后雄鸟帮助孵卵并抚育幼雏。性情温顺驯服，不适于在人为干扰的环境活动，繁殖期后会聚集成小群迁徙。以昆虫、蜘蛛及无脊椎动物为食。

- 巢 在开阔的地面营巢，先以脚在地面挖出浅坑，然后用身体压成巢型。
- 地理分布 繁殖于欧亚大陆北部，冬季移栖至地中海一带过冬。

羽色 雌雄略有不同	栖所	迁徙 迁徙
-----------	----	-------

科名 鸻科	学名 <i>Charadrius hiaticula</i>	身长 19 厘米
-------	--------------------------------	----------

环颈鸻(Ringed Plover)

黑白相间的羽毛是鹅卵石地带的良好保护色，飞翔时会露出白色翼斑。生活于海滨、沙滩及退潮后的泥岸，有时也见于内陆水域，以小昆虫和其他小型无脊椎动物为食。



地理分布图

- 巢 滨海沙滩或鹅卵石间的浅凹。
- 地理分布 加拿大东北到西伯利亚东部北极海滨，在非洲过冬。



白色颈羽

体腹白色


适于奔跑的长腿

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 鸻科	学名 <i>Charadrius vociferus</i>	身长 27 厘米
-------	--------------------------------	----------

双领鸻(Killdeer)

与小瓣鸻一样栖息在农田中，狭窄长翅和白色翼斑则和环颈鸻类似。在草地、沼泽、河湾取食，在屋舍周围也可见到，十分嘈杂，叫声类似“科-鹅欺勒”，以昆虫、蠕虫等为食。



地理分布图

- 巢 地面的浅凹状巢，内衬鹅卵石，偶尔也营巢于平坦的屋顶。
- 地理分布 繁殖于北美、中美和南美洲，北部种群冬季南迁。




颈上有两条黑色带纹

橙色腰羽

长尾

翅膀狭长

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 鸻科	学名 <i>Anarhynchus frontalis</i>	身长 20 厘米
-------	---------------------------------	----------

弯嘴鸻(Wrybill)

喙弯向一侧，便于在河床上搜寻卵石下的水生昆虫及其他无脊椎动物，也可能食鱼卵。在具卵石的河岸筑巢，冬季集群在海滨小港湾活动。

- 巢 在卵石间筑浅凹状巢。
- 地理分布 新西兰。
- 附注 全世界唯一喙侧弯的鸟。




分叉状的过眼线

胸前黑色带纹


腹部白色



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 鹬科	学名 <i>Limosa haemastica</i>	身长 39 厘米
棕膝鹬(Hudsonian Godwit) 腿长，喙微微上翘，适于在高草丛和泥沼中取食，涉入深及腹部的水中，将喙和头没入水里取食昆虫、蠕虫及其他无脊椎动物。筑巢于接近开阔水域的沼泽地或河口地带。春季时雄鸟炫耀飞翔，展示前半黑色其余白色的翼下覆羽。冬季羽色变暗，但翅及尾仍保有原来的黑白色斑。 · 巢 浅地洞，内衬苔藓或树叶。 · 地理分布 繁殖于阿拉斯加及加拿大的北极地带，在南美洲东南部过冬。  地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙



科名 雉科	学名 <i>Numenius arquata</i>	身长 60 厘米
杓鹬(Common Curlew) 生活于岸边，步态高傲，体羽具棕色斑纹。喙长而向下弯曲，音似“科屋-鹅勒”的幽幻鸣声，十分引人注意。保护领地、进行炫耀飞行时较容易被发现。在沼泽高地、草原及泥塘繁殖及栖息，以长喙取食地面上的昆虫及其他无脊椎动物。冬季群集飞向海滨过冬，在海岸、河口将长喙插入泥沙中取食蠕虫、小螃蟹和软体动物。 · 巢 筑于草丛和石楠丛中的浅凹状巢，内衬周围的植物。 · 地理分布 繁殖于欧亚大陆北部，在欧亚大陆和非洲的海岸过冬。  地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙



科名 鹬科	学名 <i>Tringa totanus</i>	身长 28 厘米
-------	--------------------------	----------

赤足鹬(Common Redshank)

在岸边生活，警觉性高，常直立长腿，高昂头部，迅速发现周围的入侵者，并发出尖厉的示警声，使周围其他的鸟类也产生警觉。喙和腿红色，飞翔时露出白色的尾上覆羽和翅膀后缘；春季在湿草地及沼泽中抚育幼雏，取食位在草丛、地面或沼泽中，先悄悄接近猎物，然后快速啄食昆虫和其他无脊椎动物；冬季在河口、退潮后的泥滩上活动，在泥沼表面取食，或将长喙插入泥中，取食贝类、甲壳动物及其他小生物。


- 巢 在高草丛或其他植丛中筑巢，先用脚在地面挖浅洞，再用身体压成型。
- 地理分布 繁殖于冰岛、不列颠群岛至亚洲东部，冬季在欧亚大陆、非洲、印度及东南亚的海岸过冬。



身体修长

飞翔时露出白色的翅膀后缘

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 鹬科	学名 <i>Tringa melanoleuca</i>	身长 35 厘米
-------	------------------------------	----------

大黄脚鹬(Greater Yellowlegs)

活跃于岸边，常在浅水中涉水活动，叫声尖厉。春季在沼泽和针叶林边缘栖息，背侧为黑白相间的羽色，腹侧斑纹醒目。冬季在湖边和退潮后的泥滩上活动，探取泥中的无脊椎动物，并褪换成较淡的羽色。

- 巢 位于近水的开阔地带，以苔藓或干土筑成浅凹状巢，内衬植物。
- 地理分布 繁殖于北美洲，过冬区从美国南部延伸到南美洲南部。




喙细长


尾斑


冬季羽色暗淡


细长的腿 适于涉水

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 鹬科	学名 <i>Arenaria interpres</i>	身长 24 厘米			
翻石鹬(Ruddy Turnstone) 生活于岸边，体态健壮，常忙碌地用喙翻开石块和海藻，寻找躲在下面的小生物，飞翔时露出翅上的黑白斑，是最大特征。  地理分布图 · 巢 地面的浅凹状巢。 · 地理分布 繁殖于极地附近，冬季在世界各地的海岸线上过冬。  冬羽 条纹羽冠  <tr><td>羽色 雌雄略有不同</td><td>栖所 </td><td>迁徙 迁徙</td></tr>			羽色 雌雄略有不同	栖所 	迁徙 迁徙
羽色 雌雄略有不同	栖所 	迁徙 迁徙			

科名 鹬科	学名 <i>Phalaropus lobatus</i>	身长 20 厘米			
红领瓣足鹬(Red-necked Phalarope) 春季在北极苔原地带的水洼中取食水生物，迁徙距离很长。  地理分布图 · 巢 隐于草丛中的地面浅坑，内衬植物。 · 地理分布 繁殖于高纬度的北极区，在大洋中过冬。  冬羽 雌鸟 雌鸟羽色比雄鸟鲜艳 平淡的稻草色条纹  <tr><td>羽色 雌雄略有不同</td><td>栖所 </td><td>迁徙 迁徙</td></tr>			羽色 雌雄略有不同	栖所 	迁徙 迁徙
羽色 雌雄略有不同	栖所 	迁徙 迁徙			

科名 鹬科	学名 <i>Calidris canutus</i>	身长 27 厘米			
漂鹬(Red Knot) 夏季羽色为栗、黑、白三色相间，冬季在退潮后的泥滩上集群活动，取食无脊椎动物，体羽为淡灰色。  地理分布图 · 巢 地面浅洞，内衬地衣。 · 地理分布 繁殖于北极苔原地带，冬季在世界各地的滨海沙滩上活动。  夏羽纹饰复杂 冬羽  <tr><td>羽色 雌雄相似</td><td>栖所 </td><td>迁徙 迁徙</td></tr>			羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙			

科名 鹬科	学名 <i>Scolopax rusticola</i>	身长 34 厘米
-------	------------------------------	----------

山鹬(Eurasian Woodcock)

陆生森林鸟类，冬夏栖息地相近。大多于夜间在湿沼泽地带取食，以细长敏感的喙端，在泥地或软土中扒食无脊椎动物。雄鸟在黄昏和黎明在领域内的树梢上慢飞，发出尖厉的鸣叫求偶炫耀。

- 巢 苔藓地面的凹洞，上铺枯叶。
- 地理分布 繁殖于欧亚大陆，冬季向西南迁徙，至北非、印度和东南亚过冬。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 鹬科	学名 <i>Gallinago gallinago</i>	身长 27 厘米
-------	-------------------------------	----------

田鹬(Common Snipe)

喙直而长，在沙锥类中占最大的身长比例，喙尖柔韧，能探入软泥中觅食蠕虫、小型软体动物和其他生物，眼睛位于头部的上后方，休息和吃食时仍能维持警戒。栖息于低矮的沼泽植被或草地上，藉条纹羽毛藏身，受惊扰时则旋转起飞。刚孵出的幼雏仅具短喙，由双亲喂哺蠕虫，求偶时身体垂直俯冲，外侧尾羽会产生像小羊叫的“咩咩”声，就如在铁轨上滑行一样。



地理分布图

- 巢 以脚扒并用身体压成浅洼，内铺杂草。
- 地理分布 繁殖于北美洲及欧亚大陆，冬季最南可至南美北部和中非过冬。




羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 鹬科	学名 <i>Calidris alba</i>	身长 20 厘米
-------	-------------------------	----------

三趾滨鹬(Sanderling)

外形精巧似玩具，常在岸边随波漂荡，捕食被水冲过来的有壳水生动物、小虾、沙蚤和其他小动物。除短暂的繁殖季栖息在北极苔原带外，大部分时间均生活在海滨，常与其他海鸟混合成群。

- 巢 铺有地衣的洼地。
- 地理分布 繁殖于北极地区的加拿大、格陵兰和西伯利亚，过冬区遍及世界各地的海滨。



地理分布图



春羽

翅端成尖锥状

体腹白色



冬羽



夏羽

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 鹬科	学名 <i>Philomachus pugnax</i>	身长 30 厘米/25 厘米
-------	------------------------------	----------------

流苏鹬(Ruff)

生活于沼泽和草地中，取食昆虫、蠕虫及种子。繁殖时雄鸟具大而蓬松的领羽和簇状耳羽，个体间的羽色图案不同，雄鸟会在求偶舞场炫耀，吸引雌鸟交配，其后雌鸟单独营巢。

- 巢 地面浅洞，内衬杂草，筑于高草丛中。
- 地理分布 繁殖于欧洲、北极的西伯利亚和阿拉斯加的部分地区，冬季移栖于亚、欧、非、澳大利亚以及南美洲的部分地区。



地理分布图



簇生耳羽

颈羽

翼羽有皱褶



雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 种鹑科


学名 *Thinocorus orbignyianus*

身长 22 厘米

种鹑(Grey-breasted Seedsnipe)

生活于南安第斯山高原，气候严酷时迁至低海拔地区，十分耐寒。地栖，体圆腿短，嘴短而钝，取食种子、浆果及植物的其他部位。奔跑迅速，但遇险时多蹲伏、隐蔽或作“之”字状飞行。雌雄均能发出短促的示警和联系声，求偶时低空飞行，或自岩石顶端飞下来，并重复发出“咯咯咯”的叫声。

· 巢 筑于露天的凹洞或低矮植物中，内铺稀疏的植物碎片。



地理分布图

· 地理分布 南安第斯山脉和南美最南端。

· 附注 原由海鸟进化而来，但地栖和生活习性都和山鹑等猎禽相似。



羽色 雌雄不同

栖所

迁徙 不迁徙

科名 鞘嘴鸥科

学名 *Chionis alba*

身长 39 厘米

白鞘嘴鸥(Snowy Sheathbill)

栖息在南半球的大西洋海岸礁石地带，与海豹、企鹅、鸕鹚等海鸟一起生活，取食鸟蛋及动物腐尸。体形肥壮，奔跑迅速，短暂飞行时将粗重的腿悬在空中，但长距离穿越水面时则折起双足，飞行强而有力。

· 巢 以贝壳、卵石筑成，结构松散，位于悬崖或崖礁的缝隙中。

· 地理分布 繁殖于南极海岸及近海岛屿，冬季移栖至福克兰群岛和阿根廷南部。

· 附注 由海鸟演化成的腐食性鸟类。嘴上覆盖鞘状物，脸部皮肤裸露，在食腐时不致弄脏羽毛。



地理分布图

羽色 雌雄相似

栖所

迁徙 迁徙

科名 贼鸥科	学名 <i>Catharacta skua</i>	身长 58 厘米
大贼鸥(Great Skua) 形似海鸥的大型食肉海鸟，在栖息地常占有优势，平时飞行，慢而有力，猎食时择十分迅猛，求偶期会不断举翅炫耀白色翼斑，态度强硬地驱赶进入领地的竞争者。以捕食鱼类、海鸟、未离巢的雏为生，也猎食其他鸥、鸭和海鸟为生。 · 巢 在地面凹洞铺上草、苔藓或石楠属植物，常在海岛中集体筑巢。 · 地理分布 繁殖于北大西洋，冬季移栖于海洋中，最远可达赤道海域。  地理分布图 羽色 雌雄相似 栖所   迁徙 迁徙		

科名 贼鸥科	学名 <i>Stercorarius longicaudus</i>	身长 55 厘米
长尾贼鸥(Long-tailed Skua) 翅膀狭长的海鸟，成鸟具细长的中央尾羽。十分灵活地盘旋在水面，觅食浅海生物或船只遗弃的鱼类，也抢食鸥或燕鸥咬在嘴上的鱼。在北极繁殖地则猎取旅鼠和其他小动物，也食浆果。 · 巢 在凹洼处铺上苔藓、地衣或草而成。 · 地理分布 繁殖于欧亚大陆和北美洲北部，冬季在太平洋和大西洋的南部过冬。  地理分布图 亚成鸟  羽色 雌雄相似 栖所   迁徙 迁徙		

科名 鸥科	学名 <i>Larus pacificus</i>	身长 63 厘米
-------	---------------------------	----------

太平洋鸥(Pacific Gull)

翅膀及背部黑色，嘴为鸥类中最大者。往来于海岸线搜寻食物，潜水捕食鱼类、枪乌贼、蟹和其他水生生物，可衔着大型的有壳水生动物，在岩石上摔裂而食，也吃蛋及海鸟巢中的幼雏，甚至小型的成鸟。以零散的小群在海边活动，偶见于内陆。

- 巢 位于灌丛或岩石下，松散的草丛或植物结构。
- 地理分布 仅分布于澳大利亚西部和南部的海岸。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 鸥科	学名 <i>Larus delawarensis</i>	身长 45 厘米
-------	------------------------------	----------

环嘴鸥(Ring-billed Gull)

具米灰色背部，尖嘴上有黑色镶边。于湖边或水库边有密集的群巢，冬季常于海边出没，捕食鱼、地面的无脊椎动物或动物腐尸为生。

- 巢 地面上由植物构成的不规则巢。
- 地理分布 繁殖于北美洲北部，冬季在北美和中美洲、巴哈马群岛和加勒比海北部过冬。



亚成鸟



地理分布图


羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 鸥科	学名 <i>Larus canus</i>	身长 40 厘米
-------	-----------------------	----------

海鸥(Common Gull)

具纤细的嘴，头型圆而平，在内陆的地面寻食蠕虫、昆虫、鼠类、浆果及掉落的壳物，也在浅水中觅食。常和其他鸥鸟一起活动，群巢筑于海边或内陆，有时位在远离水域的高沼地或草地中。


- 巢 地面的自然凹洞，内铺干草或其他植物。
- 地理分布 繁殖于欧亚大陆、非洲北部、北美洲北部和西部，北方种群在此范围内南迁。



地理分布图



亚成鸟


羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 鸥科	学名 <i>Larus argentatus</i>	身长 63 厘米
-------	----------------------------	----------

黑脊鸥(Herring Gull)

生活在滨海城镇、港口和垃圾堆中，强健有力，常反复以假声鸣叫号哭，是海鸟的典型代表。食性极广，是城市垃圾清道夫，也捕食小动物。不远涉海洋，已成为内陆鸟，在沙丘、悬崖和建筑物上营群巢。

- 巢 地面的浅杯状巢，由附近的植物筑成。
- 地理分布 繁殖于北半球大部分地区，冬季在北半球南部的中美洲、非洲北部和东北部、印度、亚洲东南部过冬。



地理分布图



亚成鸟

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 鸥科	学名 <i>Larus atricilla</i>	身长 42 厘米
-------	---------------------------	----------

笑鸥(Laughing Gull)

夏季出没于北美海岸，具黑色冠羽，生性大胆好奇。随时随地均可觅食，捡食耕地中蠕虫、被冲到海岸的腐尸及船只丢弃的食物残渣。集群繁殖于近海或海岛的沼泽湿地中。

- 巢 植物筑成的杯状巢，位于较高植物或灌丛中。
- 地理分布 繁殖于美国东部、南部和加勒比海，冬季南迁至秘鲁。

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 鸥科	学名 <i>Larus ridibundus</i>	身长 41 厘米
-------	----------------------------	----------

红嘴鸥(Black-headed Gull)

飞行灵活，常不停地鸣叫，出没于海边及内陆，随机觅食小动物、食物碎屑和废渣。集大群繁殖于淡水或咸水沼泽中。冬季飞至郊区、垃圾堆、湖泊和水库栖息。

- 巢 宽杯状巢，附近的植物材料筑成。
- 地理分布 繁殖于欧亚大陆和北美洲东部，西伯利亚和欧洲东北部种群，于冬季南迁至非洲和亚洲。

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 鸥科	学名 <i>Rhodostethia rosea</i>	身长 34 厘米
-------	------------------------------	----------


罗氏鸥(Ross's Gull)

繁殖于接近极区的迁徙鸟，体形小而匀称，于海岸和岛屿筑小规模群巢。冬季在海洋浮冰的边缘活动，飞翔时露出翅膀下的灰斑和锥形尾部，在水面或潜水捕食小鱼和甲壳类动物，有时行走于平泥地啄食小型无脊椎动物。



冬羽

- 巢 以草和树叶筑于地面上的杯状巢。
- 地理分布 繁殖于阿拉斯加北部、加拿大北部、格陵兰岛及西伯利亚北部，冬季在北冰洋、北大西洋和北太平洋过冬。



地理分布图



钝锥的楔形
尾端，与多数鸥类不同

短腿

腹侧淡粉色
的红晕

细窄的黑色
颈圈

羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 鸥科	学名 <i>Rissa tridactyla</i>	身长 43 厘米
-------	----------------------------	----------


三趾鸥(Black-legged Kittiwake)

腿短，尾端具“V”字形开口。大部分时间生活于海上，上岸繁殖于悬崖和峭壁的洞穴中，以小型甲壳动物及鱼类为食。



亚成鸟

- 巢 将泥、草、海藻压紧成圆筒状，位于小突起物或岩石的凸出处。
- 地理分布 繁殖于北冰洋、南大西洋、北太平洋海岸，冬季在海洋中过冬，向南可远及热带地区。



地理分布图



在海面觅食
时喙上分泌出
液态油脂

纯黑色翅端

体背及
翼纯灰色


羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 燕鸥科	学名 <i>Chlidonias niger</i>	身长 25 厘米
--------	----------------------------	----------

黑浮鸥(Black Tern)

夏季生活于内陆，冬季在海洋中掠水觅食，不潜水，仅捕食水面的昆虫和小鱼，集群繁殖于浅湖或积水的沼泽地。

- 巢 松散的水生植物，内铺精致巢材，位在岸边或漂浮于水面。
- 地理分布 繁殖遍及北美、欧洲及西伯利亚中部，冬季最南可达南美洲西北部和波斯湾过冬。



地理分布图



以长翅在水面灵活地飞翔、觅食

细小的喙

冬羽

腿短

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 燕鸥科	学名 <i>Sterna caspia</i>	身长 53 厘米
--------	-------------------------	----------

里海燕鸥(Casplan Tern)

燕鸥中最大的一种，喙粗大，飞行缓慢，叫声低沉。掠过水面或俯冲潜水捕食鱼虾。栖息在海岸、岛屿和大湖泊中，营群巢，有时也单独配对繁殖。

- 巢 用脚扒并用身体压成的浅坑，有的铺稀疏的植物。
- 地理分布 繁殖于北美、欧亚大陆、非洲和澳大利亚，冬季可至南美北部和亚洲东部过冬。



冬羽



粗大的喙




夏羽



收起的翅膀末端交叉

尾短而钝，末端分叉

秋羽



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 燕鸥科	学名 <i>Sterna hirundo</i>	身长 37 厘米
--------	--------------------------	----------

燕鸥(Common Tern)

大部分时间在海上及大的湖面上飞行，常盘旋在水面上，然后潜入水中捕食鱼和甲壳动物。营群巢，集群迁徙。

- 巢 地面浅坑，有时内置衬垫物。
- 地理分布 繁殖遍及北半球，冬季在南极地区沿海过冬。




冬羽

以尖喙俯冲潜水捕食


短腿不常行走、奔跑

翅狭长

尾长而呈深叉状



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 燕鸥科	学名 <i>Sterna dougallii</i>	身长 39 厘米
--------	----------------------------	----------

红燕鸥(Roseate Tern)

羽色洁白，具流线型长尾，繁殖期在白羽毛上出现浅红的色彩。常潜入水中捕食小鱼，在沙堤、卵石海岸或远洋岛屿上营群巢繁殖。

- 巢 地面浅坑。
- 地理分布 在大陆块的海岸上繁殖，非繁殖期在繁殖区内迁移。



亚成鸟

叉状长尾

白色的翅膀和背羽



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 燕鸥科	学名 <i>Larosterna inca</i>	身长 42 厘米
--------	---------------------------	----------

印加燕鸥(Inca Tern)

体色深灰，白色的卷曲触须突出在外。常在靠近岸边的海面上飞翔，动作灵活，捕食水面上小鱼，有时也捕食被海狮、鲸和鸬鹚惊起的鱼群，常集成大群。

- 巢 岩缝中的平坦处，

或潜鸟、企鹅等海鸟的旧巢穴。

- 地理分布 繁殖于南美洲秘鲁和智利北部海岸，冬季从厄瓜多尔南迁至智利中部。



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 燕鸥科	学名 <i>Anous stolidus</i>	身长 39 厘米
--------	--------------------------	----------

玄燕鸥(Brown Noddy)

大部分时间在深海或岸边的海面上飞行，常在水面低飞，拍翅迅速。觅食时，从盘旋中向下俯冲，捕捉水面上的鱼和枪乌贼；常栖息在岸边树木或岩石上休息，有时也在水中漂浮或睡觉；求偶炫耀时，雌雄鸟均会点头展示浅灰色前额，因此英文名字称为“点头”鸥。

- 巢 由细枝和海草堆成，位于

于树上、灌丛或地面。

- 地理分布 太平洋、大西洋和印度洋热带海域。



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 燕鸥科	学名 <i>Gygis alba</i>	身长 32 厘米
--------	----------------------	----------

白燕鸥(White Tern)

生活在热带海洋中，外形高雅纤细，性情极温驯，可让人类接近。具有叉状尾，翅膀较宽圆，长喙略向上倾斜，是唯一一种纯白羽色的燕鸥。常在深海或海岸附近的海面上飞行，就像浮在空中一样灵巧地作出各种动作。觅食时先飞上高空，然后降至水面捕食鱼和小鱿鱼，也能在鱼跳上水面时抓住他们。常在天黑后到水面捕食，大眼睛可能是为适应夜间觅食而进化。

- 巢 不营巢，雌鸟在树枝、枝桠分叉上、苔藓或岩石的突出部分下蛋和孵化。
- 地理分布 太平洋、大西洋和印度洋。



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 剪嘴鸥科	学名 <i>Rhynchops niger</i>	身长 46 厘米
---------	---------------------------	----------

黑剪嘴鸥(Black Skimmer)

生活在海岸、港湾和江河中，下喙长于上喙，喙两侧加厚似垂直的刀锋。沿水面飞行觅食时，以下喙入水搜寻，触及鱼时马上闭紧双喙，在海岸和沙堤上集群生活、繁殖。

- 巢 以脚和身体在沙地上压成浅坑，内无衬物。
- 地理分布 从美国东部到南美洲南部。



地理分布图


羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 海雀科	学名 <i>Alle alle</i>	身长 22 厘米
--------	---------------------	----------

小海雀(Little Auk)

黑白羽色，体形矮胖，翅窄小，可旋转飞行。在海上觅食时可潜入水中游动，以翅控制方向，捕食小型浮游生物。在北极的岩石堆中集大群繁殖，冬季在开阔的海面上过冬，有时遇风暴则会在内陆地区出现。

- 巢 产卵于无铺垫的岩缝或洞穴中。
- 地理分布 繁殖于北极海岸，冬季在北大西洋海域过冬。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 海雀科	学名 <i>Alca torda</i>	身长 43 厘米
--------	----------------------	----------

刀嘴海雀(Razorbill)

生活在悬崖上，刀状的黑喙上有白纹，双腿位在体腹较下方处，因而行走笨拙，但在海面游动时便于向前推动；在深水中潜泳时以翅改变方向，捕食鱼类。

- 巢 单枚卵，产于其栖息的岩石背后、岩缝或巨石下。
- 地理分布 繁殖于北大西洋的北美洲和欧洲沿岸，冬季在北大西洋海域中过冬。



地理分布图



冬羽



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 海雀科	学名 <i>Fratercula cirrhata</i>	身长 38 厘米
--------	-------------------------------	----------

花魁鸟(Tufted Puffin)

体形笨重，繁殖期以头上一丛向后伏贴的饰羽及嘴鞘来炫耀。肌肉发达，需拍翅助跑才能从水面起飞，群集在岩礁岛屿繁殖，冬季迁至海洋中。

- 巢 岩缝内衬草及羽毛的坑穴。
- 地理分布 繁殖于北太平洋海岸，在北太平洋海域过冬。



短尾

求偶炫耀的羽冠

嘴鞘在冬季消失



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 海雀科	学名 <i>Fratercula arctica</i>	身长 32 厘米
--------	------------------------------	----------

北极海鹦(Atlantic Puffin)

身体矮胖，头大尾短，具眼罩和巨大的喙。求偶期喙端出现红色的鞘，喙基有灰色三角和黄条纹，雌雄鸟面对面叩击双喙炫耀。拍翅迅速，飞行有力，可潜游捕鱼，尤擅捕沙鳗鱼，以嘴带回食物喂养幼鸟；群集在海岸或悬崖顶繁殖，在海洋中过冬。

- 巢 地洞内衬草及羽毛的浅坑。
- 地理分布 繁殖于北大西洋海岸，在北大西洋海域过冬。



炫耀用的橙色肉垂在冬季消失

站姿

短尾



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 沙鸡科	学名 <i>Pterocles lichtensteinii</i>	身长 25 厘米
--------	------------------------------------	----------

横斑沙鸡(Lichtenstein's Sandgrouse)

在半沙漠灌丛区的多岩山地活动，以种子、金合欢属和灌丛植物为食。酷热的午间不活动而栖于阴凉处，利用黄昏后或黎明前饮水。叫声低沉，两声一度，在离水源 30 公里处筑巢，雄鸟以腹羽携水喂食雏鸟。


- 巢 裸地上的浅坑。
- 地理分布 散布在摩洛哥、非洲、阿拉伯半岛和巴基斯坦。



地理分布图



雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 沙鸡科	学名 <i>Pterocles alchata</i>	身长 28 厘米
--------	-----------------------------	----------

白腹沙鸡(Pin-tailed Sandgrouse)

在平坦干燥的地域活动，羽毛上精致的色斑在沙地、卵石和稀疏植被中具保护作用。集群活动，有时集松散的小群繁殖；以短腿奔走觅食种子、嫩芽和树叶，常飞到远处浮在水面上饮水，雄鸟以胸部软羽带水喂食雏鸟。


- 巢 裸地上的浅坑。
- 地理分布 繁殖于葡萄牙、西班牙、法国南部、非洲北部、中东和亚洲中部，中亚种群冬季迁至巴基斯坦和印度半岛西半部。



地理分布图



雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 鸠鸽科	学名 <i>Columba livia</i>	身长 32 厘米
--------	-------------------------	----------

野鸽(Rock Dove)

信鸽、赛鸽、观赏鸽等各种鸽子的野生祖先，有许多已形成半野生种，生活在城市里。真正的野生原种鸽，在洞穴的突出处和悬崖裂缝中筑巢，以种子为食。

- 巢 细枝和羽毛筑成简陋的平台，位于岩石突出处或建筑物中。
- 地理分布 欧洲西部、非洲北部、中东到印度，半野生种遍及全世界。



地理分布图



颈羽上有光泽

两条黑色翼斑

粉红色的脚

典型的街鸽

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鸠鸽科	学名 <i>Columba guinea</i>	身长 33 厘米
--------	--------------------------	----------

点斑鸽(Speckled Pigeon)

外形与街鸽相似，颈羽尖端呈银色并略分叉。求偶时雄鸟颈羽蓬起，栖息于野外的悬崖和峡谷，或和原鸽一样生活于人类的建筑物中，以谷物、种子、树叶、嫩枝和绿色植物的嫩芽为食。

- 巢 由草、细枝、树干构成的平台，位于洞内凸起、悬崖突出处、建筑物或桥上。
- 地理分布 分布在非洲撒哈拉以南的无树地区，有两个分隔的地理种群。



地理分布图



眼周围皮肤裸露

炫耀时颈羽会蓬起

三角形翼斑

长翅

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鸠鸽科

学名 *Columba palumbus*

身长 42 厘米

斑尾林鸽(Common Wood-pigeon)

颈和翼有白斑，从林栖鸟演化而来。已习惯农园的环境，常在树上发出“科-喔”的低沉喉音显示其存在。直线飞行，速度快，求偶炫耀时先大声拍翅，垂直向上飞后向下滑落。群性强，在非繁殖季也集群生活，鸽群受惊吓时会发出极响的拍翅声，以种子、浆果、芽苞和叶子为食，短腿利于攀树觅食橡果。

- 巢 由细枝构成浅碟状巢，隐秘地悬挂大树上。
- 地理分布 北欧、北非经中东到印度北部。

虹斑

白颈斑



亚成鸟



地理分布图



林鸽的短足



羽色 雌雄相似

栖所



迁徙 部分迁徙

科名 鸠鸽科

学名 *Streptopelia turtur*

身长 28 厘米

欧斑鸠(Common Turtle-dove)


翼上覆羽有黑色和古铜色交叉成的格状斑纹。飞行速度快，拍翅声短而清脆，在林地生活，夏季飞行时发出柔和的“咕咕”声。觅食地面的种子、叶子和幼芽。

- 巢 矮树或灌丛中由树枝构成的薄平台。
- 地理分布 繁殖于欧洲和东亚，在非洲过冬。

眼睛周围的裸皮

颈斑 黑白相间

古铜色羽缘形成的格子图案



地理分布图


尾羽 羽缘白色

强健的腿 适于地面觅食



羽色 雌雄相似

栖所



迁徙 迁徙

科名 鸠鸽科	学名 <i>Streptopelia decaocto</i>	身长 30 厘米
斑鸠(Collared Dove) 羽色平淡，颈背有黑带纹，鸣叫三声一度。在开阔林地、农田、郊区花园中活动，以野生种子、谷物、浆果和家畜草料为食，炫耀时以滑翔展示黑白相间的尾下覆羽。 · 巢 针叶树上由细枝构成的薄平台。 · 地理分布 由欧洲经中东、南亚和东亚到中国朝鲜半岛。 · 附注 自 1930 年起，分布区由巴尔干半岛扩及全欧。  地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 鸠鸽科	学名 <i>Reinwardtoena reinwardtsi</i>	身长 50 厘米
赤灰长尾鸠(Great Cuckoo-dove) 生活于热带林缘的长尾树栖鸟，大多在林冠中上层出没，较少在地面活动，以树上或掉落地面的浆果为食。飞翔有力，体态优美，常独自活动，只在林中食物丰富处短时间群集。和许多叫声似杜鹃(见 188 页)的棕长尾鸠合称为“鹃鸠”，为三声一度重复的鸣叫或快速的笑鸣。 · 巢 树上或灌丛的平行枝干上，以根、苔藓、蕨类和树枝筑的浅碟状巢。 · 地理分布 新几内亚和摩鹿加群岛。  地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 鸠鸽科	学名 <i>Oena capensis</i>	身长 25 厘米
--------	-------------------------	----------

小长尾鸠(Namaqua Dove)

体形小，长尾末端尖细，外形和生活习性均类似虎皮鹦鹉(见 177 页)。雄鸟脸上有面罩羽似的黑羽和鲜艳的喙，雌雄鸟飞行时均可见栗橙色翼羽。飞行迅速、拍翅快但无规律，在干燥开阔的灌丛和农田中单只、成对或小群活动，觅食地上的小种子；在较干旱的地区则四处游荡，一发现水和食物就迅速群集。

· 巢 矮灌丛中小而薄的碟状巢，以小树根、细枝、草茎装饰。

· 地理分布 非洲撒哈拉以南、中东及阿拉伯半岛部分地区。



黑色脸颊及喉部

具光泽的深色翼斑



地理分布图



雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 部分迁徙/四处游荡
---------	----	--------------

科名 鸠鸽科	学名 <i>Phaps elegans</i>	身长 29 厘米
--------	-------------------------	----------

林铜翅鸠(Brush Bronzewing)

体形粗壮，在矮密植被处活动，和栖息地一致的羽色具保护作用，翼上有两道由紫而古铜的虹状斑纹。常成对穿梭在矮树、灌丛、海边石楠丛或开阔林地的下层，觅食地上的种子，有时冒险到附近的农田食取谷物；在黄昏后和黎明前才机警安静地到水边饮水，鸣声低而哀沉。

· 巢 矮树、灌丛或地面的隐密处由细枝及茎构成的坚实平台。

· 地理分布 澳大利亚西南和东南端、塔斯马尼亚岛。



头上的栗色条纹



地理分布图



雌鸟

彩虹翼斑

尾部呈钝锥状

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 鸠鸽科	学名 <i>Leucosarcia melanoleuca</i>	身长 37 厘米
巨地鸠(Wonga Pigeon) 生活于雨林和落叶林地地面，叫声尖厉而不断重复，有异物接近时才哑然停止。遇危险会在林地中长途奔走窜逃，或短暂飞行后停在枝头窥探。独自或成对活动，在食物丰富处集大群取食掉落的果实、浆果和种子。 · 巢 树林中的水平枝叉上由细枝构成的平台。 · 地理分布 澳大利亚的东部和东南部。  地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 鸠鸽科	学名 <i>Zenaida macroura</i>	身长 32 厘米
哀鸽(Mourning Dove) 出没在干旱灌丛、开阔林地、农田、花园及城镇中，快速飞行时伴有呼呼的拍翅声，着地后尾羽向上翻转。繁殖期以外成对小群活动，在觅食或栖息处则集大群，鸣声为一连串哀沉的“咕咕”声。觅食地上的小种子、谷物及绿色嫩枝。雄鸟求偶时，拍翅上飞后垂直滑下，弄出响声炫耀，或在地面低头展示蓬松的颈羽。 · 巢 树上或灌丛中，衬着细茎的树枝平台。 · 地理分布 繁殖区由美、加交界处延伸至巴拿马、加勒比海北部和巴哈马，北部种群在此范围内南迁。  地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙


科名 鸠鸽科	学名 <i>Geophaps plumifera</i>	身长 22 厘米
--------	------------------------------	----------

刺草地鸠(Spinifex Pigeon)

翅和尾较短，体羽棕色，冠羽细而直立。生活在沙漠和半沙漠水源区的多刺草丛中，以种子为食，偶食昆虫。


- 巢 滨刺草等有刺的草丛下方，以身体压成浅凹，内衬细枝。

- 地理分布 澳大利亚南回归线以北的干旱区。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鸠鸽科	学名 <i>Geopelia cuneata</i>	身长 20 厘米
--------	----------------------------	----------

宝石姬地鸠(Diamond Dove)

体形小巧，长尾有白色羽缘，飞行时露出栗色翼斑。于矮树和灌丛中成对小群在地上觅食小种子、植物的叶和芽，傍晚到水坑喝水，鸣声为高亢忧郁的“咕咕”声。

- 巢 树上细枝条和植物茎杆编成小平台。
- 地理分布 澳大利亚北部、西部和半干旱的沙漠区。




地理分布图



亚成鸟




羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鸠鸽科	学名 <i>Columbina passerina</i>	身长 17 厘米
--------	-------------------------------	----------

地鸠(Common Ground-dove)

体形粗壮，成对小群在地上行走，觅食掉落的种子，飞行时露出栗色翼斑。

- 巢 地面或树上由细枝构成的松散平台。
- 地理分布 中南美洲。



地理分布图



雌鸟



羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------


科名 鸠鸽科	学名 <i>Caloenas nicobarica</i>	身长 33 厘米
--------	-------------------------------	----------

蓑鸽(Nicobar Pigeon)

外形奇特的岛鸠，头颈细，喙上有竖起的肉垂，白色短尾，尖长的颈羽能蓬起。

在林下植被层活动，游荡在岛屿间觅食水果和种子，巢群范围大而密集。

- 巢 灌木或乔木上由细枝松散构筑的巢。
- 地理分布 从孟加拉湾的尼科巴群岛、亚洲东南部到印尼、新几内亚和所罗门群岛。



地理分布图



长而蓬松的颈羽

喙上不规则状的肉垂

粗大有力的脚

戴着脚环的笼鸟

亚成鸟

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 四处游荡
---------	--	---------

科名 鸠鸽科	学名 <i>Gallicolumba luzonica</i>	身长 29 厘米
--------	---------------------------------	----------

吕宋鸡鸠(Luzon Bleeding Heart)

长期生活在灰暗的雨林，每只鸟都有不同的红色胸斑，用来相互识别。在矮灌丛中活动，安静地觅食种子、浆果和蜗牛、蛆等无脊椎动物。

- 巢 以细枝随便筑在灌木或矮树上。
- 地理分布 菲律宾群岛北部。



地理分布图



鲜明的胸斑

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鸠鸽科	学名 <i>Goura victoria</i>	身长 75 厘米
--------	--------------------------	----------


维多利亚凤冠鸠(Victoria Crowned Pigeon)

体形巨大，头顶的扇状簇羽耸立，雄鸟炫耀时一边向雌鸟展露头冠和尾部，一边发出柔和的“嗡嗡”声。雌雄两性都会摇尾并张开旗帜般的翅膀，作出威吓和防御的动作。在雨林中慢慢地到处走动，捡食掉落的水果、种子和浆果。在树枝上栖息和筑巢，遇险时笨拙地飞上树枝。

- 巢 树上由大量树枝构成大而结实的平台状巢。
- 地理分布 新几内亚北部。



地理分布图



浅色翼斑

腿上有鳞皮


羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鸠鸽科	学名 <i>Treron bicincta</i>	身长 29 厘米
--------	---------------------------	----------

橙胸绿鸠(Orange-breasted Green-pigeon)

典型的食果鸠，具有适于攀树的强健腿足，以硬喙啄食松软的无花果、野枣和浆果，成群在低枝或灌丛中活动，在地面走动、喝水时尾部上翘，姿态笨拙。

- 巢 邻近空地的小树上，由细枝构成薄平台状巢。
- 地理分布 印度及东南亚部分地区。



地理分布图



强壮的脚可紧握栖木

尾末端白色



雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鸠鸽科	学名 <i>Ptilinopus superb</i>	身长 22 厘米
--------	-----------------------------	----------

壮丽果鸽(Superb Fruit – dove)

羽色鲜丽，在林中阳光斑驳的果实和叶簇间具保护作用，觅食树上富含脂质的小果实，成对或独自生活，仅在食物丰富处暂时聚成大群。

- 巢 树木或葡萄藤上由细枝编成的平盘状巢。
- 地理分布 澳大利亚东部、苏拉威西岛经新几内亚到所罗门群岛。



地理分布图



白色的腹部和尾下覆羽

绿色背羽
· 上有深色斑点



雌鸟



羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 鸠鸽科	学名 <i>Ducula pacifica</i>	身长 35 厘米
--------	---------------------------	----------

灰头皇鸠(Pacific Imperial Pigeon)

栖息于多树的小岛和环状珊瑚岛上，成群在岛屿间徘徊。在高处枝叶间攀爬摘采果实和浆果，可敏捷飞越宽广的洋面，常在树冠顶部发出单调的嗒叫声。

- 巢 大树高处以光秃的枝条构成平盘状巢。
- 地理分布 从新几内亚东北部群岛，经汤加、斐济、新喀里多尼亚群岛到太平洋西南海域的岛屿。



地理分布图



喙上的肉垂

可长距离飞行的长翅



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 鸠鸽科

学名 *Lopholaimus antarcticus*

身长 43 厘米

髻鸠(Topknot Pigeon)

体形大，羽色蓝灰，尾长，双冠贴伏在前额和颈背上，喜成群在雨林中游荡觅食树顶的果实。腿足短而有力，在取食时能紧握细枝，也能倒挂着身体轻拍翅膀，以保持在原位。喝树洞和湿叶子上的水，或倒挂在矮枝上喝小溪或水池的水，很少在地面活动。

- 巢 树的高处由细枝构成的平盘状巢。
- 地理分布 澳大利亚东部。



地理分布图



羽色 雌雄相似

栖所

迁徙 迁徙

科名 鸠鸽科

学名 *Hemiphaga novaeseelandiae*

身长 51 厘米

新西兰鸠(New Zealand Pigeon)

体型粗壮，绿紫夹杂的光泽羽毛在树叶间具有保护作用，但攀树觅食时常为稳住身体大声拍翅，易被发现。食取果实、浆果、嫩芽、花朵、乔木和灌木的叶子，也会到地面的小型植物上觅食，或冒险进入邻近森林的农园中。成对小群生活，雄鸟展开双翅和尾羽，快速上飞后向下滑翔来炫耀。

- 巢 枝头上由细枝构筑的松散巢。
- 地理分布 新西兰。



地理分布图



羽色 雌雄相似

栖所

迁徙 不迁徙

科名 鸚鵡科	学名 <i>Chalcopsitta duivenbodei</i>	身长 32 厘米	
褐色吸蜜鸚鵡 (Duyvenbode's Lory) 颜色暗淡，以森林中的树花为食，在分布区相当常见。薄薄的舌头上有特殊的突起，可以帮助他们舔食花粉，在醴类的食物中提供蛋白质。常成对或 6~8 只成一群，在低地雨林的树顶觅食、活动，发出尖厉叫声和短而刺耳的召唤声，有时也与虹彩吸蜜鸚鵡等食蜜鸟混杂在一起取食。 · 巢 尚无记录。繁殖季节会探查大树高处的树洞，似乎在洞中筑巢。 · 地理分布 新几内亚北部低地。 冠羽在兴奋时竖起 黄色翼斑 脚短而强健，适于树栖 地理分布图    <tr><td>羽色 雌雄相似</td><td>栖所 </td><td>迁徙 不迁徙</td></tr>	羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙	

科名 鸚鵡科	学名 <i>Trichoglossus haematodus</i>	身长 26 厘米
虹彩吸蜜鸚鵡(Rainbow Lorikeet) 羽色鲜艳，常成群啁啾尖叫，在开花的树上觅食。栖息在低地森林、开阔林地和公园中，以花粉和花蜜为食，也吃种子、果实和昆虫。 · 巢 中空的粗枝或树干的洞巢。 · 地理分布 印尼东部、新几内亚、太平洋群岛西南部到新喀里多尼亚群岛、澳大利亚北部、东部和南部。 · 附注 羽色随分布而不同，有些岛屿无蓝和红羽毛的该鸟。		
 地理分布图	 翼下覆羽黄色  红颈圈型	
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 鸚鵡科	学名 <i>Vini peruviana</i>	身长 18 厘米
--------	--------------------------	----------

塔布吸蜜鸚鵡(Tahitian Lorikeet)

生活在偏远的热带岛屿上，以椰子花的花蜜和花粉为食。脸颊下方和喉部有三角形白斑，喙和脚为鲜红色，全身其余羽毛皆为深蓝色，在羽色大多复杂鲜艳的吸蜜鸚鵡中，此品种稀少且十分特别。

- 巢 乔木或断裂的椰子树干中的树洞巢。
- 地理分布 南太平洋、社会群岛（塔布堤岛已绝迹），已在库克群岛引进。
- 附注 由于引进天敌黑鼠，鸟巢被破坏而几乎绝种。

均匀的深蓝色羽毛

树栖鸟特有的短而强健的脚

锥形短尾

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鸚鵡科	学名 <i>Charmosyna papou</i>	身长 42 厘米
--------	----------------------------	----------

巴布亚吸蜜鸚鵡(Papuan Lorikeet)

生活在山边的热带森林中，羽色绚丽多彩，以树上附生植物的花、花蜜、花粉及浆果、种子为食。尾羽长而弯曲，有碍在树枝间跳跃。常成对或集成小群，在离地较高的树枝上活动，在树枝间缓慢地直线飞行，尾羽拖曳在后。鸣声柔和。

- 巢 尚无记录。
- 地理分布 新几内亚山区。
- 附注 另有红色羽毛被黑色取代的黑色型。

颈背 蓝黑相间

体腹羽毛 红色

中间两根尾羽较长

黑色型

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鸚鵡科	学名 <i>Calyptrorhynchus funereus</i>	身长 68 厘米
--------	-------------------------------------	----------

黑色凤头鸚鵡 (Yellow-tailed Black Cockatoo)

喙巨大，可破坏树木和鸟笼等任何未加防护的木质结构，在森林中以撕开树枝取食蛀虫和甲虫为生，也吃种子、坚果、浆果和花。在树枝上栖息、觅食，喜在黎明和傍晚去喝水，常贴近树端飞过寻找食物，拍翅缓慢而有弹性。成鸟鸣声高亢悠长，亚成鸟则发出“嗒嗒”声，彼此间以响亮鸣声保持联系。飞翔时露出明显的黄色颊斑和尾羽。

- 巢 中空 的粗树枝和树干上的洞，宽敞而无衬垫物。
- 地理分布 澳大利亚东部和南部，从昆士兰南部到艾耳半岛和塔斯马尼亚岛。



地理分布图



黄色颊斑

喙巨大

长尾的外缘为黄色

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鸚鵡科	学名 <i>Cacatua galerita</i>	身长 35 厘米
--------	----------------------------	----------

葵花凤头鸚鵡 (Sulphur-crested Cockatoo)

在农田等开阔的地面觅食种子、嫩芽、叶片和果实，或用喙掘食根、块茎和球茎，因而雪白的羽毛上常沾有泥土。常集成大群发出尖厉的鸣叫，晚上栖宿在树上，炎热的中午也在树上休息。

- 巢 无铺垫的树洞巢。
- 地理分布 新几内亚、澳大利亚。



地理分布图



冠羽直立

喙有力


羽色纯白


腿足短而强健

尾短圆

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------


科名 鸚鵡科		学名 <i>Eolophus roseicapillus</i>	身长 35 厘米
粉红凤头鸚鵡(Galah) 澳大利亚最常见的鸚鵡，体羽呈灰和粉红两色，羽冠可自由张合。成群在开阔区、植被稀疏处和沿河的林地上空飞驰，觅食地上的谷物、种子、叶芽、昆虫，用喙掘食根、块茎和无脊椎动物，并对同类发出叫声。数量随着澳大利亚小麦种植面积的扩大而增长，长期以来，一直被视为是农业上的害鸟。成对生活，共同抚育幼雏，集大群生活于树冠顶部，亚成鸟在前二三年集群四处漫游。 ·巢 树枝或树干上的洞，内衬桉树叶。 ·地理分布 除较湿润的沿海地区之外，分布于整个澳大利亚。		东部型的羽冠为淡粉色 西部型 延伸到腹部的粉红色羽毛 地理分布图 	
羽色 雌雄相似		栖所 	迁徙 不迁徙

科名 鸚鵡科		学名 <i>Nymphicus hollandicus</i>	身长 32 厘米
鸡尾鸚鵡(Cockatiel) 生活在干旱地区的开阔平原和小树林中，飞行有力，外表和凤头鸚鵡类似。敏捷活跃，成对或集小群在地上觅食掉在地上的种子、浆果，也到收割过的农田里吃遗落的谷物。如果在取食时受到惊扰，就飞到枯树上，沿较粗的树枝栖卧伪装起来。飞行迅速，呈直线型，振翅有力且有节奏，飞行时可看到大块白色翼斑，并以响亮的双音节鸣叫保持联系。在有些分布区游荡生活，四处找寻食物基地，其他种群在冬夏分布区之间迁徙。 ·巢 树洞巢，位于水边或水中的树上。 ·地理分布 除较湿润的沿海地区外，分布于整个澳大利亚。		竖起的羽冠 浅红色颊斑 白色翼斑 地理分布图 	
羽色 雌雄不同		栖所 	迁徙 迁徙/四处游荡

科名 鸚鵡科	学名 <i>Eclectus roratus</i>	身长 35 厘米			
折衷鸚鵡(<i>Eclectus Parrot</i>) 体型健壮，雌雄间羽色差异显著。栖息在低地森林及长有少量高大乔木的开阔地带，成对或集小群在果实成熟处采食坚果、种子、嫩芽、花和花蜜。栖宿时集成数量更大的群体，雄鸟比雌鸟更喜群聚。飞行有力但速度缓慢，常作短距离滑翔，长途飞行时则高飞于树冠。 · 巢 树洞巢，在靠近林缘的大树的树干。 · 地理分布 东印度尼西亚群岛、新几内亚、所罗门群岛及澳大利亚东北隅。  地理分布图   雌鸟 雄鸟 <tr><td>羽色 雌雄不同</td><td>栖所   </td><td>迁徙 不迁徙</td></tr>			羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 不迁徙
羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 不迁徙			

科名 鸚鵡科	学名 <i>Psitttrichas fulgidus</i>	身长 46 厘米	
彼斯奎氏鸚鵡(Pesquet's Parrot) 脸部裸露，可能与取食较软的无花果等水果有关，也吃花朵和花蜜。生活于山地森林中，长时间停落在光秃的树枝上，在枝桠分叉间活动时不以喙攀援，而是轻拍翅膀跳跃。飞行有力但速度慢，拍翅快而幅度小，偶尔滑翔，飞行时发出嘈杂的尖叫声。 · 巢 尚无记录。 · 地理分布 新几内亚的高地森林。  地理分布图  脸部裸露 体腹羽毛红色 尾羽非常宽阔	羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙

科名 鸚鵡科	学名 <i>Polytelis alexandrae</i>	身长 45 厘米
公主鸚鵡(Alexandra's Parrot) 体型细长，翅膀长而狭窄，尾呈锥形。在澳大利亚沙漠中的零散树木之间、金合欢属的灌丛及沿着河边整排的桉树游荡飞行，呈波浪状，拍翅无规律。白天大多在地上觅食小草籽等食物，也吃树花和槲寄生浆果。性情安静，鸣声为柔和的“吱吱”声或较刺耳的“嗒嗒”声。受惊时飞到树上，沿树枝生长方向栖息，使身体的轮廓不容易被发现。 · 巢 无衬垫的树洞巢，位于中空的树枝或树干上。 · 地理分布 澳大利亚西部和中部的内陆地区。 雌鸟 雄鸟 体型细长 长翅 尾羽长度不同 长尾利于长距离飞行 地理分布图 		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 四处游荡

科名 鸚鵡科	学名 <i>Platycercus eximius</i>	身长 30 厘米
东玫瑰鸚鵡(Eastern Rosella) 青绿的羽色上长有鲜亮的羽毛，背上具鳞片状墨斑。成对或集小群觅食果实、花朵、花蜜、灌木上的浆果，及地面上的种子，有时也到收割过的农田里取食掉落的谷物，由于常吃果园里的水果，而被视为农业害鸟。鸣声包括生硬的大叫、尖叫和啁啾声。在靠近地面处呈波浪式飞行，然后突然向上飞达栖树。繁殖期雄鸟昂首阔步，摇着尾巴在地上走来走去炫耀。 · 巢 绿树或枯树上的洞，内无衬垫。 · 地理分布 澳大利亚东南部。 尾羽长短不同 地理分布图 		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 鸚鵡科	学名 <i>Psephotus chrysopterygius</i>	身长 27 厘米
--------	-------------------------------------	----------

金肩鸚鵡(Golden Shouldered Parrot)

羽色柔和，仅分布在半干旱热带稀树草原的部分地区。觅食地面上的草籽、种子，有时也取食花和芽。受惊扰时飞到树上，炎热的日间也在树上休息；飞行呈波浪式，速度快。

- 巢 开凿在高大的白蚁冢上，具通道和巢室，以白蚁封住内壁。
- 地理分布 澳大利亚东北部约克角半岛上的草原地带。
- 附注 非法买卖使其面临严重威胁，又由于畜牧区扩展使草地遭到破坏，族群数量下降。



羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鸚鵡科	学名 <i>Psittacus erithacus</i>	身长 33 厘米
--------	-------------------------------	----------

非洲灰鸚鵡(Grey Parrot)


体形粗壮，尾短，分布在低地森林和红树林中，取食种子、坚果和脂质丰富的棕榈果。在树上生活，偶尔到地面觅食谷物和帮助消化谷物的粗砂粒。飞行呈直线型，速度快而高。非常嘈杂，鸣声尖厉如哨音。

- 巢 在高处的树洞中，内无衬垫物。
- 地理分布 热带非洲西部，包括扎伊尔盆地和安哥拉北部。
- 附注 容易笼养繁殖，擅学人语，是很受欢迎的宠物鸟。



羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	---	--------


科名 鸚鵡科	学名 <i>Cyclopsitta diophthalma</i>	身长 14 厘米
双眼无花果鸚鵡(Double-eyed Fig-parrot) 羽色鲜艳，体型小巧，在雨林的树冠间取食时悄无声息，因此不易被发现。成对或集小群觅食无花果和浆果等果实，也吃些种子、花蜜和蛀虫。飞行呈直线型，速度快，叫声短而尖厉。 · 巢 在腐木上凿洞为巢。 · 地理分布 新几内亚和澳大利亚东部。  雌鸟  雄鸟 脸部羽以鲜艳  地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 鸚鵡科	学名 <i>Neophema bourkii</i>	身长 19 厘米
伯克氏鸚鵡(Bourke's Parrot) 成对小群在干旱区的金合欢属灌丛中，觅食草籽和草本植物，十分少见。为适应阴暗光线而生长大眼睛，在凉爽且天敌威胁较小的日落后或黎明前到水边喝水。繁殖期雄鸟掀起翅膀展示蓝色翼下覆羽和腹羽炫耀。 · 巢 无衬垫的树洞。 · 地理分布 澳大利亚内陆地区。 · 附注 易于笼养繁殖，已繁衍许多不同的色型。  翅上具 鳞状斑纹  地理分布图  雌鸟		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙/四处游荡

科名 鸚鵡科	学名 <i>Neophema pulchella</i>	身长 20 厘米
青绿鸚鵡(Turquoise Parrot) 常集小群在干旱林地边的草地上觅食小种子、嫩芽和叶子，受惊扰时飞进树林里或灌丛中。飞行速度快但不稳定，鸣声为柔和的双音节哨声。 · 巢 在树干、篱笆或圆木上的树洞巢。 · 地理分布 澳大利亚东部。  地理分布图  向雌鸟 炫耀中的雄鸟  雌鸟 		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 鸚鵡科	学名 <i>Melopsittacus undulatus</i>	身长 18 厘米
虎皮鸚鵡(Budgerigar) 在野外常三五成群地在干旱的栖所中游荡，觅食草籽等植物。飞行快而有力，很少成群在同一地长期停留，仅在雨季过后短暂的植物生长期中，在树洞中居住和繁殖。  地理分布图 · 巢 树干上、腐朽的树木及篱笆柱上的树洞或中空部分，内无衬垫物。 · 地理分布 澳大利亚。 · 附注 野生种为绿色和黄色，人工已繁殖多种色型。 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙/四处游荡

科名 鸚鵡科	学名 <i>Poicephalus rueppellii</i>	身长 23 厘米
鲁佩氏鸚鵡(Rueppell's Parrot) 在水边干旱森林的大树上觅食腐木上的蛀虫、各种植被中的浆果、绿色嫩枝、种子、瓜果及槐树的荚果。十分少见，只能借由短而尖厉的叫声找到它。 · 巢 无衬垫的树洞巢。 · 地理分布 非洲西南。  雌鸟的 蓝色腹斑  雄鸟  地理分布图 		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 鸚鵡科	学名 <i>Agapornis personatus</i>	身长 14.5 厘米
伪装情侣鸚鵡(Masked Lovebird) 短尾，一小群栖息在乔木和灌木稀少的半干旱草原上，以种子、浆果、绿芽和叶子为食。飞行呈直线，速度快；繁殖时集成松散的群巢，配偶关系牢固，栖息时紧靠在一起，并用喙相互梳理羽毛，因此得名。 巢 以细枝和树皮编成巨大的半球形巢，建于树洞或建筑物上的洞穴中。 · 地理分布 坦桑尼亚高原及沿海地区，肯尼亚南部已有引进。  浅黑色 头部和 白色眼圈 翅膀 短圆  地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 鹦鹉科	学名 <i>Loriculus galgulus</i>	身长 12 厘米
蓝冠短尾鹦鹉(Blue-crowned Hanging Parrot) 体型小巧，以刷状舌采食花蜜，也吃花朵、水果和种子。会倒挂在树枝上，和其他情侣鹦鹉一样，把巢材塞进尾羽中携带。  地理分布图  ·巢 树洞巢。 ·地理分布 马来半岛、苏门答腊、婆罗洲。  雌鸟  雌鸟 无红色喉斑		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 鹦鹉科	学名 <i>Forpus coelestis</i>	身长 12 厘米
太平洋鹦哥(Pacific Parrotlet) 栖息于次生林和灌丛中，躲在枝叶间难以发现，以草类等低矮植物的种子为食，也吃灌木的浆果。成群或家族群一起活动，发出嘈杂、啁啾的叫声，飞行速度快但飘忽不定。  ·巢 树木枝干上无衬垫的树洞巢。 ·地理分布 厄瓜多尔南部和秘鲁西北部。  眼后蓝色斑纹 短尾  地理分布图 		
羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 不迁徙

科名 鹦鹉科	学名 <i>Brothergeris chiriri</i>	身长 22 厘米
黄翅鹦哥(Yellow-chevroned Parakeet) 有时躲在枝叶间休息，有时则招摇地在林中尖叫着四处活动。以种子、水果、花、嫩枝和嫩芽为食，平时集成大群，繁殖期成对分散。  地理分布图  ·巢 树洞、中空的树枝，或利用树蚁巢。 ·地理分布 从巴西中部到阿根廷北部和巴拉圭。  黄色的翼斑像明显的“V”形臂章 锥形尾 外侧脚趾向后翻转		
羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙

科名 鹦鹉科	学名 <i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>	身长 100 厘米
--------	--------------------------------------	-----------

紫蓝金刚鹦鹉(Hyacinth Macaw)

体形最大的一种鹦鹉，羽色深蓝，颈和眼黄色，尾长，翅长而尖。总是成对飞行，三五成群或几个小家族一起在棕榈林、长有高大树木的开阔地和沼泽地及河边的森林中，以棕榈果等坚果、种子和水果为食。飞行时发出响亮刺耳的尖叫声，受惊扰则躲到最高的树枝上。

- 巢 内无铺衬的大树洞。
- 地理分布 玻利维亚和巴西。
- 附注 虽然某些地区常见，但人们为营利而大量诱捕，已使它们面临严重威胁。

黄色眼斑

体羽蓝色

喙巨大

腿短而强健

锥形长尾

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 鹦鹉科	学名 <i>Ara macao</i>	身长 85 厘米
--------	---------------------	----------

绯红金刚鹦鹉(Scarlet Macaw)

羽色绚丽，分布范围广，在小片林地、林缘及大树稀少的开阔地带都可见成对、集群或小家族群活动，觅食各种水果、坚果和种子，每天都会在夜宿地和觅食地间往返飞行。由于遭猎捕，有人类生活地区已很少见。觅食时很安静，飞行中伴有刺耳的鸣叫，受惊扰时发出尖厉而嘈杂的叫声。

- 巢 树洞巢。
- 地理分布 从墨西哥延伸到巴西和玻利维亚。

裸露的颊斑

黄色翼斑

锥形长尾

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 鹦鹉科	学名 <i>Aratinga solstitialis</i>	身长 30 厘米
--------	---------------------------------	----------


太阳鹦哥(Sun Parakeet)

成鸟头颈部为鲜艳的金黄色，翅膀绿色，腹部绯红，栖息于开阔森林、热带稀树草原和棕榈林中，不易被发现，仅在炎热的低地数量较多。成小群活动，在食物丰富处大群攀援在枝条间，食取树上的无花果、浆果、坚果、种子，还吃些树花。在树上或飞行时常发出尖厉刺耳的叫声，飞行迅速，呈直线形。亚成鸟的羽色偏绿，在树叶间大太显眼。



地理分布图

- 巢 在棕榈树干上的树洞巢。
- 地理分布 委内瑞拉东南部、圭亚那和巴西的东北部。



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鹦鹉科	学名 <i>Cyanoliseus patagonus</i>	身长 46 厘米
--------	---------------------------------	----------

掘穴鹦哥(Patagonian Conure)

已适应开阔平原的生活，是少数几种筑地洞巢的鹦鹉之一，集小群在近地面处觅食种子和小果实，常在可俯瞰河海的悬崖上挖洞，栖息于洞穴中、树上或电话线上。



地理分布图

- 巢 在河堤或悬崖壁上挖掘长达3米的地洞为巢，洞底无铺衬。
- 地理分布 繁殖于阿根廷和智利，冬天迁到阿根廷北部和乌拉圭。



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 鹦鹉科	学名 <i>Myiopsitta monachus</i>	身长 22 厘米
--------	-------------------------------	----------

和尚鹦哥(Monk Parakeet)

体形粗壮，性情活泼嘈杂，成群生活在开阔林地中。有一区域为群体活动的中心，在此繁殖、栖息，每天从此地散开，到树林附近的开阔地上觅食种子、坚果、水果、嫩芽和花朵，有时也侵入柑桔园中掠食，活动时不停发出短而尖的鸣叫和啁啾声。

- 巢 用荆棘、细枝编成的半圆形巢，内无衬垫物，入口低而向上斜，每对鸟都把巢建于另一巢之上，在树上形成大型的巢群。
- 地理分布 巴西南部 and 西南部、巴拉圭、阿根廷北部和乌拉圭，已引进北美洲东部、巴哈马群岛和波多黎各。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鹦鹉科	学名 <i>Pionus menstruus</i>	身长 28 厘米
--------	----------------------------	----------

蓝头鹦哥(Blue-headed Parrot)


生活在密林中，头大，尾短，身体壮实，在树冠顶部活动，非繁殖期聚集成群，一起在树上过夜。每天往返于夜宿处，快速而有力地飞过树顶，发出响亮刺耳且嘈杂的尖叫声，在树上觅食时则非常安静。取食采自树上的水果、种子和花朵，有时也到农田里觅食玉米、香蕉等作物。

- 巢 建于离地很远的枯树或绿树上，将裸露的天然树洞扩大而成。
- 地理分布 从哥斯达黎加南部延伸到玻利维亚和巴西东南部。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鹦鹉科	学名 <i>Amazona oratrix</i>	身长 35 厘米
--------	---------------------------	----------

黄头亚马孙鹦哥(Yellow-headed Parrot)

成鸟的头部全为黄色，是黄冠鹦鹉中分布于最北区域的一种。平时成对或成小群栖息于森林和开阔树林中，飞行平稳有力并伴有响亮的尖叫声，但不常飞行，而较常安静地在乔木和灌木的树枝上行走，摘采水果、种子、坚果和花朵，用脚夹住再递到嘴里。

- 巢 位于树木或断裂的树干上无衬垫物的树洞巢，有时由雌雄鸟共同挖掘。
- 地理分布 墨西哥沿海地区，伯利兹和洪都拉斯西北端。



地理分布图



亚鸟



羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鹦鹉科	学名 <i>Amazona aestiva</i>	身长 37 厘米
--------	---------------------------	----------

青绿顶鹦哥(Blue-fronted Parrot)

体形较大，成鸟黄色冠羽前方、喙基部之上有浅蓝色条纹，头部明亮的色斑有助于其识别栖息地内同种的个体。通常在混合林中的高枝上安静地觅食水果、种子、坚果、花和嫩芽，有时则飞越森林，掠食农作物。

- 巢 大树干上的树洞巢。
- 地理分布 玻利维亚、巴拉圭、阿根廷东北部、巴西东部和南部的内陆森林。



地理分布图



羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鹦鹉科	学名 <i>Amazona guildingii</i>	身长 40 厘米
--------	------------------------------	----------

圣文森亚马孙鹦哥(St. Vincent Parrot)

体形较大，具有绿色和青铜色两种色型，体羽上都有蓝色、黄色和橙色的条纹。生活在岛屿上的山地热带雨林中，取食树顶部的果实、种子、花。以配偶和家族形式形成小群，飞行迅猛，扇翅极快，会发出大而粗的尖叫声。

- 巢 在大树干的洞穴内。
- 地理分布 东加勒比海的圣文森岛。
- 附注 需依赖热带雨林栖息地的保护才能生存，目前已濒临灭绝。



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 鹦鹉科	学名 <i>Deroptyus accipitrinus</i>	身长 35 厘米
--------	----------------------------------	----------

鹰头鹦哥(Red-fan Parrot)

具有钩状喙，双眼炯炯有神，羽毛蓬松，尾长而宽，长长的红色冠羽平时光滑地贴伏在头颈上，激动时则展开成扇形。通常集群栖息在茂密的热带森林、沙漠边缘的开阔林地，以及有零散树林分布的热带草原，单独、成对或家族一起栖息于树洞内，或安静地取食叶丛中的浆果、种子和各种坚果。在林间飞翔时会张开尾羽，鸣声为哀号般的高分贝尖叫声。

- 巢 以啄木鸟抛弃的树洞为巢。
- 地理分布 哥伦比亚、委内瑞拉、秘鲁北部、圭亚那以及巴西。




羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 尖帽鸟科	学名 <i>Corythaeola cristata</i>	身长 75 厘米
---------	--------------------------------	----------


蓝蕉鹃(Great Blue Turaco)

栖息在热带地区的低矮山地边缘、河谷、山地和热带草原中的雨林里，体背蓝色，体腹为红色和黄色，翅膀宽大，以森林中的各种果实为生。飞行方式为向下滑行或向下飞扑，并在树枝间灵巧地跳跃向上爬升。生性胆小，不易在丛林中发现，但有时聚成小群鸣叫，从平缓的叫声开始，继之以连续短促的“科欺-科-科欺-科”声，最后在低沉的颤声中结束，有时叫达几分钟。

- 巢 以树枝搭成平台状巢，中间凹陷，内衬细枝，位于树的高处。
- 地理分布 西非和中非热带森林。
- 附注 蕉鹃类中体形最大者。



• 宽阔的冠羽
总是竖立着



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 尖帽鸟科	学名 <i>Criniferoides leucogaster</i>	身长 50 厘米
---------	-------------------------------------	----------

白腹灰蕉鹃(White-bellied Go-away-bird)

栖息在干燥、开阔的灌丛和林地中，羽色单纯，只有灰、黑、白三色，羽冠向上竖立着。喜欢停栖在较高的树枝上，有时一只接着一只成群地飞越开阔地，飞翔时可见翅膀和尾上的明显白斑，停在地上时，会抬起长长的尾和高高的冠。除了会发出“勾-威儿”的鼻音外，还能发出音量大而类似狗吠的鸣声。单只、成对或成小群在林间和灌丛里取食浆果，及各种绿色的荚果。

- 巢 位于有密刺的树上，不整齐的浅碗状巢，内衬细枝。
- 地理分布 埃塞俄比亚到坦桑尼亚。



竖起的冠羽

强有力的钩喙

翼羽的黑色羽缘

尾羽长而窄



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 尖帽鸟科	学名 <i>Tauraco erythrolophus</i>	身长 40 厘米
---------	---------------------------------	----------

红冠蕉鹃 (Red-crested Turaco)

生活在开阔的森林中，以及沿着河边的林间地带，以各种浆果为食，在林中不易被发现。冠羽鲜艳，身体纤小，头羽和胸羽为蕉鹃类特有细毛发状结构。在树林间飞行时，先用力拍打翅膀，然后向下俯冲飞入树丛中，红色的翼羽十分夺目。

- 巢 尚无记录，可能在树的高处以树枝搭起的平台状巢。
- 地理分布 安哥拉西部。

由细密羽毛形成的羽冠

翼斑

装饰性的眼圈

反转的外侧脚趾

地理分布图



尾部宽阔具光泽

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 尖帽鸟科	学名 <i>Tauraco schalowi</i>	身长 40 厘米
---------	----------------------------	----------

散库鲁冠蕉鹃 (Schalow's Turaco)

具醒目白色冠羽，在森林中的树木高处活动，飞行能力强，常常展开翅膀，露出红色的初级飞羽滑翔，能沿着树枝奔跑，也能在树枝间跳跃。成对或成群取食浆果，有时将果实整个吞下而吐出种子。以叫声维系散布在林中躲藏的个体，当一只鸟发出“科衣-喔-科衣-喔-科衣-喔”的鸣声时，便能引起其他同伴的共鸣。

- 巢 位于灌丛或树上，以树枝构成的平台状巢。
- 地理分布 安哥拉的森林地带、东非津巴布韦以北的地区。

细长的冠羽始终保持竖立

翼斑

红色初级飞羽

反转的外趾

地理分布图



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 杜鹃科	学名 <i>Clamator glandarius</i>	身长 38 厘米
--------	-------------------------------	----------

大型冠郭公(Great Spotted Cuckoo)

以灌木丛和树林内的鳞翅目幼虫、草蚱、蝗虫等其他鸟类不感兴趣的昆虫以及其他小动物为食，通常很安静；但在繁殖期会发出像火鸡般沙哑的叫声，而变得很嘈杂。幼鸟孵化后以模仿寄主幼鸟的叫声来得到食物，虽然不排斥寄主的幼鸟，但不久便会长得比寄主幼鸟好。

· 巢 巢寄生，通常在喜鹊、乌鸦的巢中产卵一枚，在南非有寄生于棕鸟巢的记录。

· 地理分布 有两个种群，一在南欧繁殖，在西非过冬；另一种群在南非繁殖，在非洲热带地区过冬。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 杜鹃科	学名 <i>Cuculus canorus</i>	身长 33 厘米
--------	---------------------------	----------

杜鹃(Common Cuckoo)

雄鸟大声的“枯-枯”叫声，正是杜鹃英文名由来。以捕食大型的鳞翅目幼虫和各种小型无脊椎动物为食，雌鸟会观察其他正在筑巢的小型鸟类，在合适机会下移走或吃掉其中一颗蛋，然后在其中产下自己的。

· 巢 巢寄生，将一枚蛋产在其他食虫鸟的巢中，由寄主哺育小杜鹃。

· 地理分布 繁殖于西伯利亚东部到北非，在南非和亚洲过冬。



亚成鸟



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 杜鹃科	学名 <i>Chrysococcyx caprius</i>	身长 18 厘米
--------	--------------------------------	----------

白眉金鹃(Didric Cuckoo)

从开阔森林到热带草原都有它的踪迹，体型较小，白绿相间的羽毛上泛有光泽，以鳞翅目幼虫为食。繁殖期雄鸟会不停地发出“得哀-得哀-得日科”的平缓叫声，并扇动翅膀、展开尾羽求偶。

- 巢 巢寄生，将卵产在雀形目鸟类的巢内，尤其是织布鸟和雀类，有时幼鸟会将寄主的幼鸟推出巢外。
- 地理分布 撒哈拉沙漠以南的非洲地区及阿拉伯半岛西南部。

橙黄色眼圈

不连续的白色过眼线

光亮的青铜绿羽色

尾羽展开时会露出外侧尾羽上的白斑

雌鸟

胁羽的斑点

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 杜鹃科	学名 <i>Scythrops novaehollandiae</i>	身长 65 厘米
--------	-------------------------------------	----------

沟嘴鹃(Channel-billed Cuckoo)

具有大而硬的喙、长翅和长尾，所以飞行时看起来像是犀鸟等大嘴鸟类。清晨黄昏时活动较频繁，有时在夜间飞行，发出大而沙哑的叫声。通常取食树顶的无花果等浆果类，也捕食各种昆虫、鸟蛋以及幼雏。

- 巢 巢寄生，在噪钟鹊、乌鸦和黑背钟鹊的巢中。
- 地理分布 繁殖于澳大利亚北部和东部，在新几内亚和印尼的苏拉威西岛过冬。

亚成鸟

深色的翼羽末端

明暗相间的体羽就像阳光照在枝叶之间

白色的尾羽羽端

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 杜鹃科	学名 <i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	身长 30 厘米
--------	-------------------------------------	----------

北美杜鹃(Black-billed Cuckoo)

非巢寄生杜鹃科鸟类之一，双亲除了自己筑巢和孵化幼鸟外，也共同喂养幼鸟。栖息在树丛和溪边的灌木丛里，能在树枝上快速地跑跳。成鸟和幼鸟都以鳞翅目幼虫为主食。

- 巢 以树枝和草茎筑成的杯状巢，巢内垫草和树叶，位于树木或灌木丛较低的位置。
- 地理分布 美国东部和加拿大南部，在南美过冬。



羽色 雌雄相似

栖所 

迁徙 迁徙

科名 杜鹃科	学名 <i>Ceuthmochares aereus</i>	身长 35 厘米
--------	--------------------------------	----------

黄嘴鹂(Yellow-bill)

灵敏好动，身体细小，尾羽较长，生活在森林及有灌丛植被生长的草地里，成对活动，以昆虫、蛞蝓、树蛙，雀形目鸟类为食。常藏在树叶茂密的灌木丛内，不易被发现，但可由粗厉低沉的“缺”叫声来识别。

- 巢 非巢寄生，以树枝筑碟状巢位在枝叉上。
- 地理分布 非洲撒哈拉沙漠以南。



羽色 雌雄相似

栖所 

迁徙 不迁徙

科名 杜鹃科	学名 <i>Crotophaga ani</i>	身长 37 厘米
滑嘴犀鹃(Smooth-billed Ani) 体形较短，呈蹲伏状，头部沉重，羽毛散乱而蓬松，深色的喙短且钝，常用力摇动楔形的尾部，外形丝毫不像一般杜鹃。尽管其貌不扬，步行和奔跑的能力却很强，善于快速飞扑和偶尔短距离的滑翔。以地面上的草蚱和其他昆虫为食，有时会跟在牛后面捕食由牛尾赶起的昆虫，或停栖在动物的背上啄食扁虱。群性强，常集群取食，以长长的悲啼声相互联系，在地面、灌丛中或小树上休息时总是挤在一起，有时还会相互理羽。数对群集繁殖，共筑一个巢，雌鸟将卵产在其中，整个群体共同担任孵化和喂养幼鸟的任务，亚成鸟群体生活，并帮助父母喂养下一代。 · 巢 非巢寄生，以粗树枝筑成的杯状巢，内铺衬里，建在荆棘上。 · 地理分布 从佛罗里达州中部，向南经中美洲和南美洲到厄瓜多尔西部和阿根廷北部，西印度群岛也有分布。  地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 杜鹃科	学名 <i>Guira guira</i>	身长 37 厘米
圭拉鹃(Guira Cuckoo) 群性强，常 8~10 只不等集群活动，生活在有乔木零散分布的干旱草原。栖息时在树枝上成群相互紧靠，像打结般地紧紧挤在一起，有时会相互理羽。翅膀短圆，飞扑和俯冲都显得很吃力，降落的动作也显得很急迫。常在灌木丛间一只接着一只地飞来飞去，取食地面上的虫卵、昆虫、小蜥蜴、老鼠、鸟蛋和幼鸟，偶尔也会成群在树上取食。群体筑巢，数对鸟共筑一个巢，雌鸟将蛋产在同一个巢中，并由群体孵卵和育雏。 · 巢 非巢寄生，由树枝构成简单的巢，筑在树上。 · 地理分布 南美洲的玻利维亚、巴拉圭、巴西和阿根廷。  地理分布图 抖开背部羽毛进行日光浴 蓬松而不整洁的羽毛 长尾 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 杜鹃科	学名 <i>Geococcyx californianus</i>	身长 58 厘米
--------	-----------------------------------	----------

走鹃(Greater Roadrunner)

具有一只长腿和狭长的尾羽，地栖，十分善于奔跑，生活在干旱且植被稀疏的乡间，常常可见它们匆忙走进开阔地带。无论取食或躲避敌害，头和尾羽都保持水平。虽然能飞行，但遇敌害时仍仅蹲伏或奔跑来躲避，以昆虫、蜥蜴、蝎子和小蛇等为食。成鸟有固定的领地，鸣声和鸽子的“咕咕”声类似。

- 巢 非巢寄生，杯状巢，位在仙人掌类或灌丛中。
- 地理分布 从美国西南部到墨西哥中部。



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 杜鹃科	学名 <i>Carpococcyx renauldi</i>	身长 68 厘米
--------	--------------------------------	----------

珊瑚嘴地鹃(Coral-billed Ground-cuckoo)

长腿、长尾，体形小巧，喜欢在温暖潮湿的森林、次生林、灌木丛、低地和山坡等栖息地内活动。性情胆怯，常躲在茂密的林中，




遇危险时快速奔跑逃离，数量很少，即使分布区内也不易观察到。以各种小动物为食，成对的地鹃间以沙哑低沉的“得欺庭”哨声进行联系。


- 巢 非巢寄生，以树枝和树叶筑成位在树上的杯状巢，偶尔也会把巢筑在地面。
- 地理分布 从泰国西北部到越南南部。

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 杜鹃科	学名 <i>Centropus superciliosus</i>	身长 40 厘米
白眉鸦鹃(White-browed Coucal) 栖息在靠近水面的灌木丛、植被茂密的湿地、矮树林间草地的地栖鸟类，生活在下层植被中，身体修长，尾长而阔，腿部强壮，能快速走动和奔跑，可在密丛内低矮的树枝上跳动和攀爬开路。翅短而圆，虽然会飞行，但喜欢躲藏在茂密的植被内，飞行高度低且吃力。以各种昆虫和小动物为食，鸣声欢愉，高低有致，十分易于区别。 · 巢 以草筑成不规则的大型圆顶巢，侧面开口，位在芦苇丛或灌木丛内，于接近水面或地面的位置筑巢。 · 地理分布 从苏丹境内的尼罗河谷，向南经东非、安哥拉和津巴布韦到南非。 · 附注 南部亚种眼部和背部无白色斑纹。  地理分布图  南部亚种  翅圆 尾长而宽		
羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙

科名 麝雉科	学名 <i>Opisthocomus hoazin</i>	身长 65 厘米
麝雉(Hoatzin) 尽管有人认为麝雉和杜鹃类是近缘，但其硕大笨重的体型和小小的头部，都和杜鹃类极不相像。栖息于靠近河湖的潮湿森林边缘，在水面筑巢。集群取食绿叶，食量很大，会将食物贮存在嗦囊内等待消化，充满食物的膨大嗦囊使活动及飞行显得笨拙而吃力。幼鸟受到威胁时会扑进巢下方的水中游泳，危险过后则利用翅膀前端的两个爪爬回巢中。 · 巢 由小枝筑成的松散平台，搭在水面的树枝上。 · 地理分布 从委内瑞拉到玻利维亚和巴西。  地理分布图  冠羽长而尖 尾羽宽阔 膨胀的嗦囊内充满树叶 枯死的棕榈叶		
羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙

科名 草鸮科	学名 <i>Tyto alba</i>	身长 40 厘米
草鸮(Barn Owl) 眼睛周围的羽毛形成心形的面盘，能轻盈地自由滑翔。捕食时先在空地上方低飞或站在树枝上观察，然后无声地飞扑猎物；在漆黑的夜间，能借声音来判断鼠类和各种小型哺乳动物的位置并加以捕捉。飞翔时发出悠长颤抖的尖叫，筑巢时也会发出像打鼾般的“嘶嘶”声。 · 巢 位于树洞、仓库或其他建筑物上，为内部弯曲的洞巢。 · 地理分布 南北美洲、欧洲、非洲，经南亚、东南亚至澳大利亚。  地理分布图 · 附注 具有体羽由深灰色到浅灰色的各种色型。   翼羽上具精密的斑纹 深色型 头部硕大 长而有力的腿		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙


科名 草鸮科	学名 <i>Phodilus badius</i>	身长 30 厘米
栗鸮(Oriental Bay-owl) 栖息在密林或次生林中，夜晚才在密丛中捕食，故很难观察到。面盘狭窄，内侧的羽毛从头顶向前伸出，在前额顶端形成两束突起的羽毛，形状和猫头鹰特有的耳状簇羽类似。白天在树洞中栖息，夜晚开始活动，凭借听力在漆黑的夜间捕食，以短而圆的翼和方形尾在密林中穿行，并以强壮的脚爪垂直抓握树干，捕食大型昆虫、青蛙、蜥蜴、小鸟和哺乳动物。叫声为渐渐上扬的哨音。 · 巢 树洞巢，位于树干或树枝中。 · 地理分布 印度北部、斯里兰卡，穿越东南亚至中国、婆罗洲和爪哇。  地理分布图   面盘狭窄 以爪抓握猎物		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 鸱鸃科	学名 <i>Otus scops</i>	身长 20厘米
--------	----------------------	---------

角鸮(Eurasian Scops Owl)

体形较小，体羽的花纹为白天栖息时的保护色，受惊吓时耳状簇羽会直直竖起，一动也不动地站着，借着与树皮相似的羽色伪装而躲过敌害。生活于温暖干燥的环境中，白天栖息在树丛中，晚间则快速拍翅，在开阔地里水平快速飞翔，捕食时从树枝上猝然向下猛扑，以爪捕捉昆虫、蚯蚓、两栖类动物、蜥蜴、小鸟等猎物，有时则先落在猎物旁边再伺机猎食，或在空中捕食蛾类。雌鸟孵卵或育雏时，雄鸟在白天捕食。叫声为“兔”般的尖锐单音，雌鸟音调比雄鸟略高。

- 巢 树干中弯曲的洞穴。
- 地理分布 繁殖于欧洲南部、俄罗斯或中国西部，冬天到非洲中北部和印度北部过冬。
- 附注 具有灰色和红棕色两种色型。



地理分布图



红棕色型

受惊时的直立姿态，羽毛光滑齐整



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 鸱鸃科	学名 <i>Otus leucotis</i>	身长 28厘米
--------	-------------------------	---------


白脸角鸮(White-faced Scops Owl)

体形较小，白色面盘，灰色簇生耳羽，桔红色的大眼，具斑纹的体羽在白天树栖时有保护作用。受惊吓时身体竖直，羽毛紧缩，耳羽直立，看起来就像一截断裂的树干，如果被激怒，就会睁大眼睛，用喙猛啄。栖息在热带和亚热带草原、荆棘灌丛中，有时也在开阔的森林活动，于夜间捕食昆虫、小型啮齿类动物及栖息中的小鸟。雄鸟叫声为两声一度，雌鸟的鸣声中略带有颤音。

· 巢 弯曲的树洞，或使用蕉鹃(见 186~187 页)、雀鹰(见 94 页)、乌鸦(见 394~395 页)的弃巢，许多配对的鸟直接将巢筑在地面上。

· 地理分布 撒哈拉沙漠以南的非洲地区。

· 附注 雄鸟的鸣声为两拍和一拍的两个连续音阶，故称两声一度。




地理分布图



未完全竖起的耳状簇羽

具橙色虹膜的大眼



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鸱鸃科	学名 <i>Bubo virginianus</i>	身长 55 厘米
--------	----------------------------	----------

美洲鸱鱼鸃(Great Horned Owl)

体形最大、最凶猛的美洲猫头鹰，具有长而密的耳状簇羽和羽纹细致的胸部。栖息地广，荒岩沙漠、阔叶林和针叶林都有分布，夜间捕食昆虫、野兔、鹅和火鸡等猎物，叫声深长且温和。

- 巢 位在树木或悬崖上，大型捕食鸟的旧巢。
- 地理分布 美洲。
- 附注 羽色从深到浅，有许多不同的色型。




地理分布图



浅色型



用强而有力的爪捕抓猎物

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鸱鸃科	学名 <i>Bubo bubo</i>	身长 70 厘米
--------	---------------------	----------

鸱鱼鸃(Eurasian Eagle-owl)

世界上最大的猫头鹰，体型强壮，有明显的耳状簇羽和花纹醒目的胸部，体羽上的斑纹有保护作用。较喜栖息在岩石和森林中，但在许多地形不同的国家出现。不论白天和黑夜都一样活跃，凭借敏锐的视觉捕食昆虫、野兔、狐狸、鸭和大型狩猎鸟，叫声深沉。

- 巢 在突出岩石上或山洞中的浅凹筑巢，或使用鹰、雕(见 97~99 页)的旧巢。
- 地理分布 欧洲至西伯利亚，南至印度、中国大陆。
- 附注 随着地理亚种以及不同的生长阶段，羽色从深到浅，有很大的变化。



地理分布图



灰色亚种



白天瞳孔收缩

体羽上具斑纹

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鸱鸃科	学名 <i>Ketupa ketupa</i>	身长 42 厘米
--------	-------------------------	----------

马来鱼鸱(Buffy Fish-owl)

形似鸢鱼鸱，腿部裸露、脚趾上长有尖锐的鳞片，爪长而弯曲，适于从水中捕抓鱼类。与众不同，有一层光滑柔软的羽毛能消除飞行时的声音，所以在拍翅飞翔时会发出微弱的声音，但并不影响其捕鱼。成对栖息在河边的树林中，夜间捕食，先站在光秃的树枝上找寻猎物，一发现鱼类便迅速飞到水面捕抓，也捕食蟹、小龙虾、两栖动物、爬虫类、鸟类和大型昆虫，叫声轻柔，两声一度。

· 巢 未经铺衬的大型树洞巢，或直接利用其他大型鸟类的旧巢。

· 地理分布 东南亚，从缅甸、婆罗洲到爪哇。

· 附注 鸣声为两拍和一拍的两个连续音阶，故称两声一度。



地理分布图



裸露的腿

• 适于捕鱼

• 硕长的爪

羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鸱鸃科	学名 <i>Nyctea scandiaca</i>	身长 58 厘米
--------	----------------------------	----------

雪鸱(Snowy Owl)

从头部到脚趾都被覆厚厚的白色羽毛，用以抵御寒冷，并在雪中形成保护色。在北极冻原生活和筑巢，白天和夜间都可以捕食，以旅鼠为主食，偶尔捕食野兔、鸥和鸭等大型猎物。在巢域咆哮时会发出“咯咯”的单音叫声。

· 巢 位在开阔的冻原带的浅凹巢。
· 地理分布 繁殖于北美洲北部、格陵兰岛、欧亚大陆北部，食物缺乏的年份则迁

移到繁殖区的最南端。



地理分布图



御寒的羽毛覆盖住鼻孔

雌鸟



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 鸱鸃科	学名 <i>Strix aluco</i>	身长 38 厘米
--------	-----------------------	----------

灰林鸱(Tawny Owl)

头大而圆，生活在林地或开阔的乔木林，潜伏在树丛或洞中，有两种叫声：一种是一长一短的尖锐“科屋科”声，用于炫耀或彼此间联系；另一种则是模仿其他鸱类的“兔护特护”声。夜间藉着听觉来确定猎物的方位并捕食，主食鼠类。

- 巢 树干或岩石上的浅洞。
- 地理分布 欧洲、非洲西北部、中国和朝鲜。
- 附注 具灰、红棕和深褐三种色型。



地理分布图



灰色型



浓密的红棕色体羽

腿足覆盖着柔软的绒羽

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鸱鸃科	学名 <i>Strix varia</i>	身长 53 厘米
--------	-----------------------	----------

横斑林鸱(Barred Owl)

深色的大眼能在黑暗中藉着极微弱的光线捕食，大多出现在阔叶林和针叶林中，也常在水边或开阔田野上捕食。白天栖息在树叶密生的树冠上，夜间捕食，因头部两侧的耳孔不对称，开口一高一低，所以能准确地对声音来源定位。即使在完全黑暗的状态下，只要猎物活动就能捕食。以鼠类、蜥蜴、蛙类、松鼠、野兔为食，在潮湿地区也猎捕螯虾和鱼类，藉由连续四五声的“唬唬”声炫耀。

- 巢 产卵于无衬垫的树洞中。
- 地理分布 北美洲，大多分布在落基山脉东部、墨西哥中部高原至韦拉克鲁斯和瓦哈卡。



地理分布图



背部斑纹

翅上具横斑


羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鸱鸃科	学名 <i>Strix nebulosa</i>	身长 68 厘米
--------	--------------------------	----------

乌林鸱(Great Grey Owl)

生活在寒冷的北极森林和桦木丛中，栖息在主干附近，头圆，面颊两侧各由覆羽形成一大圆盘，眼睛炯炯有神。体形纤长，从身体到趾端都被覆着一层御寒的厚羽毛，所以外表看起来比实际大得多。白天和夜晚都可以捕食，通常先站在树枝上观察，然后悄声猝然抓捕田鼠、小型鼠类，也食地鼠和小鸟，有时钻进深雪中捕捉猎物。

· 巢 住在断裂粗树干的洞中，尤喜以其他大型鸟类在针叶树上的旧巢为巢。



地理分布图

· 地理分布 北美洲北部及欧亚大陆北部，有些种群冬季不规律地南迁过冬。




羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 部分迁徙/四处游荡
---------	----	--------------

科名 鸱鸃科	学名 <i>Surnia ulula</i>	身长 38 厘米
--------	------------------------	----------

长尾鸱(Northern Hawk-owl)

外形与鹰隼相似，翼长而尖，尾长，头顶稍扁。白天捕食，常站在显眼的树枝上寻找猎物，短暂扇翅后长时间滑翔，在空中捕捉小鸟时也能敏捷地改变方向，大多从树枝上扑向田鼠和稍大的哺乳动物捕食，有时也在猎物头顶上低速盘旋捕食，在冬天及食物缺乏时也捕食鸟类，即使在鸟类飞翔时也能飞捕。能发出深长婉转的吼声和尖锐的嗥鸣声。

· 巢 树洞巢或其他鸟类的旧巢。






地理分布图


· 地理分布 北美洲北部和欧亚大陆北部，某些种群会在繁殖区内南迁过冬。



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 部分迁徙/四处游荡
---------	----	--------------

科名 鸱鸃科	学名 <i>Athene noctua</i>	身长 22 厘米			
纵纹腹小鸱(Little Owl) 体形小巧，头宽阔，翼圆形，尾短，腿部长有羽毛。小而宽的面盘加上低低的前额，看起来就像一副怒容。栖息在有隐蔽物的农田、公园和乱石堆等开阔地区，白天和夜间都活动，能快速行走、奔跑、跳跃和波浪式飞翔。藉敏锐的视力捕食昆虫、小型鼠类、哺乳动物及鸟类。 · 巢 树干、岩石表面的洞、谷仓或建筑物的墙缝或利用兔穴中的浅洞。 · 地理分布 欧洲，东到中国，南到非洲。 · 附注 体色从深到浅有不同的变化。  地理分布图  面盘窄小 腿足被覆羽毛 地理分布图 <tr><td>羽色 雌雄相似</td><td>栖所 </td><td>迁徙 不迁徙</td></tr>			羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙			

科名 鸱鸃科	学名 <i>Speotyto cunicularia</i>	身长 24 厘米
穴居鸱(Burrowing Owl) 栖息于开阔多草平原上，体小腿长，宽扁的面盘和低矮的前额形成永远皱着眉头的模样。一年四季都生活在地洞中，繁殖季节在洞穴中育雏，其余时间则作为庇护所，夜间捕食，白天仅在洞穴附近活动，一受到惊扰便钻进洞中。在低空呈波浪式飞翔，从树枝或空中猝然扑下捕猎，或先盘旋几圈，然后扑向猎物。以草蜢和甲虫等昆虫为食，有时捕食蜥蜴、蛇、老鼠、田鼠和鸟类，会发出“咕咕”的号叫声和示警的“咯咯”声。 · 巢 在松鼠或其他哺乳动物的旧穴中营巢，或是成对掘洞，铺上草茎和干畜粪而成。 · 地理分布 从加拿大西南、美国西部、佛罗里达州和中美洲延伸到南美洲南端。   地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙

科名 鸱鸃科	学名 <i>Aegolius funereus</i>	身长 25 厘米
鬼鸱(Tengmalm's Owl) 在松树林中，包括茂密的成林、开阔的伐木林及林缘中都可见其踪影。体型小，大而高的面盘和两只紧挨着的眼睛，形成一个吃惊的表情。拍翅迅速，能敏捷地在树枝中直线飞行。白天 栖息在浓密的树枝上，晚上活动，育雏时也白天捕食，以田鼠、地鼠、小型鼠类和鸟类为食。鸣声为一连串像音乐般的快速“咕咕”声。 · 巢 无衬垫的树洞巢，有时直接利用巢箱。 · 地理分布 繁殖于欧亚大陆北部、北美洲北部、怀俄明州到新墨西哥州，某些种群南移过冬。  地理分布图  翼和尾 短小  亚成鸟		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙

科名 鸱鸃科	学名 <i>Ninox Novaeseelandiae</i>	身长 35 厘米
--------	---------------------------------	----------

布布克鹰鸮(Southern Boobook)

典型的澳大利亚鹰鸮，头圆，喙突出，面盘形状不明显。成对生活，栖息时单独躲藏在密林中，白天易遭到鸣禽的围攻。在城郊及任何有树的地方生活，夜间捕食昆虫、小型鼠类、小鸟和其他动物。名字来自其“布布科”的叫声。

- 巢 树洞巢。
- 地理分布 帝汶、新几内亚岛南部、大洋洲。



大眼

腿足长有羽毛



灰色型



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鸱鸃科	学名 <i>Asio flammeus</i>	身长 38 厘米
短耳鸱(Short-eared Owl) 翼长，耳羽短，生活在没有树木生长的开阔地带、多草的平原、沼泽地和沙丘中。通常停落在地面、土墩和树干上，在隐蔽的洞穴中栖息。飞行时用力而有规律地扇翅并缓慢滑翔，翅膀扇动时形成一个宽“v”字形。飞翔捕食，发现猎物时先稍作盘旋，以爪抓住猎物后带到其他地方进食，老鼠和田鼠是主要食物，也像大多数的鸱一样捕食昆虫、水鸡和刺猬。 · 巢 在空旷地面和长满石楠属植物的低地上的浅洞巢。 · 地理分布 繁殖于欧亚大陆、北美洲和南美洲，北方种群南迁至墨西哥、非洲和印度过冬。 地理分布图 耳羽短小 长翅 长尾		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 部分迁徙

科名 油鸱科	学名 <i>Steatornis caripensis</i>	身长 48 厘米
大夜鹰(Oilbird) 大眼，强壮的钩状喙周围长有硬须，翼狭长，尾长，腿短而纤弱，这些特征都适于夜间飞翔取食。白天群集在黑暗山洞中的岩面上，晚上出来啄食棕榈树上的鲜果，回巢后便吐出果核，以致岩面和洞里满地都是。洞中成百上千的鸟发出宏亮尖锐的咆哮声，也会滴答滴答鸣叫，并利用回声在黑暗中寻找方位。 · 巢 岩洞中的平台，用吐出的果核堆成。 · 地理分布 自巴拿马东部到玻利维亚，东到委内瑞拉和特立尼达群岛。 雌鸟 地理分布图  		
羽色 雌雄略有不同	栖所   	迁徙 不迁徙

科名 广嘴夜鹰科	学名 <i>Podargus papuensis</i>	身长 50 厘米
----------	------------------------------	----------

广嘴夜鹰(Papuan Frogmouth)

羽毛上斑点浓密，当它闭眼时，喙斜向上伸，尾巴、身体、头部和喙形成倾斜状，一动也不动地停栖在枝叶之间时，看上去就像块木头，是少数几种在白天伪装成断枝来藏身的夜行鸟类之一。白天单独或 2~4 只栖息或在空旷地区活动，黄昏时则睁大眼睛观察地面，一发现食物就向下猛扑，以嘴巴将地面的昆虫、青蛙、蜥蜴、老鼠和鸟类叼起，而不以脚爪捕食。

- 巢 以细枝筑成小而扁平的巢，位于树枝分叉处或树洞中。
- 地理分布 新几内亚和澳大利亚东北角。
- 附注 有赤褐色和灰色两种不同的色型。



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 无须夜鹰科	学名 <i>Nyctibius jamaicensis</i>	身长 40 厘米
----------	---------------------------------	----------

无须夜鹰(Common Potoo)


喙短而纤细，尖端下弯，张嘴时喙裂与头部几乎等宽。白天栖息于林间，利用羽毛伪装，独自直立栖息在倾斜的枝条或与树干垂直的枝条末端，头部竖起，闭眼，喙斜向上，看上去就像伸长的树枝。夜间开始活动，在栖枝周围不停地察看，发现空中的昆虫即飞扑捕食，再回到栖枝上。会发出“喉蛙”的喉音和“蛙科哭哭”的嘶哑叫声。繁殖期以白天栖息的直立姿势孵卵。


- 巢 单枚卵，产于裸露的浅树洞里、断枝顶端或残干上。
- 地理分布 牙买加、伊斯帕尼奥拉岛，以及从墨西哥到哥斯达黎加一带。




羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 裸鼻鸱科	学名 <i>Aegotheles insignis</i>	身长 30 厘米
大裸鼻鸱(Feline Owlet - nightjar) 脸部有长而粗硬的毛须，看上去像猫一样，栖息在山地森林的藤蔓内或树洞里，夜间活动，在叶层和枝干上捕食昆虫。  地理分布图 · 巢 可能为树洞巢。 · 地理分布 新几内亚高地。  长而触觉敏锐的粗须  棕色型		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 夜鹰科	学名 <i>Chordeiles minor</i>	身长 24 厘米
小夜鹰(Common Nighthawk) 细长的灰色翅膀上有白色斑纹，喉部也有一白色条纹。白天栖息在地面或树木的枝干上，午后到黄昏时捕食飞行中的昆虫。鸣声为低沉的鼻音，雄鸟振翅飞行时会发出较大的拍翅声。  地理分布图 · 巢 位于裸露而平坦的地面。 · 地理分布 繁殖于北美及中美洲，冬天在阿根廷以北的南美洲过冬。  脚足短小  亚成鸟		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙

科名 夜鹰科	学名 <i>Eurostopodus argus</i>	身长 30 厘米
点斑耳夜鹰(Spotted Eared - nightjar) 白天在空旷地区、干燥林地和灌木丛中，利用羽毛伪装成枯死的树叶栖息，夜间捕食飞行较慢的蛾、蜜蜂和其他昆虫。鸣声为一连串的哨音。  地理分布图 · 巢 地洞巢。 · 地理分布 澳大利亚，冬季北移至新几内亚的阿鲁群岛。  左翼尖 右翼 栖息时翼尖相互交错  亚成鸟		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙

科名 夜鹰科	学名 <i>Nyctidromus albicollis</i>	身长 28 厘米
帕拉夜鹰(Pauraque) 生活在林缘、次生林及开阔的灌丛中，在空地上筑巢。白天蜷缩修长的身体，栖息在空旷地区或低矮的枝条上，看上去像伸展的树枝；夜晚慢慢巡回飞行或从栖枝上猛扑，捕食飞过的蜜蜂、蛾类、萤火虫等昆虫。飞行时可见钝圆翅膀上的白斑，夜间常在路上休息。会发出似“捕呼”的鸣声。 雄鸟尾羽 雌鸟尾羽 · 巢 位于生长较慢的植物周围的浅洞或天然的浅洼中。 · 地理分布 得克萨斯州南部、墨西哥、玻利维亚、巴西和阿根廷东部。  伪装成枯叶的羽色 雄鸟的尾羽具白色条纹 地理分布图 羽色 雌雄相似 栖所  迁徙 不迁徙		


科名 夜鹰科	学名 <i>Phalaenoptilus nuttallii</i>	身长 20 厘米
弱夜鹰(Common Poorwill) 体形矮胖，翼和尾短圆，“普日屋”的鸣声时常可闻，叫声中还含有一个很少听见的音。白天栖息在陆地、荒凉的鼠尾草灌丛和宽阔的松树上，夜间在地面低速飞行，或停栖在地面、岩石及矮枝上，观察并飞捕昆虫。利用羽色的保护来筑巢。 · 巢 地面浅凹处。 · 地理分布 繁殖于美国及加拿大西部，冬季最远达墨西哥中部过冬。 · 附注 曾发现有一只弱夜鹰连续数年都在美国西南的岩缝中过冬。  用以伪装的羽色 地理分布图 羽色 雌雄不同 栖所  迁徙 部分迁徙		

科名 夜鷹科	学名 <i>Caprimulgus europaeus</i>	身长 28 厘米
--------	---------------------------------	----------

欧洲夜鷹(Eurasian Nightjar)

生活在林区周围，有树叶和细枝覆盖的空地上，善于伪装，繁殖期的雄鸟在夜晚会发出婉转悠长的鸣声。白天在陆地或树枝上休息，晚上不规则地轻快飞行，追捕昆虫，除了被惊吓，十分少见其飞出栖枝外。

- 巢 林间或灌木周围的空地。
- 地理分布 繁殖于中国以西的欧亚大陆、北非，冬季远至南非过冬。



地理分布图



雌鸟


羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 夜鷹科	学名 <i>Macrodipteryx longipennis</i>	身长 23 厘米
--------	-------------------------------------	----------

球拍夜鷹(Standard-winged Nightjar)

常出现灌木散生、岩石较多的乡村地区，白天若非受到干扰，会静静地在地面上休息，晚上捕食停在翅膀上的昆虫。繁殖期的雄鸟两翼中间各长出一根非常长的饰羽，饰羽尾端连接着旗帜般的羽片，雄鸟在黄昏和黎明的微弱光线中，围着雌鸟展翅飞行，炫耀特别的白色翼斑和两根漂亮的饰羽；繁殖期过后，饰羽就会脱落。在雌鸟或竞偶的雄鸟面前，雌鸟会发出尖厉而婉转的鸣声。

- 巢 光秃地上的天然浅凹。
- 地理分布 非洲撒哈拉沙漠以南，塞内加尔到埃塞俄比亚境内，乌干达和肯尼亚西部有独立的种群。



地理分布图



雌鸟

羽片

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 雨燕科

学名 *Tachymarptis melba*

身长 22 厘米

高山雨燕(Alpine Swift)

体形较大，擅长飞行，白色的腹部在空中十分醒目，常出现在能成群筑巢的高山峭壁、大岩石或高层建筑物上。较常停留在巢中，与欧洲雨燕不同。鸣声长而尖厉，以空中飞行的昆虫为食。

· 巢 以唾液黏合植物碎片和羽毛构成的杯状巢。

· 地理分布 繁殖于欧洲南部、东非到开普敦地区，北方种群在印度和非洲过冬。



地理分布图



亚成鸟



羽色 雌雄相似

栖所

迁徙 迁徙

科名 雨燕科

学名 *Apus apus*

身长 17 厘米

欧洲雨燕(Common Swift)

擅长飞行，除在巢里外，几乎所有的时间都不停地飞行。经常可见繁殖群围在空中快速盘绕，甚至交配、睡眠、喝水时都在飞翔，取食方式则是在飞行中张嘴捕食空中的昆虫，喂哺幼鸟的食物放置在舌下的囊中。低空飞过湖面、河面，用喙吸水，大多在屋顶或墙洞中筑巢，也可在岩石或峭壁中发现天然的巢址。

· 巢 在突出处或洞穴中，以唾液将植物碎片、羽毛黏结成浅杯状巢。

· 地理分布 从欧洲东部到印度北部、蒙古和中国，冬季在南非及非洲热带地区过冬。



地理分布图



尾羽未展开时
呈交叉状



羽色 雌雄相似

栖所

迁徙 迁徙

科名 雨燕科	学名 <i>Hirundapus caudacutus</i>	身长 20 厘米
白喉针尾雨燕(White-throated Needletail) 具有短而宽阔的体形，细长呈弯曲状的翅膀，尾羽有伸出的针状尾尖。飞行时显现腹部和尾部曲线条纹，单独或集小群生活，飞行时捕食昆虫，并发出尖厉的鸣声。 · 巢 位于岩缝或树洞中的浅杯状巢。 · 地理分布 繁殖于亚洲和喜马拉雅山区，冬季南移到新西兰过冬。  地理分布图 亚成鸟		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 迁徙

科名 雨燕科	学名 <i>Chaetura pelagica</i>	身长 13 厘米
烟囱刺尾雨燕(Chimney Swift) 长翅，短尾呈方形，飞行敏捷并发出吱喳的鸣声，集群生活，在烟囱或树洞中栖息筑巢，在筑巢期，群体中较老的个体常帮助喂养幼鸟。 · 巢 在烟囱或树洞中，以唾液黏合细枝而构成浅杯状巢。 · 地理分布 繁殖于加拿大东部和美国，冬季南迁至秘鲁东北过冬。  细长的翅膀 方形短尾 用唾液黏合细枝筑成的巢 地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙


科名 凤头雨燕科	学名 <i>Hemiprocne longipennis</i>	身长 23 厘米
凤头雨燕(Grey-rumped Tree-swift) 栖息于树梢或细枝上，与其他雨燕习性不同。捕食昆虫，常以小群方式出现，成对栖于巢中，有明显的护巢行为。飞行时快速拍翅和放低翅膀滑翔交替进行。 · 巢 单枚卵，产于筑在细枝上的浅杯状巢，并在其上孵化。 · 地理分布 马来半岛及苏门答腊、加里曼丹、爪哇、巴厘岛、苏拉威西。  典型的直立姿势 交叉的长尾羽 亚成鸟 地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙

科名 蜂鸟科	学名 <i>Phaethornis guy</i>	身长 13厘米
--------	---------------------------	---------

绿色隐蜂鸟(Green Hermit)

又称隐士鸟，常独自停栖于潮湿的林地下层，有时会飞到远处采集花蜜，也捕食小昆虫。

- 巢 以蜘蛛网将树叶及棕榈叶连接，筑成长杯状巢，巢下端逐渐变细。
- 地理分布 从哥斯达黎加到秘鲁，在千里达岛也有分布。



细长而弯曲的喙

下颏蓬松的羽毛

发亮的绿羽

尾羽末端渐细



地理分布图



羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 蜂鸟科	学名 <i>Eutoxeres aguila</i>	身长 12厘米
--------	----------------------------	---------

镰嘴蜂鸟(White-tipped Sicklebill)

向下弯曲的硬喙，可以伸入到弯筒状喇叭花较深的部位取食，弯喙使其飞行困难，所以都是藉强有力的脚爬到花顶部；活动于热带雨林的灌丛或林缘中。

- 巢 位于水面上，以棕榈的纤维筑成长而渐细的杯状巢，再以蜘蛛网将其绑到叶尖上。
- 地理分布 哥斯达黎加至秘鲁的林区。



蜂鸟典型的短腿



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 蜂鸟科	学名 <i>Colibri coruscans</i>	身长 12厘米
--------	-----------------------------	---------

闪耀紫耳蜂鸟(Sparkling Violet-ear)

在小树与开花植物生长的森林中活动，采食花蜜及捕食空中的小昆虫，会猛烈俯冲攻击驱赶竞争者；在高出裸露的小枝上栖息时发出重复的“啦啦”声；以向上斜飞再俯冲回栖枝来求偶炫耀。

- 巢 羽毛和苔藓筑成的开敞杯状巢，以蜘蛛网固定在水平树枝上。
- 地理分布 委内瑞拉至阿根廷。




地理分布图





腿部细小

有光泽的绿色羽毛

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 蜂鸟科	学名 <i>Stephanoxis lalandi</i>	身长 9 厘米
--------	-------------------------------	---------

黑胸蜂鸟(Black-breasted Plovercrest)

雄鸟胸部窄长，在远处几乎看不见；栖于林冠下层，以采花蜜和捕食昆虫为生，雄鸟成群求偶炫耀，各自在栖息的灌丛中发出鸣声。

- 巢 在离地不远的水平枝条上，以植物纤维和蜘蛛网筑成的小杯状巢。
- 地理分布 巴西东南部到阿根廷东北部。



雌鸟



地理分布图

盘旋飞行时水平拍击翅膀

羽色 雌雄相似	栖所    	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 蜂鸟科	学名 <i>Discosura longicauda</i>	身长 9.5 厘米/7.5 厘米
--------	--------------------------------	------------------

拍尾蜂鸟(Racquet-tail Coquelle)

雄鸟尾部有两根长长的羽毛，所以体形看上去较大。生活在热带雨林下层的低地中，很少到较高的树冠上采食，用短喙采集花蜜，雄鸟求偶时会展示尾部醒目的长羽。

- 巢 小杯状巢，以蜘蛛网固定在林缘的细枝交叉上。
- 地理分布 有两个种群，一个分布于委内瑞拉南部和圭亚那，另一个分布于巴西东部。



雌鸟



地理分布图

尾部饰羽上长而几乎全裸的羽轴

装饰性的羽片

羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 蜂鸟科	学名 <i>Thalurania furcata</i>	身长 9.5 厘米
--------	------------------------------	-----------

叉尾妍蜂鸟(Fork-tailed Woodnymph)

独居，有攻击其他鸟类领地的习性，生活在热带森林的下层或林缘，采食生长较慢的花并捕食昆虫。飞行时，宽阔而分叉的尾羽明显可见。

- 巢 位于灌丛下方的小细枝上，以植物茸毛和蜘蛛网筑成小型杯状巢。
- 地理分布 委内瑞拉至巴西和阿根廷。



亚成鸟



地理分布图

闪亮的胸羽

以单脚栖息在树枝上

羽色 雌雄不同	栖所    	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 蜂鸟科	学名 <i>Trochilus polytmus</i>	身长 25 厘米/11 厘米
--------	------------------------------	----------------

寿带蜂鸟(Streamertail)

雄鸟头部黑色，冠羽羽端尖细，尾羽小而呈流线形，十分显眼。以采食花蜜和昆虫为生，栖息在公园和林区中时，像“清洁工”一样清理周围环境，求偶飞行时横飞，并上下跳跃。

- 巢 通常在灌丛中的水平枝条上，用植物纤维和茸毛筑成的杯状巢。
- 地理分布 牙买加。



羽端渐尖的冠羽低伏

伸长的尾部呈波纹状



雌鸟



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 蜂鸟科	学名 <i>Topaza pella</i>	身长 19 厘米/15 厘米
--------	------------------------	----------------

赤叉尾蜂鸟(Crimson Topaz)

色彩鲜艳，出现于有季节性洪水泛滥的雨林内，沿小溪两岸活动，取食林木中层或上层的各种花蜜和小昆虫，求偶飞行时，会展现正面亮丽的羽毛。

- 巢 筑于小溪上方的树枝上的杯状巢。
- 地理分布 有两个种群，一个分布于委内瑞拉东南至巴西北部，另一分布于厄瓜多尔东部。



翅膀下方的彩色羽毛

盘旋时露出亮泽的腹部



雌鸟



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 蜂鸟科	学名 <i>Polytmus guainumbi</i>	身长 10 厘米
--------	------------------------------	----------

白尾金喉蜂鸟(White-tailed Goldenthrroat)

生活在开阔的沼泽草地和灌木散生处，羽色较平淡，在树丛中低飞采集花蜜，或以捕食树叶上的小昆虫为生，常停在灌木顶端发出三个音节的高亢鸣声。

- 巢 位于水面、草丛或灌丛下层，以纤细的植物材料筑成渐尖的圆锥状巢。
- 地理分布 委内瑞拉到巴西南部。



雌鸟



啄理时羽毛变皱

粉红色的尾部覆羽

白色尾羽尖端



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 蜂鸟科	学名 <i>Oreotrochilus estella</i>	身长 14 厘米
--------	---------------------------------	----------

安第斯山蜂鸟(Andean Hillstar)

生活在安第斯山脉植被和草地稀少的普纳高原，是一种高山鸟类。在寒夜以少动来保存能量使体温不下降，处在温暖的阳光下则十分活跃，在开阔的地方，用爪子钩在树木上，采食花蜜，也捕食昆虫。领地很小，雌鸟占据固定的位置筑完巢后，雄鸟会飞出巢域，在高海拔的地方生活。

- 巢 用植物茸毛、苔藓和地衣筑成巢壁很厚的杯状巢，悬挂在岩石突出处、洞穴中或屋檐下。
- 地理分布 秘鲁、阿根廷和智利境内的安第斯山区。



喉部的斑纹从不同角度看上去分别呈黑色或绿色虹彩

黑色腹部

雌鸟

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 蜂鸟科	学名 <i>Patagonia gigas</i>	身长 23 厘米
--------	---------------------------	----------

巨蜂鸟(Giant Hummingbird)

色彩平淡，飞行时看似燕子或有尾巴的雨燕，比其他蜂鸟拍翅速度慢，也较容易被发现。常停在栖木上采蜜，姿势很像蝙蝠，也与其他蜂鸟一样捕食小昆虫，具攻击性，常将采食地点的其他鸟类赶走。生活在安第斯山脉气候温和、海拔较高的灌丛和耕作区内，比体形小的蜂鸟更能保存体内热量，忍受低温，分布区内的某些种群，冬季迁移到海拔较低处。

- 巢 以苔藓、地衣筑成的小型杯状巢，位在水平枝条的顶端、仙人掌的茎干上。
- 地理分布 从厄瓜多尔到智利的安第斯山区，及阿根廷西部低地。
- 附注 体型最大的蜂鸟。



浅色的腰羽

腿细

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 蜂鸟科	学名 <i>Ensifera ensifera</i>	身长 25 厘米
--------	-----------------------------	----------

刀嘴蜂鸟(Sword-billed Hummingbird)

细长的喙是身长的两倍，栖息时为了使身体保持平衡，会将头部后仰，使喙笔直朝上，将喙插入大朵悬挂的喇叭形花和其他植物时，呈一特殊的角度。采食花蜜和花粉，及以飞捕昆虫为生。

· 巢 位于林缘的树枝或悬挂在裸露的根茎上，以苔藓筑成的小型杯状巢。

· 地理分布 从委内瑞拉延伸至玻利维亚境内的安第斯山区。



地理分布图



羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 蜂鸟科	学名 <i>Ocreatus underwoodii</i>	身长 12 厘米/7.5 厘米
--------	--------------------------------	-----------------

长靴拍尾蜂鸟(Booted Racquet-tail)

出没在开阔的林地和林缘，腿部有厚重的绒羽，雄鸟具有二根末端有圆形尾扇的长尾羽。常像蜜蜂一样在树叶中飞进飞出，在灌木和林冠之间采食，定在花前时，会急拍翅膀发出“嗡嗡”声，以短喙在没有花瓣的树花上采蜜和花粉，有时附着在花上采食，并发出轻柔的“唧唧”声。

· 巢 位于水平细枝的顶端，以植物茸毛和蜘蛛网筑成的杯状巢。

· 地理分布 委内瑞拉到玻利维亚的安第斯山区。



地理分布图



羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 蜂鸟科	学名 <i>Sappho sparganura</i>	身长 19厘米/13厘米
--------	-----------------------------	--------------


彗星蜂鸟(Red-tailed Comet)


生活在安第斯山脉最高的潮湿灌丛和开阔的林地上，雌雄鸟都有红色叉状尾羽，盘旋捕食，喜欢采食红花。栖息时尾羽张开，上下摆动。

- 巢 在有遮蔽的岩石表面、树上用植物纤维和苔藓筑成杯状巢。
- 地理分布 玻利维亚到阿根廷东北部的安第斯山地区。



地理分布图



羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 蜂鸟科	学名 <i>Ramphomicron microrhynchum</i>	身长 8厘米
--------	--------------------------------------	--------

紫背刺嘴蜂鸟(Purple-backed Thornbill)

喙短而细，雄鸟紫黑色的背部会发出光泽，十分罕见。生活在林缘、树木散生的开阔地和草地，常与同伴和他种蜂鸟一起在树上采食花蜜和花粉，通常飞着采花蜜，有时也附着在花上，也捕食叶片上和飞行中的昆虫。

- 巢 以植物茸毛在细枝上筑杯状巢。
- 地理分布 从委内瑞拉、哥伦比亚到玻利维亚的安第斯山区。





地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 蜂鸟科	学名 <i>Helimaster squamosus</i>	身长 10厘米
--------	--------------------------------	---------

纹胸星喉蜂鸟(Stripe-breasted Starthroat)


冠上和喉部都有绿色和紫色的红斑，体羽灰暗，求偶飞行时，露出胸部一条垂直的白色带纹炫耀。生活在林缘、林木散生区和灌丛，通常独自栖息于枯死的细枝尖端，除采食花蜜外也飞捕昆虫。

- 巢 位于树梢上，以植物和蜘蛛网筑成浅杯状巢。
- 地理分布 巴西东部。





地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 蜂鸟科	学名 <i>Archilochus colubris</i>	身长 9厘米
--------	--------------------------------	--------

红颈蜂鸟(Ruby-throated Hummingbird)

夏天常飞到花园内或人造鸟园，采食花蜜，也捕食昆虫和蜘蛛。

· 巢 以蜘蛛丝捆牢植物茸毛而成。

· 地理分布 繁殖于北美洲东部，在佛罗里达南部和中美洲过冬。

雌鸟



地理分布图



羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 蜂鸟科	学名 <i>Calypte anna</i>	身长 9.5厘米
--------	------------------------	----------

安娜蜂鸟(Anna's Hummingbird)

生活在林地、公园和灌丛中，主食花蜜和昆虫，雄鸟头部红色，雌鸟喉部有红斑。

· 巢 以蜘蛛网捆住茎干、植物茸毛、羽毛筑成杯状巢，位于水平细枝上。

· 地理分布 繁殖于美国西部，冬季南迁至墨西哥。

雌鸟



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 蜂鸟科	学名 <i>Stellula calliope</i>	身长 8厘米
--------	-----------------------------	--------

星蜂鸟(Calliope Hummingbird)

北美洲最小的鸟类，于峡谷溪边、草地及针叶林中活动，以采集红花的花蜜为食。

· 巢 筑在灌木或矮树细枝上，以地衣覆盖的小型杯状巢。


· 地理分布 繁殖于北美洲西部，过冬迁到墨西哥。

雌鸟



地理分布图



羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 蜂鸟科	学名 <i>Selasphorus rufus</i>	身长 10 厘米
--------	-----------------------------	----------

棕褐蜂鸟(Rufous Hummingbird)

头部和身体上方覆盖着亮橙棕色羽毛，外形可爱，但具有攻击性，大多在较矮的植物和灌丛中采食花蜜。

· 巢 位于灌木或乔木细枝上的小型杯状巢，以地衣装饰。

· 地理分布 北美洲西北部，过冬南迁到加州南部海湾和墨西哥。



地理分布图




捕食时舌头所及的位置

尖喙

喉部红色彩斑

宽阔的楔形尾羽

雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙
---------	--	-------


科名 鼠鸟科	学名 <i>Urocolius macrourus</i>	身长 35 厘米
--------	-------------------------------	----------

蓝颈鼠鸟(Blue-naped Mousebird)

尾羽长而细，头部羽毛松软，身体显得较胖，常攀到高处巡视周围的植物。与其他四趾鸟的脚趾不同，其脚趾向前伸展，便于栖息时钩住栖木，向外反卷的外侧脚趾，使行走、跳动更为敏捷。在荆棘灌丛中活动，拍翅作短距离水平飞行，有时也滑翔。主食绿叶，也吃花蜜、种子和果实，食量大而消化慢，因而常常将肚子胀成鼓鼓的壶状，所以习惯将两腿张成与肩同宽，挂在栖木上。群性强，时常集群紧紧的挤在一起栖息，相互梳理羽毛，也筑群巢。飞行和栖息时都常发出轻柔的双音节鸣声。

· 巢 位于灌木或乔木上，以植物筑成形状不规则的杯状巢，内衬鲜嫩的绿叶。

· 地理分布 从塞内加尔到索马里，南到坦桑尼亚的热带非洲地区。



强壮且灵巧的腿——照片中四趾都向前伸，以外趾和中趾紧紧抓住细枝

圆翅用于短距离飞行

外侧尾羽较短

中间的尾羽较长



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 咬鹃科	学名 <i>Trogon curucui</i>	身长 24 厘米
--------	--------------------------	----------

蓝顶美洲咬鹃(Blue-crowned Trogon)

生活在雨林低地和次生林中，栖息在森林的中下层。以果实和昆虫为食，常静静地在树上停留很长的时间寻觅昆虫，一旦发现便猛冲，同时拍翅而飞，抓住昆虫后又飞回栖枝。羽毛柔软而稠密，喙短硬，腿部弱小，常保持直立的姿势。数量稀少，会发出一连串“啾啾”声，叫声常戛然而止，有时也发出低低的“咕噜”声。

- 巢 筑于树洞、啄木鸟的洞、在腐木上啄洞或树上的白蚁巢中。
- 地理分布 哥伦比亚、巴西西北部、秘鲁、玻利维亚、巴拉圭、阿根廷东北部。



地理分布图



羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 咬鹃科	学名 <i>Apaloderma narina</i>	身长 32 厘米
--------	-----------------------------	----------

绿颊咬鹃(Narina Trogon)

生活在森林上层，外形不显眼，能在树上一动不动地停留很长的时间，大多单独出现，有时成对活动。以毛虫等昆虫为食，常从栖木上飞出捕捉叶层、细枝上的昆虫后再返回栖木，有时也在空中捕捉，并常沿树枝寻找昆虫。直线飞行，很少变化，但在追逐昆虫时也能在快速飞行中改变方向，有时加入他种鸟群中捕食昆虫，雄鸟发出像鸽叫声般轻柔而快速重复的“咕咕”声，同时灵活地上下摆动尾巴。

- 巢 在树干、树枝或枯干上的天然树洞中，不加衬垫。
- 地理分布 非洲撒哈拉沙漠以南的林地。



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 咬鹃科

学名 *Harpactes diardii*

身长 30 厘米

紫顶咬鹃(Diary's Trogon)

生活在森林低地中，分布范围广，但数量不多，故不常见。双翼圆形，尾羽长且末端呈方形，是咬鹃的典型特征，但棕褐色体背则和其他亚洲种的绿色体背不同。通常成对出现在中、下部叶层中或裸露的枝条上，身体常长时间静止不动，只转动头部。在枝桠分叉处和藤蔓之间敏捷飞行，追逐蜜蜂和蛾类等昆虫，抓住昆虫后又回到原栖木上，也捕食树叶或细枝上的昆虫。



地理分布图

- 巢 筑巢的亲鸟在腐木上挖洞，不加铺垫，有时将现成的洞穴加大。



- 地理分布 东南亚的苏门答腊、马来半岛、婆罗洲。



羽色 雌雄不同

栖所

迁徙 不迁徙

科名 翠鸟科

学名 *Megaceryle alcyon*

身长 33 厘米

带鱼狗(Belted Kingfisher)

在河边、池塘、小溪旁活动，头部较大，头羽蓬松，体羽混杂了灰蓝色和白色。沿着河边飞行，有时停在大栖木上观看水面，发现鱼或其他生物时先快速盘旋，然后迅速俯冲潜入水中抓住，并带回栖木，从头部开始将之吞食。

- 巢 水边堤岸上斜向上的洞穴，约 5 米长。

- 地理分布 繁殖于北美洲，在南美洲北部过冬。



地理分布图



羽色 雌雄不同

栖所

迁徙 迁徙

科名 翠鸟科	学名 <i>Ceryle rudis</i>	身长 28 厘米
--------	------------------------	----------

斑鱼狗(Pied Kingfisher)

冠羽低矮蓬松，羽色黑白相间，十分显眼，为常在海边、河流、内陆沼泽地等水域出现的潜鸟。捕食时，盘旋飞行，然后头部和身体垂直向下，潜入水中抓鱼、甲壳类，或是其他大型昆虫。鸣声尖厉。



羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 翠鸟科	学名 <i>Dacelo novaeguineae</i>	身长 45 厘米
--------	-------------------------------	----------

笑翠鸟(Laughing Kookaburra)

体形最大的翠鸟，生活在开阔林地中，常出现在离水较远的干燥地区，常伸着头，翘起尾巴，发出“咯咯”的笑鸣声以表明领域，并因而得名。捕食时从栖木向下俯冲，捕捉昆虫、蜥蜴、蛇、啮齿动物和小鸟。幼鸟与成鸟一同生活数年，帮助成鸟筑巢。

- 巢 枝干上无铺衬的树洞巢。
- 地理分布 澳大利亚东部和西南部。



羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 翠鸟科

学名 *Dacelo tyro*

身长 33 厘米

披肩笑翠鸟(Spangled Kookaburra)

羽色鲜艳，生活于季风林、沼泽边缘和热带干燥草原中，常栖息在灌木或乔木较低部位观察地面上的食物，以捕食蜜蜂、蚂蚁和蠕虫等各种无脊椎动物为主。有时会群聚在一起，与几种近缘的澳大利亚鸟类一样有复杂的社会制度，也有筑巢的“帮手”。会发出一连串的“嘎嘎”声及音调很高的鸣声，有时也发出单调而响亮的“咕咕”声。

· 巢 位于树蚁巢旁边的洞穴里，深达 5 米。

· 地理分布 新几内亚南部低地及西南部的阿鲁群岛。


· 附注 在鸟类社会中，亲鸟以外的个体帮助筑巢，称为“帮手”制。



地理分布图



羽色 雌雄相似

栖所 

迁徙 不迁徙

科名 翠鸟科

学名 *Halcyon malimbica*


身长 28 厘米

蓝胸翡翠(Blue-breasted Kingfisher)

体形粗短，喙比其他潜鸟钝，主要生活在毗邻开阔地域的森林、成熟的次生林及红树林沼泽中，降落在栖木或空地上。一发现昆虫及小动物就俯冲捕捉，有时也潜入水中捕鱼。鸣声有 7~10 个音节，缓慢而悲凄婉转，可以远传。

· 巢 树蚁巢旁无衬垫的洞。

· 地理分布 热带非洲西部。




地理分布图





羽色 雌雄不同

栖所 

迁徙 不迁徙

科名 翠鸟科	学名 <i>Alcedo atthis</i>	身长 16 厘米
翡翠(Common Kingfisher) 十分活跃地沿溪旁、岸边及湖滨觅食，飞行快速而呈直线，腰部的亮蓝色斑纹清晰可见。 一有机会就冲向水面抓取小鱼和甲壳类带回栖枝吞食。鸣声短促清脆。 · 巢 向上倾斜的洞穴，位于水边。 · 地理分布 繁殖于欧亚大陆及北非，东至日本，南达太平洋西南，北方种群在此范围内南迁。   地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙

科名 翠鸟科	学名 <i>Ceyx rufidorsa</i>	身长 14 厘米
红背翠鸟(Rufous-backed Kingfisher) 生活在热带雨林的低洼地带，常躲在林下灌丛中，出没于溪边、池塘周围及被落叶半遮盖的水坑旁。飞行时，腰部的淡紫色斑纹清晰可见。常沿小溪快速低飞，停在水面小枝上向水面俯冲捕捉小鱼、甲壳类、水生昆虫，也在陆地上捕食昆虫。 · 巢 筑在林间水边的陆地上，很深的洞穴。 · 地理分布 马来西亚、印尼及菲律宾。   地理分布图 腰部的淡紫色斑纹 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 翠鸟科	学名 <i>Todirhamphus chloris</i>	身长 28 厘米
白颈翠鸟(White-collared Kingfisher) 适应性强，栖息地广布于热带地区的内陆开阔林地、农田、热带雨林及红树林沼泽。呈直线快速飞行，从栖枝上俯冲至地面或水面捕捉鱼类、蟹类、青蛙和蜥蜴。叫声宏亮，为重复的“科欵-科科”声。 · 巢 位于河岸、树洞或直接利用白蚁的巢。 · 地理分布 从非洲东部到印度西部、东南亚、新几内亚、澳大利亚东部及北部、太平洋西南海域的岛屿，呈不连续分布。   地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙

科名 拟翠鸟科	学名 <i>Todus todus</i>	身长 9厘米
---------	-----------------------	--------

短尾鸫(Jamaican Tody)

体形小而滚圆，脚短，被动地栖息在裸枝上等待捕食来往的飞虫，或直接从树叶背面啄食。鸣声为短促的“克-瑞-克”声。成鸟独自或成对生活，在山腰林地繁殖。

- 巢 低洼河岸中的洞巢，离地约 30 厘米。
- 地理分布 仅分布于牙买加。



亚成鸟



头部较大



地理分布图

鸫的典型姿势，喙向上斜



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 翠鸫科	学名 <i>Baryphthengus martii</i>	身长 46厘米
--------	--------------------------------	---------

棕翠鸫(Rufous Motmot)

喙大，腿足短小，性情不活泼，栖息于热带低地、山林及次生林中。常在高枝上等猎物出现，再快速飞到周围枝叶上取食，偶尔也捕食地上的小生物，或尾随工蚁形成的路线捕食昆虫及想逃脱的小动物，以昆虫等无脊椎动物、老鼠、蜥蜴、小果实为食。锯齿状的弯喙能夹紧食物，抓到大猎物会先在树枝上撞死后再吞食。成鸟单独或成对生活，黎明时在高枝上不停地发出类似猫头鹰的鸣声，彼此应和十分嘈杂，鸣声产生的回音使它们很难找到对方。

- 巢 繁殖期在岸上或沟渠旁挖掘洞穴，在洞底筑巢。
- 地理分布 一个种群分布在尼加拉瓜南部到厄瓜多尔西部，另一个分布在亚马孙盆地西部。
- 附注 鸫类中体形最大的一种。



飞羽的蓝边



地理分布图

中间两片尾羽伸长，有些近缘种具球拍状

的尾端

原为方形尾已被磨损



羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 蜂虎科	学名 <i>Nyctyornis amictus</i>	身长 32 厘米
--------	------------------------------	----------

赤须夜蜂虎 (Red-bearded Bee-eater)

喙下弯，翅膀钝圆，喉部和前额有稀疏粗糙的红羽，在森林和林缘中上层栖枝上捕食昆虫，鸣声像轻笑声。



地理分布图

- 巢 溪旁沙地或土堤中的洞巢。
- 地理分布 泰国南部、马来半岛、苏门答腊和婆罗洲。



头较大

翅短圆

方形尾



亚成鸟



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 蜂虎科	学名 <i>Merops albicollis</i>	身长 23 厘米
--------	-----------------------------	----------

白喉蜂虎 (White-throated Bee-eater)

栖息在开阔地中，喙薄而下弯，翅狭长，中间两片尾羽延伸成彩带状，眉羽和喉羽白色，颈部的黑带纹下为淡灰色胸羽。具迁徙习性，在有荆棘灌丛的干旱开阔地带繁殖，冬季移栖到潮湿的热带草原、林缘和砍伐后的林地。轻快地直线飞行或盘旋滑翔。在低枝上捕食蜜蜂和黄蜂等飞虫，由于蜂类有毒液，因此会用喙尖小心抓住猎物，在栖木或地面上磨擦蜂刺，等毒液流完后再安全地吞食，也捕食空中的飞蚁群、昆虫、蜘蛛和小蜥蜴。具群居性，成对或集群活动，天冷或夜宿时常在栖木上挤成一排，繁殖期时选定一地，鸟群各自挖洞，筑成大规模的巢群，繁殖鸟成对在洞巢中过夜并防御巢口的小块区域，成对的配偶都至少有一只单身的鸟帮忙筑巢，最多会有 6 个帮手。



地理分布图

- 巢 在沙地上挖走道状的洞穴，以不具内衬的洞底为巢室。
- 地理分布 繁殖于撒哈拉以南的狭长地带，冬季在西非和中非过冬。
- 附注 在鸟类社会中，亲鸟以外的个体帮助筑巢，称为“帮手”制。



头和喉部 黑白相间

翅膀 狭长

中间两片尾羽伸长



亚成鸟



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------


科名 蜂虎科	学名 <i>Merops apiaster</i>	身长 27 厘米
--------	---------------------------	----------

黄喉蜂虎(European Bee-eater)

体腹蓝色，背部古铜色，喉部黄色，羽色醒目，清脆的鸣声生动而柔和。喜欢在树木和灌丛散生的开阔区域栖息，或停栖在枯树的枝叉和电线上，多数时间在空中飞捕蜜蜂和黄蜂等昆虫。终年群居，成对或成群活动，在靠近堤岸和峭壁处筑群巢。

· 巢 以约 1.5 米深的洞穴尽头为巢室。

· 地理分布 繁殖于欧洲南部、非洲西北部和南部、印度北部，在热带非洲及印度西部过冬。



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------


科名 蜂虎科	学名 <i>Merops nubicoides</i>	身长 38 厘米
--------	-----------------------------	----------

洋红蜂虎(Southern Carmine Bee-eater)

羽色鲜艳，除蓝绿色的头羽和腰羽外均为红色，中间两片特别长的尾羽形成彩带状。常集成大群栖息在开阔、半干旱的热带和亚热带草原及冲积地的草原上，以优雅的姿态低飞、滑翔并发出两声一度的柔和叫声。低飞或在空旷地带的栖枝上捕食，或站在草食性动物和鸵鸟(见 39 页)及大鸨(见 130 页)的背上，飞扑被这些动物惊扰的昆虫，此外，也捕食逃离草原野火的昆虫、蝗虫和飞蚁群。上万对的繁殖鸟在河边的峭壁上相邻挖洞筑巢。

· 巢 洞穴末端无内衬的巢室。

· 地理分布 安哥拉北端向北到卢旺达、东到坦桑尼亚、南到南非东部。



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 佛法僧科	学名 <i>Coracias garrulus</i>	身长 30 厘米
---------	-----------------------------	----------

蓝胸佛法僧(European Roller)

体形大，翅膀长而宽，除栗色背羽外大部分为蓝色。常栖息在树枝、柱子或电线上观察地面，一发现大型昆虫的动静便迅速俯冲捕食，然后再返回栖枝，也飞捕空中来往的昆虫。繁殖期的雄鸟在高空飞翔，上下翻飞展示艳丽的翅膀，并不停地发出“呱呱”或“格格”的叫声求偶炫耀。各自保护巢域，但成群迁徙。

- 巢 无衬垫的树洞，偶尔在河岸或悬崖上筑巢。
- 地理分布 繁殖于欧洲部分地区及北非，至南非过冬。



地理分布图




羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 佛法僧科	学名 <i>Coracias caudata</i>	身长 40 厘米
---------	----------------------------	----------

燕尾佛法僧(Lilac-breasted Roller)

胸羽淡紫色，尾部呈燕尾状分叉，生活于乔木及灌木稀少的干燥草原、热带荆棘灌丛、开阔林地等空旷地带，停在裸枝上观察地面，发现大型昆虫、蜘蛛、小型爬虫类、鸟类便立即扇动蓝色的翅膀俯冲到地面捕食。高温的中午会离开裸枝躲到阴凉处，具侵略性，常大声尖叫不停，繁殖期的雄鸟在空中时而上升，时而俯冲地上下翻飞，并发出沙哑叫声向雌鸟炫耀，也向竞争对手表示此处已有繁殖配偶占据。

- 巢 利用距地面约 3~5 米的枯树洞或白蚁巢。
- 地理分布 从埃塞俄比亚经东非、安哥拉到南非北部。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 佛法僧科	学名 <i>Coracias spatulata</i>	身长 40 厘米
---------	------------------------------	----------

拍尾佛法僧(Racquet-tailed Roller)

具有一对长而末端膨大的外侧尾羽，体色较淡，栖息于森林开阔区，但数量不多。单独、成对或家族群一起生活，在能互相看到的距离内分开觅食。常俯冲到地面捕食蚂蚁、白蚁、蚱蜢、蟋蟀、蜈蚣、蝎子等昆虫，有时也在空中飞捕。

- 巢 未加铺衬的树洞。
- 地理分布 从安哥拉南部、扎伊尔东南穿越津巴布韦到南非东北部。



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 地宝鸟科	学名 <i>Brachypteracias squamigera</i>	身长 32 厘米
---------	--------------------------------------	----------

鳞斑地宝鸟(Scaled Ground-roller)

头大，喙钝，安静而性情隐蔽，生活于热带雨林的地面，尤喜阴暗密林，羽毛的鳞斑在树林中形成保护色。尽管腿较长，但不太活动，仅偶尔在地面漫步或短跑，然后便停下来不动，短圆的翅膀也只在飞向矮枝时才快速拍动几下。

以蚯蚓、昆虫、蜘蛛类及蜗牛为食。

- 巢 地面或低矮河岸上内衬枯叶的洞巢，约 1 米深。
- 地理分布 马达加斯加岛东北部。



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 鸛鷓科	学名 <i>Leptosomus discolor</i>	身长 50 厘米
--------	-------------------------------	----------

鸛鷓(Cuckoo-roller)

短腿、厚喙、大头，外形似佛法僧(见 226~227 页)，但长翅和长尾则颇似杜鹃类(见 188~191 页)。栖息在热带森林和开阔林地内，捕食有毛的鳞翅目幼虫等昆虫及变色蜥蜴。停在树上或在领地上空盘旋时，发出哨音般的清脆鸣声。



雄鸟



地理分布图

- 巢 树洞巢。
- 地理分布 马达加斯加岛。



转动头部时
羽毛蓬松
竖起

雌鸟的体腹
有浅色斑点

羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 戴胜科	学名 <i>Upupa epops</i>	身长 29 厘米
--------	-----------------------	----------

戴胜(Hoopoe)

羽冠如斑马的斑纹，羽色可以和周围环境融成一片。啄取昆虫和小蜥蜴为食，鸣声为轻柔的“呼波”声。

- 巢 位于树干、白蚁巢或墙缝内。
- 地理分布 欧亚大陆、非洲和马达加斯加岛，北方种群在热带非洲、印度及东南亚过冬。
- 附注 繁殖于撒哈拉以南者被划为另一个种。



地理分布图



展开的翼



低平的
羽冠

细长的
喙用于
啄食

翼斑

飞行时露出
黑色尾羽上的白条纹

羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 林戴胜科	学名 <i>Phoeniculus purpureus</i>	身长 40 厘米
---------	---------------------------------	----------

绿林戴胜(Green Wood-hoopoe)

具强壮的短腿和利爪，能紧抓树枝攀爬，白色的尾羽羽端形成刻度般的图案，尾羽收起和张开时都有支撑身体的作用，飞行时可见白色翼斑。出现在浓密的热带雨林以外任何有大树的地方，一只接一只地在树与树间短距离飞行。用细长而略弯的嘴探入缝隙洞穴取食昆虫等无脊椎动物，也吃樱桃、浆果。小群生活，数量达 16 只之多，发出近乎母鸡的“咯咯”声，极为吵闹。群体间相互炫耀，其中几只会表演快速而夸张的鞠躬动作，活泼地上上下下弯曲尾羽；由其他成员作为“帮手”帮助亲鸟取食及照顾幼鸟。

- 巢 利用天然树洞或啄木鸟旧巢，高于地面 22 米处。
- 地理分布 非洲撒哈拉以南。




亚成鸟

白色翼斑

外侧尾羽上的白斑

长长的带状尾



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 林戴胜科	学名 <i>Rhinopomastus cyanomelas</i>	身长 28 厘米
---------	------------------------------------	----------

弯嘴林戴胜(Common Scimitarbill)

体型修长，喙呈弯月形，强壮的短腿和利爪使身体能紧靠在树上攀爬，倒挂着也能取食。羽色暗黑，雄鸟体羽上泛出蓝色光泽，捕食时利用长尾羽支撑身体，以细长弯曲的喙从缝隙里啄取甲虫、蜘蛛、螳螂等大型昆虫。飞行技巧极佳，飞行时露出钝圆翅膀上的白翼斑。生活在林地和干燥开阔的灌丛内，独自或成对出现，繁殖期亲鸟单独筑巢，常加入由各种鸟类组成的捕食群，鸣声为一连串平缓的哨声。

- 巢 位于树干上狭窄的凹处。
- 地理分布 索马里、肯尼亚经东非到安哥拉和非洲南部。



细而弯的喙利于啄食

雌鸟

长尾末端呈锥形



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 犀鸟科	学名 <i>Tockus erythrorhynchus</i>	身长 45 厘米
--------	----------------------------------	----------

红喙弯嘴犀鸟(Red-billed Hornbill)

体形小而修长，喙狭长下弯。成对或小群出现，在食物丰富处聚成大群，跳跃搜寻地面和洞穴中的昆虫为食，常循大型动物的足迹，觅食粪甲虫。

- 巢 铺上稀疏枝叶的树洞巢，筑巢时洞内的雌鸟和洞外的雄鸟合力用泥和粪便堵住洞口，仅留一小出口，雄鸟从出口将食物送入巢内，雌鸟则将粪便喷出巢外。当幼鸟长成亚成鸟时，雌鸟便离开洞巢，同时将洞口重新封好，直到幼鸟能够离巢为止。
- 地理分布 撒哈拉南部经东非到南非。




亚成鸟



眼周围的裸皮

白色体腹

长尾



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 犀鸟科	学名 <i>Ceratogymna Bucinator</i>	身长 65 厘米/58 厘米
--------	---------------------------------	----------------

噪犀鸟(Trumpeter Hornbill)

栖息在森林和林地内，体形较大，喙上方有长而弯曲的盔状构造，小群活动，觅食浆果和昆虫。

- 巢 天然树洞巢。雌鸟混合粪便和泥浆将自己封堵在洞内，仅留直立的窄缝作为洞口，由雄鸟捕食喂养雌鸟和幼鸟，亲鸟和幼鸟同时离巢。
- 地理分布 东非和中非。




亚成鸟



巨大的盔状突起随喙形而弯曲

眼周围的裸皮



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 犀鸟科	学名 <i>Buceros rhinoceros</i>	身长 125 厘米/90 厘米
--------	------------------------------	-----------------

马来犀鸟(Rhinoceros Hornbill)

巨大的角质盔随喙形沿伸，末端上翘。栖居在低地和山麓森林，在高大成熟的林木顶端生活。体形虽大，仍能在树枝间灵活跳动，在树林上方有力地飞行，拍翅声极大，并不断发出喇叭般的共鸣声。宽大的翼羽呈黑色，飞行时露出白色胁羽和尾羽上黑色带纹。单独或成对活动，只有长满浆果的树才会招至小群一起取食，也捕食小鸟、幼鸟等各种小动物。

- 巢 洞口堵住的树洞巢，仅留食物入口。
- 地理分布 东南亚的马来半岛、苏门答腊、婆罗洲和爪哇。



巨大的盔

宽圆的翅膀

白色尾羽



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 地犀鸟科	学名 <i>Bucorvus cafer</i>	身长 107 厘米
---------	--------------------------	-----------

红脸地犀鸟(Southern Ground-hornbill)

羽色暗黑，栖宿在树上，但大多在地面走动捕食。小群生活，约 8 只聚集共同防卫领地，成群巡守领地时，也同时在地面啄食挖取昆虫、蛇、鱼和啮齿类等动物。群体中会有“帮手”帮助繁殖配偶筑巢。

- 巢 内衬干叶的树洞巢。
- 地理分布 撒哈拉以南的非洲地区。
- 附注 犀鸟科中体型最大者。



喉部 红色肉垂



亚成鸟 雌鸟

飞行时露出白色翼斑



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 美洲吃蜂鸟科	学名 <i>Galbula ruficauda</i>	身长 20 厘米
美洲吃蜂鸟(Rufous-tailed Jacamar) 栖息在靠近溪流的林缘、砍伐后的空地与次生林中，体形瘦长，喙长而细，长尾，短腿细弱，警觉性高，近乎神经质的好动。捕食时较被动，常翘着喙停在视野辽阔的树枝上，不断转动头部，见到飞过身旁的蜻蜓、蜜蜂、黄蜂、甲虫便突然飞出捕食，再飞回栖枝或附近的树枝上将猎物整只吞下。如果捕到大蝴蝶，则利用树枝和爪将翅膀去掉后再吞食。成对生活，栖宿和捕食都不分开，不断发出尖而高的鸣声，激动时转成啼鸣。 · 巢 堤岸和倒地的树根内无铺垫的地洞，深达 50 米，有时直接利用白蚁巢。 · 地理分布 一个种群分布在墨西哥到巴西北部，另一个分布在巴西中部到阿根廷的东北部。		
 雌鸟 两趾向前，另外两趾反转向后 尾羽上方为亮绿色，外侧尾羽下方呈浅橙色  地理分布图 		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 美洲五彩鸟科	学名 <i>Bucco Macrodactylus</i>	身长 14 厘米
美洲五彩鸟(Chestnut-capped Puffbird) 头大，身体呈蹲伏状，腿足纤弱，有蓬松的绒毛状羽毛，硬喙基部的短硬毛能帮助捕捉昆虫。生活在河岸森林及刚生成的低矮树林中，蹲伏在低枝上，身体露出树冠或半隐其中，短距离飞行捕捉附近的昆虫。通常很安静，鸣声为一连串短促的上升音调，以燕子般的“喳喳”声结束。 · 巢 地洞巢，或连通树蚁巢。 · 地理分布 哥伦比亚、委内瑞拉、玻利维亚和巴西西部。		
 蓬松的绒毛状羽毛 笨重的蹲伏姿势 翅膀短而圆  地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 美洲五彩鸟科	学名 <i>Monasa nigrifrons</i>	身长 29 厘米
-----------	-----------------------------	----------

黑额尼鸲(Black-fronted Nunbird)

羽色黑亮，平时安静蹲坐栖息，机警地观察树叶及地面，一发现有昆虫飞过便突然冲出捕捉。以数次快速振翅和一次滑翔交替飞行，在树枝间飞来飞去，跟随猴群捕食被猴子驱赶的昆虫。单独、成对或一小群在河岸边、沼泽森林及次生林中栖息，经常鸣叫，成群合唱能持续好几分钟，群体中的某些成员会作为筑巢的帮手。

- 巢 河岸上的坑洞和地面凹陷处。
- 地理分布 哥伦比亚境内的安第斯山东侧、秘鲁、玻利维亚北部及巴西。

短圆的翅膀

圆而宽阔的尾羽

外侧趾反转

两趾向前两趾向后

喙弯曲

亚成鸟

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 示蜜鸟科	学名 <i>Indicator indicator</i>	身长 20 厘米
---------	-------------------------------	----------

示蜜鸟(Greater Honeyguide)

生活在开阔森林、混合林及灌丛中，羽色灰暗，外表平凡，体型似雀形目，是唯一能消化蜡质的鸟类。以昆虫为主食，发现蜂巢后便发出一种有吸引力的叫声将附近的人类、蜂熊、狒狒、鼬引到蜂巢的位置，等其他动物将蜂巢破坏后，再觅食蜂蜡。自己不孵卵，将卵产在寄主鸟的巢内，刚孵出的幼鸟喙尖有锋利的钩，能杀死寄主的幼雏。

- 巢 巢寄生，将一枚卵产在寄主鸟的巢内。
- 地理分布 塞内加尔到开普敦的非洲地区。

白色耳斑

翼上覆羽的白色羽缘

长翅

尾羽尖端通常呈方形

亚成鸟

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 五色鸟科	学名 <i>Eubucco bourcierii</i>	身长 15 厘米
---------	------------------------------	----------

红头拟啄木(Red-headed Barbet)

在山地森林中下层树枝和树叶堆中觅食，能倒挂身体食取昆虫和浆果，较为安静，与其他五色鸟不同。



地理分布图

- 巢 在腐木凹洞内筑巢。
- 地理分布 哥斯达黎加到秘鲁北部。



雌鸟



发亮的
红色头羽

外侧脚趾
反转

羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 五色鸟科	学名 <i>Semnornis ramphastinus</i>	身长 19 厘米
---------	----------------------------------	----------

鸚鵡拟啄木(Toucan Barbet)

生活在安第斯山区高海拔而云雾缭绕的森林内，在树枝间以身体前倾的姿势跳跃，抬高尾羽保持身体平衡。单独或成对加入混合群觅食浆果、昆虫及蜥蜴等小型脊椎动物。鸣声大而类似雁鸣，亲鸟间经常对鸣。

- 巢 无铺衬的树洞巢。
- 地理分布 哥伦比亚西南、厄瓜多尔西部。



边缘不规则的厚喙
利于啄取浆果

焰红色
体腹



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 五色鸟科	学名 <i>Psilopogon pyrolophus</i>	身长 28 厘米
---------	---------------------------------	----------

火簇拟啄木(Fire-tufted Barbet)

外表颇似鸚鵡(见 169~185 页)，除前额的一簇红羽外并不显眼。集小群在树木高大的林地活动，在藤蔓及树叶层攀爬，喜食小型浆果，常将浆果沾在羽毛上，性情安静，会发出柔和的哨声和接近蜂鸣声来保持相互间的联系。



地理分布图

- 巢 尚无记录，可能是树洞巢。
- 地理分布 马来半岛和苏门答腊的高山区。



两趾向前
两趾向后反转

羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 五色鸟科	学名 <i>Megalaima haemacephala</i>	身长 16.5 厘米
赤胸拟啄木(Coppersmith Barbet) 鸣声快速而类似铁锤打在金属上的“铿铿”声，单独或成对停栖在林地或农田树木的枝叶间，不易发现，食取各类浆果，飞行快而直，扇翅稳定。 · 巢 树木枝干的洞巢。 · 地理分布 巴基斯坦到中国 and 菲律宾，南到印度尼西亚西部。 眼周围裸皮形成的眼圈 体腹的条纹状羽毛 短尾 地理分布图 亚成鸟		
羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙

科名 五色鸟科	学名 <i>Pogoniulus chrysoconus</i>	身长 11 厘米
黄额补鹭(Yellow-fronted Tinkerbird) 生活在林地和树木零散分布的草原树木顶端，除有节奏的“扑坡”鸣声外并不出色，独处和成对时会驱赶进入领地的同种个体。觅食樱桃等小浆果，也沿着树枝和树叶堆捕食小昆虫。 · 巢 树干上的洞巢。 · 地理分布 塞内加尔到南非北部的非洲地区。 条纹状脸部 小巧的喙 体腹黄色 地理分布图 亚成鸟		
羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙

科名 五色鸟科	学名 <i>Lybius dubius</i>	身长 25 厘米
须拟啄木(Bearded Barbet) 粗大的喙上部隆起，喙基长有用于在枯树上凿洞的硬须，以无花果为主食，栖息在树木零散分布的草原、林地和农田内。 · 巢 枯树和树干上无铺垫的洞巢。 · 地理分布 非洲邻近撒哈拉南部的地区。 喙部深沟向下延伸，在上喙形成缺口 地理分布图 亚成鸟		
羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙

科名 大嘴鸟科	学名 <i>Pteroglossus castanotis</i>	身长 37 厘米
---------	-----------------------------------	----------

栗耳阿拉卡鸛(Chestnut-eared Aracari)

具有细长而弯曲、边缘锯齿状的喙，生活在森林及林缘，性情活泼。具群性，成小群在林中穿梭，栖息时许多鸟挤在啄木鸟旧巢等洞穴中，以短距离飞行觅食无花果之类的浆果、植物的花序、昆虫等小型生物。

· 巢 无铺垫的树洞巢，或利用啄木鸟的旧巢。

· 地理分布 哥伦比亚东部、厄瓜多尔、玻利维亚和阿根廷东北。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 大嘴鸟科	学名 <i>Andigena laminirostris</i>	身长 50 厘米
---------	----------------------------------	----------

板嘴山鸛(Plate-billed Mountain-toucan)

颜色鲜艳的巨喙利于觅食浆果、昆虫和小生物，上喙外侧有一不知用途的鲜黄色角质板。这是色彩斑斓的典型山地鸛，体背暗黑色，腹面灰蓝色，纤细的羽毛呈毛发状。栖息在山地森林内，成对小群活动，加入混合鸟群觅食浆果和昆虫。常躲在树丛中发出一连串哀怨的悲鸣声，也会“咯咯”大叫。

· 巢 树上的天然洞穴。


· 地理分布 哥伦比亚西南和厄瓜多尔西部的安第斯山区。

喙侧面的黄色平板

腹侧黄斑

红色尾下覆羽

尾端淡红色



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 大嘴鸟科	学名 <i>Ramphastos tucanus</i>	身长 53 厘米
---------	------------------------------	----------

红嘴鸛鸛(Red-billed Toucan)

体形大，栖息在树木高大的热带雨林林缘高处或树冠上，休息时转过头将喙放在背上，同时将尾羽前摆盖住长喙。单独、成对或大群活动，曾有多达 5 只鸟群聚在同一栖枝栖息的记录。飞行时先快速扇翅数次后再张翅向前滑翔，因巨喙而显得笨重。觅食浆果、花絮、昆虫、蜘蛛、蜥蜴、蛇、小型鸟类的卵和幼雏，鸣叫声类似一连串有节奏的狗吠声，同时喙和尾部也会随着急速上抬。

- 巢 底部垫有果核形成的食茧的天然树洞巢。
- 地理分布 亚马孙河流域北侧的哥伦比亚东部、委内瑞拉东部、圭亚那和巴西北部。



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 大嘴鸟科	学名 <i>Ramphastos toco</i>	身长 60 厘米
---------	---------------------------	----------

鞭苔鸛鸛(Toco Toucan)

看起来巨大且不易操纵的喙，实际上为中空而质轻的结构。飞行起伏有致，时而展翅时而滑行，露出白色腰羽和红色尾下覆羽。栖息在林地、次生林、可可林和其他棕榈类植被中，笨拙地在枝上蹦跳前进。觅食浆果、昆虫、小型鸟类的蛋和幼雏，利用巨喙来食取无法支撑体重的细枝梢上的食物，进食时先以喙尖咬住食物，然后甩头使食物摔到喉部，再用长而硬的舌将食物勾住，常在高枝上发出似乌鸦般深沉的叫声。

- 巢 绿树和枯树的凹洞中。
- 地理分布 委内瑞拉、巴西、阿根廷西北部。



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 啄木鸟科	学名 <i>Jynx torquilla</i>	身长 16 厘米
地啄木(Eurasian Wryneck) 以伸长脖子和扭转头部的动作威吓敌人，将带黏性的舌头伸入蚁穴中捕食蚂蚁。 · 巢 树木、墙壁和堤坝的洞中。 · 地理分布 繁殖于欧亚大陆和非洲西北，在非洲、印度和东南亚过冬。 亚成鸟   细小的喙 精巧的羽色便于伪装  地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙

科名 啄木鸟科	学名 <i>Sasia abnormis</i>	身长 10 厘米
姬棕啄木(Rufous Piculet) 体形小而活跃，似雀形目鸟类。在林中植被的枝叶间攀援、跳跃，搜捕地面落叶层的蚂蚁等小昆虫，在竹子和矮树上以啄木鸟的方式轻敲树表并戳入树皮觅食。 · 巢 在树枝上凿洞为巢。 · 地理分布 东南亚的马来半岛、苏门答腊、爪哇和婆罗洲。  地理分布图  强健的脚上具有攀援用的宽爪 尾部非常短  雌鸟 		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 啄木鸟科	学名 <i>Melanerpes formicivorus</i>	身长 23 厘米
橡树啄木鸟(Acorn Woodpecker) 群居在橡树林中，12 只一群，保护共用的领地和巢穴。夏天觅食橡果和昆虫，夏末在树上、篱笆和木质建筑物上钻整排的洞，每个洞中存放一颗橡果作为预备之用，冬天吃坚果和水果，叫声粗哑，二声一度。 · 巢 在树干上凿小洞。 · 地理分布 北美西部到哥伦比亚。  地理分布图  眼睛明亮 脸部的白羽 胸部条纹  雌鸟 		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 啄木鸟科	学名 <i>Melanerpes candidus</i>	身长 24 厘米
白啄木鸟(White Woodpecker) 羽色鲜艳而斑驳，常出现于旷野，栖息于半空旷森林、林缘、农闲空地和稀树草原，飞行迅速有力，路线笔直，与一般啄木鸟不同(见16 页)，穿过旷野时会停在枯树梢上休息一段时间。小群一起出现，但不知是单纯家族还是混杂其他个体。常敲击树干搜寻昆虫，但主食水果，因此会危害橙树林，也吃种子，野生种还能吸取花蜜。 · 巢 在树上凿小洞为巢。 · 地理分布 南美东部的苏里南、巴西、阿根廷北部。 眼周围裸皮 体腹纯白 后趾 外侧前趾向后反转 尾部用以支撑身体 地理分布图 雌鸟		
羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 不迁徙

科名 啄木鸟科	学名 <i>Melanerpes flavifrons</i>	身长 22 厘米
黄额啄木鸟(Yellow-fronted Woodpecker) 出现在森林、空旷树林和砍伐后仅剩少量零星树木分布的林中，栖息范围内相当常见，具高度群性，成群一起觅食树丛间的水果。常在枝上栖息，有时从草本植物高处跳下来食取浆果，笼中饲养的个体也吃昆虫，并喜食花蜜，表示野生种也能探入花朵吸取花蜜。求偶或威吓敌人时，会不断上下左右晃动头部，以炫耀黄眼圈和鲜红的头颈。 · 巢 尚无记录，依近缘啄木鸟的习性推断，可能是在树上凿洞为巢。 · 地理分布 南美洲东部、巴西东南、巴拉圭和阿根廷东北部。 眼睛周围的裸皮 喉部为鲜黄色 尾羽上的白色横斑 呈尖刺状的尾羽用于支撑身体 雌鸟 背部的白色条纹 地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所    	迁徙 不迁徙

科名 啄木鸟科	学名 <i>Melanerpes carolinus</i>	身长 24 厘米
---------	--------------------------------	----------

红腹啄木(Red - bellied Woodpecker)

背上有阶梯状黑白相间的横条纹，头颈为红色，腹部也有红色斑块，飞翔时露出白色尾羽和翼上的白色斑纹。在开阔林地、公园及城郊分布广泛，成对活动，育雏时才短时间全家一起生活。以枯树中的昆虫为食，冬季在花园觅食，捕食时利用强而有力的尾羽轴支撑身体，以对趾形脚趾紧抓树干；鸣声为婉转的“初儿”声。

- 巢 无衬垫的树洞巢。
- 地理分布 北美洲东部，北方种群在此范围内南迁过冬。



地理分布图



雄鸟
从喙基到前额的红色冠羽

雌鸟

背部的横纹是典型的“梯状纹”

尾羽上有横斑

羽端尖细

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 啄木鸟科	学名 <i>Sphyrapicus varius</i>	身长 22 厘米
---------	------------------------------	----------

黄腹吸汁啄木(Yellow - bellied Sapsucker)

敲击树干觅食昆虫，并吸食从树皮流出的含糖分树汁，它们选择合适的枫、桦、白杨、果树等阔叶树和针叶树，凿出一排排的方格洞，第二年又重新凿一次。取食时先在树上凿小洞，过一会再折回来饮树洞流出的树汁，并吞食被汁液引来的昆虫，松鼠、鸣禽和蜂鸟等动物也会借机饮用树汁。生性安静，偶尔发出猫叫声；春天才有树汁可食，所以春天时会敲击枯树制造出连续击鼓声，表明已占据领地。

- 巢 凿出的树洞巢，无铺垫。
- 地理分布 繁殖于加拿大，美国东、北部，南迁到美国南部、巴拿马中部和加勒比海过冬。



地理分布图



面颊的条纹

胸部上方的黑色斑块

雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 啄木鸟科	学名 <i>Dendrocopos major</i>	身长 23 厘米
---------	-----------------------------	----------

大斑啄木(Great Spotted Woodpecker)

生活在欧亚大陆和非洲，适应力强，可在各种树木生长的地区生活，是最常见、分布最广的啄木鸟。脸颊、颈部和肩羽为白色，张爪并利用尾羽抵住树皮支撑身体，以硬喙啄开枝干表面的树皮，将有黏性的舌头伸进洞中搜捕昆虫，并啄开腐木寻找昆虫的幼虫，发出响亮的“初抖”声，春天时会敲击树枝。

- 巢 无衬垫的树洞巢。
- 地理分布 从欧洲东到日本，南至北非，印度东北和中国，分布范围很大。



地理分布图





雌鸟



脸部
马褂状
黑羽

白肩斑

羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 啄木鸟科	学名 <i>Picoides villosus</i>	身长 24 厘米
---------	-----------------------------	----------

毛发啄木(Hairy Woodpecker)

背部下方具白色条纹，尾羽外侧纯白，在北美洲茂密的针叶林、阔叶林和开阔林地中广泛分布，但不敢进入农田和城郊。攀援在树干和粗枝啄凿树皮和朽木，以细长且顶端倒勾的舌舔食蛀虫。叫声为宏亮的“辟克”声和愉悦的马嘶声。

- 巢 在枯树和腐木中掘洞为巢。
- 地理分布 北美洲的阿拉斯加到巴拿马。



地理分布图





雄鸟



面颊的
黑色
条纹

外侧前趾
向后反转

后趾

羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 啄木鸟科	学名 <i>Colaptes auratus</i>	身长 32 厘米
---------	----------------------------	----------

扑动翼(Northern Flicker)

以啄木鸟(见 16 页)特有的波浪式飞翔，露出白色腰羽和鲜艳的翼下羽毛，但姿势很像雀形目鸟类，东部型翼下覆羽为黄色，西部型为红色。大部分时间在地面以长舌黏食蚂蚁，发出重复不断的“务克”和“务克儿”的响亮叫声。

- 巢 在枯树枝干中凿洞。
- 地理分布 从北美、西印度群岛、美洲中部延伸到尼加拉瓜，北部种群冬天在此范围内南迁。



地理分布图



雄鸟

颈背的红斑

黑色斑纹

体腹有点状斑

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 啄木鸟科	学名 <i>Celeus flavus</i>	身长 28 厘米
---------	-------------------------	----------

乳脂色啄木(Cream-coloured Woodpecker)

身体乳黄色，具短而尖的浓密羽冠，竖起时头部膨大，数量稀少，只在季节性泛滥的沼泽地、次生林等潮湿林地及草原的河边林地出现。在森林中层觅食，擅长打开薄的树蚁巢，但不理会坚硬泥巢，也食取树枝上的昆虫和果实。常几只鸟齐鸣，重复发出宏亮的“威欸”声，或连续重复四次的“坡务儿务”声，最后两声短而低。

- 巢 尚无记录，可能凿树洞为巢。
- 地理分布 南美安第斯山脉以东的哥伦比亚、圭亚那，南到秘鲁、玻利维亚和巴西东部。



地理分布图



雌鸟

雄鸟的黑眼圈

以尾部支撑身体

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 啄木鸟科	学名 <i>Dryocopus pileatus</i>	身长 42 厘米
---------	------------------------------	----------

北美黑啄木(Pileated Woodpecker)

体羽黑色，颈部有白色条纹，羽冠鲜红色；飞行快速，呈直线形，主要栖息在森林、公园和小片林地里。喜食钻进枯树的昆虫、从地面向上凿食的工蚁，也常把它们吸引到枯树干下，捕食时敲打树干的声音在寂静的树林中格外清晰，也觅食坚果、橡子和小野果。鸣声为一高一低的“务科阿-务科阿”重复声。春天时，雄鸟以快速敲打树枝来炫耀领地。

·巢 位于树干、枯树干或电线杆上的洞巢。



地理分布图



·地理分布 加拿大及美国部分地区。

·附注 自从二十世纪中叶象牙嘴啄木鸟灭绝后，便成为北美数量最多的种类。



羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 啄木鸟科	学名 <i>Picus viridis</i>	身长 32 厘米
---------	-------------------------	----------

绿啄木(European Green Woodpecker)

栖息在开阔的林地、林缘、灌木丛和树木稀疏的开阔地带，呈波浪式飞行，飞行时露出黄色的胁羽。在草丛中绿色的体羽是一种很好的保护色。觅食时，先找寻到蚁巢，然后将很长的舌头伸进穴中黏食蚂蚁，在一个蚁巢边常要花很长的时间；冬天则凿进深雪中寻找树蚁巢。鸣声为婉转动人的“坡路-坡路-坡路”声。

·巢 在单生树的树干中凿出洞巢，离地约1米高。



地理分布图



·地理分布 从英国到俄罗斯，东南亚至伊朗北部。



羽色 雌雄不同	栖所    	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 灶鸟科	学名 <i>Furnarius rufus</i>	身长 18 厘米
棕灶鸟(Rufous Hornero) 腿细长，适合在开阔草原上生活，常在垃圾堆上觅食无脊椎动物。 · 巢 筑在树枝或电线杆顶上的圆形泥巢，外形像面包烤箱，所以西班牙名“<i>el hornero</i>”即为烤箱之意。 · 地理分布 南美南半部开阔低地。		
 地面啄食鸟的长喙 巢 富弹性的长腿适于行走  地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙

科名 灶鸟科	学名 <i>Aphrastura spinicauda</i>	身长 15 厘米
棘尾雷雀(Thorn-tailed Rayadito) 体形小而好动，头和翼有醒目的条纹，尾部长有可以增加支撑力量的粗棘条。群栖于各个高度的森林或灌丛中，以植被、树木枝干上的昆虫为食。 · 巢 筑在摊开的树皮后或树洞中，植物构成的杯状巢。 · 地理分布 智利中部以南，地势较低的安第斯山和森林中。		
 头部条纹 攀树时用以支撑身体的棘尾  地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙

科名 灶鸟科	学名 <i>Cinclodes antarcticus</i>	身长 20 厘米
淡黑克洛雀(Blackish Cinclodes) 体形矮胖，生活在岩滩和岸边草丛中，是这种栖息地中唯一深色的地栖鸟。性情温顺，以昆虫和其他无脊椎动物为食。 · 巢 岩缝中的浅杯状巢。 · 地理分布 福克兰群岛、火地岛南部以及近海岸岛屿。		
 以纤细的喙觅食 体形！圆胖  地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙

科名 灶鸟科	学名 <i>Margarornis squamiger</i>	身长 16 厘米
--------	---------------------------------	----------

珍珠爬树雀(Pearled Treerunner)

生活在亚热带和温带森林和林缘大树的高枝上，常倒勾在树枝上，或旋转着爬向树梢，动作十分特别。在浓密的树冠中食取昆虫和蜘蛛，常混合在鸟群中捕食无脊椎动物。

- 巢 树枝的基部由苔藓编成的球形巢，侧边入口。
- 地理分布 委内瑞拉到玻利维亚境内的安第斯山脉。



珍珠状斑点

身体

用尖细的尾棘支撑



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 灶鸟科	学名 <i>Philydor amaurotis</i>	身长 16 厘米
--------	------------------------------	----------

白额拾叶雀(White-browed Foliage-gleaner)

栖息在亚热带森林中，常在浓密的低层枝叶上跳跃、攀援。体形小，性情谨慎，常加入混合鸟群中捕食枯叶堆里的无脊椎动物。

- 巢 尚无记录。
- 地理分布 巴西东南部和阿根廷东北部沿岸山丘。



小而坚硬的喙

尾部硬棘

鲜艳的棕红色尾部



地理分布图


羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 灶鸟科	学名 <i>Automolus rubiginosus</i>	身长 19 厘米
--------	---------------------------------	----------

赤黄拾叶雀(Ruddy Foliage-gleaner)

栖息于雨林、林缘、低地和小丘山脚，在靠近地面的浓密植被中攀援捕食昆虫和小型无脊椎动物。性情狡猾而胆怯，很少加入林下食虫鸟组成的混合捕食群。

- 巢 在土堤上掘深洞，把巢筑在洞底，可能由小枝和植物纤维构成。
- 地理分布 从墨西哥穿越圭亚那到玻利维亚。



浅色喉部

纯褐色体羽

用长尾平衡身体



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 蚁鸟科	学名 <i>Cymbilaimus lineatus</i>	身长 17 厘米
--------	--------------------------------	----------

带斑蚁鸣(Fasciated Antshrike)


身体笨重，外形呆钝，以雨林边缘藤蔓植丛中的昆虫为食。

· 巢 位于灌丛或树枝分叉上的杯状巢。

· 地理分布 洪都拉斯、哥伦比亚、厄瓜多尔西北部，及安第斯山以东的哥伦比亚、玻利维亚北部和巴西。



雌鸟



头大

坚硬的
钩状喙



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 蚁鸟科	学名 <i>Taraba major</i>	身长 20 厘米
--------	------------------------	----------

大蚁鸣(Great Antshrike)

活动于次生林下层，常成对蹦跳着捕食昆虫。

· 巢 位于矮灌丛的细枝上，由草和树叶构成开敞的杯状巢。

· 地理分布 墨西哥南部到巴西和阿根廷北部。



冠羽竖起

坚硬的
钩状喙

雌鸟

纯黑色
背部

翼斑



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 蚁鸟科	学名 <i>Thamnophilus palliatus</i>	身长 15 厘米
--------	----------------------------------	----------

线纹蚁鸣(Lined Antshrike)

体形粗壮，在茂密的林缘下层林木和灌丛中的空地活动，以坚硬的钩状喙猎捕昆虫和蜘蛛。

· 巢 下层林木枝叉上，以草和树叶构成的杯状巢。

· 地理分布 巴西及邻近国家，北至哥伦比亚，南至玻利维亚。



雌鸟



坚硬的
钩喙

白色线纹
是名字的
由来



地理分布图

以坚韧的脚
紧握树枝

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 蚁鸟科	学名 <i>Formicivora rufa</i>	身长 13 厘米
--------	----------------------------	----------

锈背蚁鸫(Rusty-backed Antwren)

生活在热带草原的干旱空地和矮灌丛中，单独或成对活动，在植被掩护下蹦跳着捕食地面的小昆虫。

- 巢 灌丛枝叉上的小型杯状巢。
- 地理分布 苏丹、巴西、巴拉圭、玻利维亚和秘鲁。



雄鸟具黑色喉部

雌鸟

白色眼纹

坚硬的长尾用以保持平衡



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 蚁鸟科	学名 <i>Myrmeciza exsul</i>	身长 13 厘米
--------	---------------------------	----------

栗背蚁鸟(Chestnut-backed Antbird)

成对在低地和山坡林地的低矮植被中活动，跟随蚁群觅食被惊起的昆虫，也常和他种蚁鸟一样停栖在直立茎干上伺机捕食。

- 巢 隐藏在靠近地表密丛中的大型杯状巢。
- 地理分布 洪都拉斯到厄瓜多尔西部。



雌鸟

眼周围的蓝色裸皮

短翅



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 蚁鸟科	学名 <i>Pithys albifrons</i>	身长 12 厘米
--------	----------------------------	----------

白羽蚁鸟(White-plumed Antbird)

成群生活在低地雨林中，跟随行进的蚁群，停栖在直立茎干上伺机袭击被蚁群惊起的昆虫。

- 巢 灌丛或落叶堆内的杯状巢。
- 地理分布 巴西亚马孙平原以北，及巴西西部和北部的国家。



冠羽及双颊为白色

尾羽散开以保持平衡

停栖于植物茎干上的姿势



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 蚁鸟科	学名 <i>Phlegopsis nigromaculata</i>	身长 18 厘米
--------	------------------------------------	----------

黑点裸眼雀(Black-spotted Bare-eye)

成群生活在雨林下层，常随蚁群捕食被蚂蚁惊起的昆虫。

- 巢 棕榈树残株顶部凹处，无铺衬的杯状巢。
- 地理分布 亚马孙平原。
- 附注 许多种蚁鸟的眼睛周围都有裸皮。

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 蚁鸟科	学名 <i>Phaenostictus mcleannani</i>	身长 19 厘米
--------	------------------------------------	----------

眼斑蚁鸟(Ocellated Antbird)

生活在低地雨林中，羽毛上有眼状斑纹，和他种蚁鸟一样，捕食被蚁群从隐蔽处惊起的昆虫，由于停在较低的枝干上，比小型蚁鸟取食时占优势。

- 巢 尚无记录。
- 地理分布 中、南美洲，从洪都拉斯到厄瓜多尔西部。

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 蚁鸟科	学名 <i>Pittasoma rufopileatum</i>	身长 16.5 厘米
--------	----------------------------------	------------

棕顶蚁八色鸟(Rufous-crowned Antpitta)

生活在热带雨林及较成熟的次生林中，跳跃着捕食地面的昆虫，或注视蚁群活动，捕食被蚂蚁惊扰出现的昆虫。

- 巢 尚无记录。
- 地理分布 哥伦比亚和厄瓜多尔境内的安第斯山西部低地及山脚。

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 食蚊鸟科	学名 <i>Conopophaga melanops</i>	身长 11.5 厘米
---------	--------------------------------	------------

黑颊食蚊鸟(Black-cheeked Gnateater)

生活在雨林下层和次生林，单独活动，捕食地上的昆虫或在靠近地面的植被层飞捕。

- 巢 尚无记录。
- 地理分布 巴西东部沿海低地。



羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 窜鸟科	学名 <i>Liosceles thoracicus</i>	身长 20 厘米
--------	--------------------------------	----------

锈带窜鸟(Rusty-belted Tapaculo)

栖息在低地雨林中，跳跃着捕食地表和下层植被的昆虫。

- 巢 尚无记录。
- 地理分布 巴西西部亚马孙雨林，及与哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁交界处。
- 附注 西班牙文以“Tapaculo”（盖住你的臀部）戏称它们的粗尾。



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 霸鹟科	学名 <i>Suiriri suiriri</i>	身长 15 厘米
--------	---------------------------	----------

休里霸鹟(Suiriri Flycatcher)

体形细长，生活在树木稀少而灌丛茂密的开阔森林中，捕食植被中的昆虫，常与其他食虫鸟混群取食。

- 巢 树枝分叉上由植物纤维构成的简单杯状巢。
- 地理分布 从巴西东北部向南延伸至阿根廷中部、巴西北部至苏里南。



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------


科名 霸鹟科	学名 <i>Stigmatura budytoides</i>	身长 15 厘米
大鹡鸰霸鹟(Greater Wagtail-tyrant) 身体细长，和旧大陆鹡鸰一样喜欢翘起尾部上下摆动，成对在开阔森林及灌丛中捕食昆虫。 · 巢 接近地表的浅杯状巢。 · 地理分布 玻利维亚南部、阿根廷西部及巴西东部。		
		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙

科名 霸鹟科	学名 <i>Pseudotriccus ruficeps</i>	身长 11 厘米
棕头侏霸鹟(Rufous-headed Pygmy-tyrant) 身体矮胖，大小和鹪鹩差不多，喙细小，生活在山地的亚热带林和温带林中。单独在森林下层爬行捕食昆虫，短距离飞行时翅膀会发出“嗖嗖”声。 · 巢 尚无记载。 · 地理分布 哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁和玻利维亚的安第斯山区。		
		
羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙

科名 霸鹟科	学名 <i>Onychorhynchus coronatus</i>	身长 17 厘米
王霸鹟(Royal Flycatcher) 体形细长，生活在雨林和亚热带开阔森林下层，停栖在树枝上等到猎物后，在空中飞捕，或捕捉叶上的昆虫。雄鸟冠羽为红色，雌鸟为黄色，色彩鲜艳的冠羽通常收起，或在头顶后方展开成“槌头”的形状。 · 巢 悬挂在河面的树枝上，长达 2 米的袋状巢。 · 地理分布 从墨西哥至玻利维亚和巴西东南部。		
		
羽色 雌雄略有不同	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 霸鹟科	学名 <i>Contopus sordidulus</i>	身长 16.5 厘米
西林绿霸鹟(Western Wood - pewee) 体形中等，于开阔森林和林缘活动，停栖在光秃的枝桠分叉或断枝上，从栖枝飞起在半空中捕食昆虫。 · 巢 较高的水平枝叉上开放的杯状巢。 · 地理分布 繁殖于北美西部森林和中美洲山地森林中，冬天迁徙到南美的秘鲁和哥伦比亚过冬。 大眼 直立搜寻猎物的姿势 腿短 尾长   地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙


科名 霸鹟科	学名 <i>Empidonax difficilis</i>	身长 13.5 厘米
北美蚊霸鹟(Pacific Slope Flycatcher) 外表平庸，生活在山坡的林地以及峡谷中，常以直立姿势停在树枝上，上下摆动扇状尾羽，在空中或叶丛中捕食昆虫。 · 巢 凹洞中植物构成的杯状巢。 · 地理分布 繁殖于美国和加拿大西部，冬季南迁至墨西哥。 喙基宽 眼大 腿短 翅长 尾长   地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙

科名 霸鹟科	学名 <i>Sayornis phoebe</i>	身长 17 厘米
东菲比霸鹟(Eastern Phoebe) 生活于水边的开阔林地和农场，从栖枝上飞捕昆虫，停栖时常上下摆动尾部，名字取自于“佛一逼”的叫声。已适应城镇生活，能在建筑物上筑巢。 · 巢 有遮蔽的凸出处，其上以泥土和植物构成坚固杯状巢，新巢常筑在旧巢上。 · 地理分布 繁殖于北美中部和东部，在美国东南和墨西哥过冬。 喙宽而平 翅长 长尾有平衡作用   地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙

科名 霸鹟科	学名 <i>Sayornis nigricans</i>	身长 19 厘米
黑菲比霸鹟(Black Phoebe) 性情温顺，也发出“佛一逼”的叫声，停栖于河中大石头上，在水面短暂飞行捕获昆虫后又回到原来的栖枝上，直立的栖息姿势和摇摆的尾部是重要特征。 · 巢 水边岩突上以泥及草制成的杯状巢。 · 地理分布 由美国西南、中美洲、安第斯山、玻利维亚延伸到阿根廷西北。		
地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙

科名 霸鹟科	学名 <i>Pyrocephalus rubinus</i>	身长 15 厘米
朱红霸鹟(Vermilion Flycatcher) 羽色艳丽，生活于树木和灌丛散布的开阔森林，常在水边半干旱田野活动，在飞行和停栖时捕捉昆虫为生。 · 巢 枝桠分叉上的浅杯状巢。 · 地理分布 繁殖于美国到阿根廷地区、加拉帕戈斯群岛，南部种群在亚马孙，北部种群在中美洲过冬。		
地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 部分迁徙

科名 霸鹟科	学名 <i>Ochthoeca cinnamomeiventris</i>	身长 13 厘米
蓝灰背霸鹟(Slaty-backed Chat-tyrant) 栖息在山地森林的溪流边，体型粗壮，羽色暗淡，短喙，一生都在小区域中活动，具高度定居性，成对在林下植被中猎食昆虫等无脊椎动物。 · 巢 开放的杯状巢，位在水边岩石表面突出的部分。 · 地理分布 从委内瑞拉跨越安第斯山到玻利维亚的亚热带森林。		
地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙

科名 霸鹟科	学名 <i>Colonia colonus</i>	身长 23 厘米
长尾霸鹟(Long - tailed Tyrant) 有两条长而醒目的尾羽，生活在低地雨林或隔开的林地边缘，大多栖息在枯树、秃枝或断枝等有刺位置上。成对活动，每对鸟都有特定栖位，在栖枝上注视飞行的昆虫，快速飞出捕食后再回到原来的栖位，无刺的蜜蜂是最常猎捕的食物。 · 巢 枯树干的洞内由植物构成松散的巢。 · 地理分布 从洪都拉斯到哥伦比亚、巴西南部、阿根廷东北部及圭亚那。 警觉的大眼 眼部有白斑 中间的尾羽加长   地理分布图 羽色 雌雄相似 栖所  迁徙 不迁徙		

科名 霸鹟科	学名 <i>Fluvicola nengeta</i>	身长 13 厘米
--------	-----------------------------	----------

装脸水霸鹟(Masked Water Tyrant)

体色斑驳，在地面附近、水边岩石或植被活动，以各种昆虫为食。

- 巢 离水面不远的枝梢上侧边开口的蛋形结构，内衬草、植物及羽毛。
- 地理分布 一个种群分布在厄瓜多尔西部和秘鲁，另一个在巴西东部。

黑色过眼线

活泼的翘起黑白相间的尾部







地理分布图



羽色 雌雄相似

栖所 


迁徙 不迁徙

科名 霸鹟科	学名 <i>Hirundinea ferruginea</i>	身长 18 厘米
峭壁霸鹟(Cliff Flycatcher) 体形细长，常发出嘈杂、连续的鸣声。停栖在岩石、林中伐木道边的电话线等显著位置上，飞起捕捉昆虫后会回到原停栖处。在峭壁、裸岩、村庄和农场的建筑物上筑巢。 · 巢 峭壁或墙面突出处的杯状巢。 · 地理分布 委内瑞拉到阿根廷的安第斯山区，及圭亚那、巴西、乌拉圭。		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙



地理分布图



科名 霸鹟科	学名 <i>Machetornis rixosus</i>	身长 19 厘米
牛霸鹟(Cattle Tyrant) 体形细长，生活在开阔地区，能奔跑相当远的距离，停栖在石头、低矮植物及牛等放牧动物的背上，捕食地面、动物身上和空中的昆虫。 · 巢 低矮植被中由植物纤维构成的大型球状巢，或利用其他草原生活鸟类的旧巢。 · 地理分布 委内瑞拉到哥伦比亚、巴西东北部到巴西南部、玻利维亚东部到阿根廷北部的低洼地带。		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙



地理分布图



科名 霸鹟科	学名 <i>Pitangus sulphuratus</i>	身长 23 厘米
大食蝇霸鹟(Great Kiskadee) 体形大而嘈杂的树栖鸟，常在水边或人类居住环境周围的稀树开阔区活动。捕食时从栖枝上飞下，以有力的喙捕食地上的昆虫、蠕虫和鼠、蛙、蜥蜴等小型脊椎动物，也可潜水捕鱼，或在空中飞捕昆虫。 · 巢 树上由植物筑成圆顶状巢，结构大而松散，开口在侧面，有时为开放式杯状巢。 · 地理分布 由美国南部得克萨斯州延伸到阿根廷中部，已引入百慕大地区。		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙



地理分布图



科名 霸鹟科	学名 <i>Tyrannus savana</i>	身长 23 厘米
--------	---------------------------	----------

叉尾霸鹟(Fork-tailed Flycatcher)

停栖在树木和灌丛稀疏的草原、裸地等低而开阔的区域，从停栖处飞到空中食取昆虫和树上鲜果。冬天集成大群在树上觅食和夜宿，尾部的外侧羽毛加长，看起来十分细长。

- 巢 树上或灌丛中开敞的浅杯状巢，内衬精细材料。
- 地理分布 从墨西哥东部延伸到阿根廷和福克兰群岛低洼地带，从南北两端迁徙过冬。



头部黑色，冠羽藏有黄斑

常在篱笆上歇息

雌鸟

两支分开生长的尾羽



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 霸鹟科	学名 <i>Tyrannus tyrannus</i>	身长 22 厘米
--------	-----------------------------	----------

东美洲王霸鹟(Eastern Kingbird)

常以直立姿势栖息在近水源的林木砍伐地、农场和草地灌丛，从栖息的灌木或电线上迅猛地在空中捕食昆虫，是知名的捕虫霸鹟。


- 巢 树枝或电线杆上由小枝构成的盘状巢。
- 地理分布 繁殖于美国和加拿大南部，在南美洲哥伦比亚到阿根廷北部过冬。
- 附注 攻击在栖息地中的任何鸟类，连老鹰也不例外，是最早被称作“霸鹟”的鸟类。




以硬喙捕食它最爱吃的蜜蜂

藉强壮的翅膀翱翔

有力的尾



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所    	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 霸鹟科	学名 <i>Pachyramphus versicolor</i>	身长 13 厘米
斑纹比卡雀(Barred Becard) 生活在山区的亚热带森林，觅食各层植被的昆虫和鲜果，成对生活，常与其他鸟类组成混合群。 · 巢 在树枝分叉上编成圆形巢，入口靠近巢的底部。 · 地理分布 哥斯达黎加到委内瑞拉、玻利维亚西部。 翅上的白条纹 雌鸟 体形浑圆丰满 地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 不迁徙

科名 霸鹟科	学名 <i>Tityra cayana</i>	身长 22 厘米
黑尾蒂泰雀(Black-tailed Tityra) 羽色黑白相间，栖息在暴露的树枝末端，强壮的喙适于食取鲜果和大型昆虫，成对在林缘或砍伐地旁活动。 · 巢 树叶堆上的杯状巢，在啄木鸟啄成的树洞或其他洞穴之中。 · 地理分布 从哥伦比亚、委内瑞拉到阿根廷北部的低地雨林。 眼周围皮肤裸露 嘴大 雌鸟 长而有力的翅膀 地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 不迁徙

科名 侏儒鸟科	学名 <i>Schiffornis turdinus</i>	身长 16.5 厘米
鸚侏儒鸟(Thrush-like Schiffornis) 生活在雨林，行踪隐秘，常躲在林地下层觅食昆虫和鲜果，鸣声如哨音。 · 巢 树枝分叉处或断裂枝干上，由植物构成大而开敞的杯状巢。 · 地理分布 中、南美洲西北部和巴西东部。 · 附注 虽属侏儒鸟科，但可能与霸鹟科亲缘关系更近。 大眼 喙短粗 羽色平淡易于躲藏 地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 侏儒鸟科	学名 <i>Machaeropterus regulus</i>	身长 9厘米
---------	----------------------------------	--------

条纹侏儒鸟(Striped Manakin)

体形纤小，在雨林中下层和次生林生活，取食小鲜果和昆虫，是所有侏儒鸟中外形最平凡的一种，繁殖雄鸟在“求偶场”炫耀表演。

- 巢 尚无记录，应为藏在灌丛里的小型杯状巢。
- 地理分布 哥伦比亚、委内瑞拉、厄瓜多尔东部、秘鲁东北部低地，巴西的西部和东部也有分布。



羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 侏儒鸟科	学名 <i>Manacus vitellinus</i>	身长 10厘米
---------	------------------------------	---------

金领侏儒鸟(Golden-collared Manakin)

在雨林边缘和次生林的林木下层活动，羽色艳丽，食取鲜果和昆虫。繁殖期雄鸟在特定的“求偶场”向雌鸟炫耀，扯开喉咙发出嘶哑叫声，并在树枝间飞来飞去。

- 巢 细枝分叉上由植物组成的小型杯状巢。
- 地理分布 巴拿马到哥伦比亚西部低地。




羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 侏儒鸟科	学名 <i>Ilicura militaris</i>	身长 12厘米
---------	-----------------------------	---------

针尾侏儒鸟(Pin-tailed Manakin)

生活在雨林的中下层和成熟的次生林中，觅食浆果和昆虫。繁殖期的雄鸟成群对着雌鸟鸣叫、颤动身体并竖起鲜红的臀部羽毛炫耀，雌鸟负责筑巢并照顾幼雏，雄鸟并不予以帮助。

- 巢 细枝分叉上的杯状巢。
- 地理分布 巴西东南部低地和山麓地区。



羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 侏儒鸟科	学名 <i>Pipra mentalis</i>	身长 10厘米
----------------	---------------------------------	----------------

红顶侏儒鸟(Red-capped Manakin)

主要在雨林和次生林中层
的树冠活动，盘旋飞行捡食浆
果，也吃小昆虫。

- 巢 水平树枝分叉处的浅杯状巢。
- 地理分布 从墨西哥东南部到哥
伦比亚西部和厄瓜多尔西部。

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 伞鸟科	学名 <i>Phoenicircus nigricollis</i>	身长 24厘米
---------------	---	----------------

黑颈红卡丁伞鸟(Black-necked Red Cotinga)

在雨林下层攀登树枝觅食大型昆虫和鲜
果。一大群羽色鲜艳的雄鸟聚在“求偶
场”表演时十分壮观，其余时间则
胆怯地躲起来。

- 巢 尚无记录。
- 地理分布 从哥伦比亚
南部、委内瑞拉西到秘鲁
东北和巴西西部低地。

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 伞鸟科	学名 <i>Cotinga amabilis</i>	身长 20厘米
---------------	-----------------------------------	----------------

秀丽伞鸟(Lovely Cotinga)

蓝色羽毛，常躲在雨林边缘的树
冠或下层植被中，有时栖息在暴
露的高枝上觅食鲜果和昆虫。雄
鸟求偶炫耀时，会一边飞行一边
发出“嗖嗖”的响声。

- 巢 接近树干的浅杯状巢，有
时藏在植被中。
- 地理分布 墨西哥南部到巴拿马的
加勒比海海岸坡地。

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 伞鸟科

学名 *Querula purpurata*

身长 28 厘米

紫喉果鸦(Purple – throated Fruitcrow)

体形大，羽色黑，栖息在雨林的中上层树冠，取食昆虫和鲜果。小群觅食和休息，合作照料巢中的雏鸟，雄鸟以鼓起颈部及喉部紫色羽毛求偶炫耀。

· 巢 树的高处由细枝做成的浅杯状巢。

· 地理分布 从哥斯达黎加穿越南美洲，向南至玻利维亚北部、巴西亚马孙河流域低洼地区。

· 附注 果鸦是唯一群居的伞鸟科鸟类，除紫喉果鸦外，还有红领果鸦、绯红果伞鸟及裸领果鸦四种。



地理分布图



羽色 雌雄不同

栖所

迁徙 不迁徙

科名 伞鸟科

学名 *Rupicola peruviana*

身长 30 厘米

安地斯动冠伞鸟(Andean Cock – of – the – rock)

羽色鲜明，生活在安第斯山溪边的森林和树木繁茂的峡谷，以鲜果为生。“求偶场”位于植被中上层的裸露树枝上，艳丽的繁殖雄鸟将冠羽向前拉长至完全盖住喙，眼睛的形状也从圆形变为长椭圆形；雌鸟全身深棕色，冠羽也比雄鸟小，每只雌鸟选择一只雄鸟交配，雌鸟单独尽育雏义务，雄鸟不予以帮助。

· 巢 岩石表面隐秘的凹处由树枝和泥筑成的杯状巢。

· 地理分布 委内瑞拉到玻利维亚境内，安第斯山地的亚热带林区。

半圆形的冠羽在求偶炫耀时展开

明亮的圆眼睛

翅上覆羽变大



地理分布图



羽色 雌雄不同

栖所

迁徙 不迁徙

科名 伞鸟科	学名 <i>Procnias nudicollis</i>	身长 28 厘米
--------	-------------------------------	----------

裸喉钟雀(Bare-throated Bellbird)

生活于热带山地密林中，很少离开树顶部，可根据铃声般的鸣声来识别，以鲜果为食，雌鸟与雄鸟交配后独立营巢。

- 巢 位在树枝分叉处，细枝做成的浅杯状巢，不坚固。
- 地理分布 从巴西东部到巴拉圭东南部的山地森林中。



脸和喉部
皮肤裸露

在枝叶上
十分明显的
白色羽毛



雌鸟



地理分布图



羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 尖喙鸟科	学名 <i>Oxyruncus cristatus</i>	身长 16 厘米
---------	-------------------------------	----------

尖喙鸟(Sharpbill)

生活在雨林里，敏捷地活动于林缘或林冠的树枝间，取食昆虫和小型鲜果。雄鸟们集中在“求偶场”进行一连串的求偶炫耀。

- 巢 在树枝分叉处的浅杯状巢。
- 地理分布 哥斯达黎加、秘鲁东部和巴拉圭，呈块状分布。



冠羽下伏



羽冠



地理分布图



脚趾粗壮
能握牢
树枝

羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 刈草鸟科	学名 <i>Phytotoma rara</i>	身长 20 厘米
---------	--------------------------	----------

棕尾刈草鸟(Rufous-tailed Plantcutter)

外形和金翅相似，栖息在干燥的灌丛、树林及河谷、果园和农场中。成对小群生活，行为冷静温和，以锯齿形的喙咬断树芽和鲜果为食，有时也取食昆虫。


- 巢 灌木分枝处或矮树上的小型杯状巢。
- 地理分布 智利中部和南部以及毗邻的阿根廷地区。



雌鸟



尾下覆羽
棕褐色



地理分布图



羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 八色鸟科	学名 <i>Pitta erythrogaster</i>	身长 16 厘米
---------	-------------------------------	----------

红胸八色鸟(Red-bellied Pitta)

常在雨林的地面上奔跑，有时也短距离飞行，取食小型无脊椎动物，会在石头上砸碎蜗牛来吃，也吃小鲜果，常攀到树枝上鸣唱或栖息。

- 巢 位于地面、断裂的树枝，或葡萄藤上的圆顶巢，侧面入口。
- 地理分布 菲律宾、印尼东部、新几内亚和澳大利亚南部，有些种群进行短距离迁徙。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 八色鸟科	学名 <i>Pitta guajana</i>	身长 22 厘米
---------	-------------------------	----------

蓝尾八色鸟(Banded Pitta)

栖息在阴湿的雨林和次生林中，常在地面寻找蜗牛、蠕虫、甲虫和其他大型昆虫，鸣声响亮，可以传得很远。

- 巢 位于灌丛中，由植物构成的下凹球状巢。
- 地理分布 马来半岛、苏门答腊、婆罗洲、爪哇和巴厘岛。



地理分布图



雌鸟


羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 八色鸟科	学名 <i>Pitta brachyura</i>	身长 20 厘米
---------	---------------------------	----------

印度八色鸟(Indian Pitta)

于热带和亚热带森林的茂密灌丛中栖息，可以攀到树顶上栖息和鸣唱，但飞行能力有限。平时在林中轻快地跳跃，找寻昆虫、新鲜果实和种子。

- 巢 地上的圆顶巢，入口位在侧边。
- 地理分布 印度半岛，部分种群迁徙到印度南部和斯里兰卡过冬。



地理分布图



蓝色翼斑

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 八色鸟科	学名 <i>Pitta caerulea</i>	身长 29 厘米
大蓝八色鸟(Giant Pitta) 性情机灵，很难发现其踪影，但常传出特殊的叫声，通常栖息在雨林低地中，偶尔也在山区的雨林出现，食蚯蚓和蜗牛。 · 巢 枯叶和细枝筑成的圆顶巢，入口在侧边，隐藏在下层植被中。 · 地理分布 马来半岛、苏门答腊和婆罗洲。 体态丰满 雌鸟 头部大 尾短 地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 刺鹛科	学名 <i>Acanthisitta chloris</i>	身长 8 厘米
刺鹛(Rifleman) 小型林栖鸟类，以锐利的喙去探寻树皮裂缝、苔藓以及地衣里的昆虫，鸣声高亢。 · 巢 松散的圆顶巢，入口在巢边，通常位于树洞中或堤坝上。 · 地理分布 新西兰。 · 附注 森林栖息地遭到破坏，为生存受威胁的物种之一。 头部宽平 翅膀短圆 地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 裸眉鸫科	学名 <i>Neodrepanis coruscans</i>	身长 10 厘米
肉垂拟太阳鸟(Sunbird - asity) 栖息于茂密的雨林中，取食林中各个层次的昆虫，并采食花蜜，已适应次生林环境。性情安静，常是单独或成小群生活。雄鸟繁殖后换羽，外形即和雌鸟类似。 · 巢 苔藓夹杂树叶构成的球状巢，悬挂在树枝的末端。 · 地理分布 马达加斯加岛东部。 装饰性的眼部肉垂 探针似的长喙 地理分布图 		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 琴鸟科	学名 <i>Menura novaehollandiae</i>	身长 90 厘米/80 厘米
华丽琴鸟(Superb Lyrebird) 在潮湿油加利树林的地面上活动， 体型大小和生活方式都与鸡相 似。以长而有力的腿捕捉昆虫 及其他无脊椎动物为食。繁 殖期，雄鸟用湿土堆成特定 的“求偶场”，翘起琴状 长尾不断颤动来炫耀，同 时发出混合了许多模仿声 的复杂鸣声。 · 巢 树枝、树皮、羊齿 植物、树叶、苔藓等构成 的大型圆顶巢，开口在侧 面，内衬根茎，通常位于 地面、断裂的 羊齿植物残干 或岩石上。 炫耀时将尾羽 翘在身体上方 · 地理分布 澳 大利亚东南部。 · 附注 两性尾羽不 同，成年雄鸟的琴形 尾羽约 10 厘米长。    地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 薮鸟科	学名 <i>Atrichornis clamosus</i>	身长 20 厘米	
嘈杂薮鸟(Noisy Scrub-bird) 生活在油加利树的灌丛里，生性胆怯，几乎不能飞行。在地面的枯枝落叶层中取食小型无脊椎动物、小蜥蜴和青蛙，雄性以大声鸣叫来表明领地。 · 巢 圆顶巢，筑于茂密植被中。 · 地理分布 澳大利亚西南部。 · 附注 濒临灭绝的物种。   地理分布图 <tr><td>羽色 雌雄不同</td><td>栖所 </td><td>迁徙 不迁徙</td></tr>	羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙	

科名 百灵科	学名 <i>Eremoptryx verticalis</i>	身长 13 厘米
--------	---------------------------------	----------

灰背雀百灵(Grey-backed Finch-lark)

生活在光秃干旱的沙漠地区，经常在地面上行走、奔跑，偶尔低飞并停落在树枝上，以种子、植物及小型无脊椎动物为食。

- 巢 草丛或岩石边的杯状巢，位于地面上。
- 地理分布 非洲南部的部分地区。





地理分布图



羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------


科名 百灵科	学名 <i>Calandrella rufescens</i>	身长 13 厘米
--------	---------------------------------	----------

小沙百灵(Lesser Short-toed Lark)

体形小而不醒目，生活在植被稀疏的干旱地带，以种子和昆虫为食，雄鸟常在空中盘旋鸣叫。


- 巢 地洞中的深杯状巢，隐藏在石头或茂密的草丛中。
- 地理分布 西班牙南部、非洲北部、中东及亚洲的中部和东部，东北部种群冬季迁向南方。





地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------


科名 百灵科	学名 <i>Galerida cristata</i>	身长 19 厘米
--------	-----------------------------	----------

凤头百灵(Crested Lark)

喙坚硬、冠羽高，飞行笨拙，叫声大而婉转。喜欢在农田、光秃地面与草丛混杂的地区等开阔而干旱的地域栖息，有时歇息于灌木上，与他种百灵习性不同，经常成对或成小群的取食种子、植物和昆虫。


- 巢 由草茎制成的深杯状巢，位于地面的凹处。
- 地理分布 欧洲、中东、印度、中国和赤道北部的非洲地区。





地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 百灵科	学名 <i>Lullula arborea</i>	身长 15 厘米
--------	---------------------------	----------

木百灵(Woodlark)

常出现在荒地或山丘的草地中，有时也在稀树林栖息。取食地面的种子和昆虫，雄鸟站在栖枝上，或边飞边发出慢而长的鸣声。


- 巢 在草丛中的深杯状巢。
- 地理分布 欧洲、非洲北部和中东，东北部种群冬季迁到西方和南方。



冠羽倒伏

翅宽


尾短



地理分布图



冠羽竖立

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 百灵科	学名 <i>Alauda arvensis</i>	身长 18 厘米
--------	---------------------------	----------

云雀(Skylark)

以在空中飞歌而闻名，喜欢在牧场之类的矮草地活动，和其他百灵一样以走路而非跳跃的方式移动。取食种子和昆虫，在繁殖季以外群集生活。

- 巢 地洞里的深杯状巢，部分被草丛遮盖住。
- 地理分布 遍布欧亚大陆和非洲北部的草地，北部种群冬季南迁。




条纹状羽纹

典型的直立姿势

翅宽

腿强健而适于奔走



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 百灵科	学名 <i>Eremophila alpestris</i>	身长 17 厘米
--------	--------------------------------	----------

陆地百灵(Shore Lark)

在裸露的百砾地带，或耕种过的田地中取食种子、植物和昆虫，雄鸟在春天会发出微弱而高亢的叫声。


- 巢 洞穴中的杯状巢。
- 地理分布 繁殖于欧亚大陆、北美和南美，冬季迁徙至欧亚大陆南部，或西欧和南美的海岸地区。



两束角状羽毛在冬季会消失

长翅

体腹白色




地理分布图



冬羽



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 燕科	学名 <i>Tachycineta bicolor</i>	身长 15 厘米
-------	-------------------------------	----------

双色树燕(Tree Swallow)

栖息在靠水边的稀树林中，捕食飞行在开阔地域的小型昆虫，常集成大群一起迁徙。

- 巢 在树洞或建筑物中，以植物的茎筑巢。
- 地理分布 繁殖于北美，冬季分布区向南延伸到哥伦比亚。




地理分布图



亚成鸟

羽色 雌雄相似

栖所 


迁徙 迁徙

科名 燕科	学名 <i>Progne subis</i>	身长 19 厘米
-------	------------------------	----------

紫崖燕(Purple Martin)

体色深黑，不断绕着各种开阔栖息地的上空飞翔，猎取昆虫。

- 巢 树洞巢，内衬泥和细枝，在东部分布区经常占据巢箱。
- 地理分布 在美国繁殖，冬季至巴西东南部过冬。




地理分布图



雌鸟

羽色 雌雄不同

栖所 

迁徙 迁徙

科名 燕科	学名 <i>Riparia riparia</i>	身长 12 厘米
-------	---------------------------	----------

沙燕(Sand Martin)

蓝褐色体羽，体形较小，在群巢附近的河流、湖泊和沙坑中捕食昆虫。

- 巢 植物和羽毛筑的杯状巢，位于悬崖洞穴中。




地理分布图



· 地理分布 繁殖于北美洲和欧亚大陆，冬季在南美洲、非洲、印度北部和东南亚过冬。



羽色 雌雄相似

栖所 

迁徙 迁徙

科名 燕科	学名 <i>Hirundo rustica</i>	身长 19 厘米
-------	---------------------------	----------

家燕(Swallow)

北半球最普遍的候鸟，出没在靠近水源的开阔地带，常低空飞行捕食昆虫。

- 巢 泥筑的碗状巢，位于墙壁突出处、建筑物的檐下及洞穴中。
- 地理分布 繁殖于北美洲和欧亚大陆，冬季在南半球过冬。

强健有力的双翅
适长距离飞行

腿足
短小

雌鸟

尾羽延伸
似饰带

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 燕科	学名 <i>Delichon urbica</i>	身长 13 厘米
-------	---------------------------	----------

毛脚燕(House Martin)

夏季在欧亚大陆的北部十分常见，常在街道和公园中飞捕昆虫，也常出现在水塘旁，收集筑巢用的泥。

- 巢 小泥团筑盆状巢，附着在靠近屋檐的墙壁上。
- 地理分布 繁殖于欧亚大陆，冬季在非洲、印度北部和东南亚的部分地区过冬。

喙
短小

翅狭长呈
流线形

腿部被
覆羽毛

叉形尾

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 鹡鸰科	学名 <i>Motacilla flava</i>	身长 16.5 厘米
--------	---------------------------	------------

黄鹡鸰(Yellow Wagtail)

繁殖于草地和牧场上，常活跃地在地面取食无脊椎动物。

- 巢 具内衬的杯状巢，位于地面的浅凹处。
- 地理分布 在欧亚大陆繁殖，南半球过冬。
- 附注 雄鸟头部的繁殖羽饰，有黑色、白色、蓝色和黄色，随地理亚种的不同而有差异。

欧洲东南部
亚种的头部
为黑色

腿长
而敏捷

奔跑时
摇摆尾部以
保持平衡

雌鸟

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 鹡鸰科	学名 <i>Motacilla cinerea</i>	身长 19 厘米
--------	-----------------------------	----------

灰鹡鸰(Grey Wagtail)

头部和背部灰色，常栖息在流动的水边，捕食昆虫和甲壳类动物。有活泼的性情和铃声般的“叮当”鸣声。

- 巢 苔藓和叶片筑成杯状巢，位于靠近流水的洞中或岩石的突出处。
- 地理分布 欧洲、非洲和亚洲，部分南迁。

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 鹡鸰科	学名 <i>Motacilla alba</i>	身长 17.5 厘米
--------	--------------------------	------------

白鹡鸰(White Wagtail)

栖息在靠近水源的开阔地区，捕食昆虫，常在建筑物附近营巢。

- 巢 具内衬的杯状巢，浅洞中。
- 地理分布 欧洲、非洲、亚洲和阿拉斯加。
- 附注 英国亚种为斑鹡鸰，雄鸟背部黑色。

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 鹡鸰科	学名 <i>Tmetothylacus tenellus</i>	身长 15 厘米
--------	----------------------------------	----------

金鹡鸰(Golden Pipit)

外形醒目，常栖落在灌丛和地面捕食无脊椎动物。炫耀时将翅膀在背部缩成“V”字型，从树尖上俯冲下来，繁殖季以外的时间，以小家族方式生活。

- 巢 茎干和草筑成杯状巢，内衬细根，藏在隐秘的草丛中。
- 地理分布 非洲东部，从苏丹、埃塞俄比亚向南直到坦桑尼亚。
- 附注 唯一一种羽色鲜艳的鹡鸰鸟。

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 鹨科	学名 <i>Anthus pratensis</i>	身长 14.5 厘米
-------	----------------------------	------------

草地鹨(Meadow Pipit)

羽色灰褐具条纹，栖息在草原和荒野等开阔地域，奔跑取食昆虫、蠕虫和种子。飞行能力差，姿势不平稳，常边鸣唱边飞行，再以跳伞般的动作降落。

- 巢 以草的茎叶筑成杯状巢，具内衬，塞在地面上的浅凹洞中。
- 地理分布 从格陵兰到亚洲中部，部分种群冬季迁徙到非洲北部。



地理分布图


羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 山椒鸟科	学名 <i>Lalage sueurii</i>	身长 18 厘米
---------	--------------------------	----------

白翅原鹡鸰(White-winged Triller)

翅上具白色条纹，雄鸟的繁殖羽饰色彩斑驳，鸣声大而颤抖，雌鸟则不甚醒目，繁殖期形成一种半群巢的形式，以树冠和地面上的昆虫为食。

- 巢 根和草筑成浅碟状巢，以蜘蛛丝连接在树枝分叉处。
- 地理分布 澳大利亚，冬季在澳大利亚北部、新几内亚、印尼的帝汶岛上过冬。



地理分布图

雌鸟


羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 山椒鸟科	学名 <i>Pericrocotus flammeus</i>	身长 23 厘米
---------	---------------------------------	----------

赤红山椒鸟(Scarlet Minivet)

体态细长，颜色鲜明，不停地在雨林的树冠中飞来飞去，以短距离快速飞行追捕昆虫，常集成 20 只以上的捕食群，也常加入混合鸟群中。


- 巢 以地衣筑成小浅碟状巢，靠蜘蛛丝连接，并用树皮屑装饰，位于树林中高处。
- 地理分布 印度半岛、中国南部和东南亚。
- 附注 喜马拉雅山以南的印度半岛之外地区，雄鸟为鲜红色。




地理分布图

雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鹎科	学名 <i>Pycnonotus jocosus</i>	身长 20 厘米
红颊鹎(Red - whiskered Bulbul) 生性活泼、敏捷，鸣声嘈杂，常出现于果园、城镇中的花园及次生林中。常成对觅食水果、嫩芽，捕食时短距离飞扑昆虫为最大特征。 · 巢 由蜘蛛丝缠绕细枝、枯叶而成的浅杯状巢，具内衬，位于树上。 · 地理分布 印度半岛、中国和东南亚。 冠羽竖起 长尾 亚成鸟 地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 鹎科	学名 <i>Alophoixus phaeocephalus</i>	身长 20 厘米
黄腹鹎(Yellow - bellied Bulbul) 颈部具有蓬松的白色羽毛，体腹黄色，无冠羽，相当驯服而容易接近，常在雨林低地单独活动，以浆果和小甲虫为食。 · 巢 植物纤维筑成的浅杯状巢，内衬较细的椰毛，位于接近地面的灌丛或树上。 · 地理分布 马来半岛、苏门答腊和婆罗洲。 蓬松的羽毛 颈背灰色 赤褐色尾羽 地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 鹎科	学名 <i>Hypsipetes leucocephalus</i>	身长 23 厘米
黑短脚鹎(Black Bulbul) 羽毛蓬松，灵敏而喧闹，栖息于橡树、松树和杜鹃花生长的山林中，以浆果和大型水果为食，仅在夏季时栖息在高海拔区。 · 巢 草、叶和苔藓筑成，整洁而不坚固的杯状巢，位于树枝分叉处。 · 地理分布 印度半岛、中国和东南亚部分地区，北部种群冬季迁徙到南方过冬。 · 附注 有数个差异明显的地理亚种，图中为喜马拉雅亚种。 蓬松的黑冠羽 以敏捷的长翅飞行 脚足红色 尾端分叉 地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙

科名 和平鸟科	学名 <i>Aegithina tiphia</i>	身长 14 厘米
---------	----------------------------	----------


黑翅雀鹀(Common lora)

活跃在雨林和农场中，体形小，成对出现，有时混群觅食叶丛中的昆虫和毛虫。炫耀时，雄鸟张开尾羽和胁羽跃飞入空中，再滑翔回自己的栖枝上。

- 巢 植物筑成的整洁杯状巢，上覆蛛丝网，位于嫩枝的分叉处。
- 地理分布 印度、东南亚、婆罗洲和爪哇。

雌鸟

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 和平鸟科	学名 <i>Chloropsis hardwickii</i>	身长 19 厘米
---------	---------------------------------	----------

橙腹木叶鸟(Orange-billied Leafbird)

成对或成小群在高空活动，栖息在山地森林中较高的树冠叶丛中。常加入混合食群，一起飞到花朵盛开的树林，捕食昆虫和蜘蛛，并用特殊的刷状舌尖吸取花蜜。

- 巢 由树根和纤维构成的摇篮状巢，悬于靠近树枝末端的嫩枝间。
- 地理分布 从喜马拉雅山脉东部、中国南部延伸到马来半岛。

雌鸟

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 和平鸟科	学名 <i>Irena puella</i>	身长 27 厘米
---------	------------------------	----------


亚洲和平鸟(Asian Fairy Bluebird)

常出现在落叶和常绿林中，伴随着悠扬而有节奏感的鸣声，集小群取食大树顶部的果实。

- 巢 有苔藓的杯状巢，内衬细根，位于树上嫩枝分叉处的基部。
- 地理分布 印度西南、喜马拉雅山东部经亚洲东南到婆罗洲和爪哇。

雌鸟

地理分布图


羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 伯劳科	学名 <i>Eurocephalus anguitimens</i>	身长 24 厘米
--------	------------------------------------	----------

南方白顶林鸺(Southern White-crowned Shrike)

群性极强，常成对或以小群集体出现。栖息于树林、热带或亚热带草地的树顶，或向外伸出的枝条上，与其他伯劳一样从栖木飞到地上捕食昆虫和小生物，也以浆果为食。飞行疾速而呈直线，扇翅幅度小而快。

- 巢 由植物筑成厚壁的杯状巢，以蛛丝网连结，位于树上。
- 地理分布 南非的部分地区。




羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 伯劳科	学名 <i>Corvinella melanoleuca</i>	身长 45 厘米
--------	----------------------------------	----------

白肩长尾鸺伯劳(Magpie-shrike)

具有长而细的黑色尾羽，出没在相思树属树林、灌丛等空旷的半干旱树林中，群性强，常组成 12 只以上的喧闹群体。取食时从栖息的树林或灌丛的顶端跃飞到地面，捕捉昆虫和小爬虫。

- 巢 由嫩枝、草茎和根筑成大而笨重的杯状巢，内衬细根、茎和藤蔓植物的卷须，位于树上。
- 地理分布 非洲的东部和南部，从肯尼亚到莫桑比克。
- 附注 也称长尾伯劳，活动于旷野，长尾为其繁殖期炫耀的特征。



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 伯劳科	学名 <i>Prionops plumatus</i>	身长 20 厘米
--------	-----------------------------	----------

白盔林鸮(White Helmet-shrike)

群居性强，常与他种鸟类形成多达 20 只的鸟群。捕食生活于树冠到地面各层的昆虫和蜘蛛，栖息时，整群排成一起挤在树枝上。

- 巢 树皮碎片构成的结实杯状巢，用蜘蛛丝连结，位于树枝分叉处。
- 地理分布 撒哈拉以南的非洲地区。



地理分布图




羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 伯劳科	学名 <i>Tchagra senegala</i>	身长 22 厘米
--------	----------------------------	----------

黑头红翅伯劳(Black-crowned Tchagra)


常单只或成对活动，捕食地面或靠近地面的无脊椎动物及小生物。以振翼飞行的方式在灌丛间低飞，总是先从灌木丛上鸣叫着起飞，然后向下滑翔。

- 巢 嫩枝和根筑的浅杯状巢，内衬以细根，位于灌木丛中。
- 地理分布 非洲西北部、撒哈拉以南的非洲部分地区、阿拉伯半岛西南部。



地理分布图




羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 伯劳科	学名 <i>Laniarius atrococcineus</i>	身长 23 厘米
--------	-----------------------------------	----------

绯红胸黑伯劳(Crimson-breasted Gonolek)

色彩鲜艳，行踪隐秘，生活于空旷的树林，捕食地面或树上的昆虫。鸣声响亮如铃，配对时以二重唱的方式一齐鸣叫。

- 巢 树皮筑成的碗状巢，以蜘蛛网捆牢，内衬纤维，位于树上。
- 地理分布 非洲南部的部分地区。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 伯劳科	学名 <i>Telephorus zeylonus</i>	身长 23 厘米
南非丛林伯劳(Bokmakierie) 栖息于河边和有岩石的山坡灌丛、花园中的显眼地方，捕食下层林木中的昆虫和小生物。配对时，以二重唱的方式鸣叫，鸣声终年不绝。 · 巢 由嫩枝和茎筑成粗大的碗状巢，位于密灌丛中。 · 地理分布 非洲南部地区。 亚成鸟 配对鸟在灌丛顶部鸣叫 典型的二重唱姿势 地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙

科名 伯劳科	学名 <i>Lanius collurio</i>	身长 18 厘米
红背伯劳(Red-backed Shrike) 类似肉食鸟类的鸣禽，出没在灌丛中，在有利地形观察和袭击昆虫，有时捕食鸟类和其他小生物。 · 巢 草根筑成的深杯状巢，位于浓密的灌丛中。 · 地理分布 在不列颠群岛东南到西伯利亚西部地区繁殖，冬季南迁远达南非。 黑色的过眼线 机警的直立姿势 背部全部为赤褐色 雌鸟 地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所    	迁徙 迁徙



科名 伯劳科	学名 <i>Lanius ludovicianus</i>	身长 22 厘米			
呆头伯劳(Loggerhead Shrike) 栖息于稀树林地和旷野，在可瞭望的栖枝间作短距离飞行，俯冲到地面捕食昆虫等猎物。 · 巢 由嫩枝、草茎和细根筑成密实杯状巢，位于浓密的灌丛或矮树上。 · 地理分布 加拿大南部到墨西哥，北部种群迁徙到南方。 黑色的过眼线 钩喙 亚成鸟 黑色的翅膀 地理分布图 <tr><td>羽色 雌雄相似</td><td>栖所   </td><td>迁徙 迁徙</td></tr>			羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 迁徙
羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 迁徙			



科名 钩嘴鹀科	学名 <i>Schetba rufa</i>	身长 20 厘米	
赤褐钩嘴鹀(Rufous Vanga) 栖息于雨林，常见 4~8 只组成纪律严格的家族群，捕食不活跃。在捕获猎物前，常花很长的时间观察，以各种昆虫为食，也捕食蜥蜴。 · 巢 尚无纪录。 · 地理分布 马达加斯加岛。 · 附注 仅在马达加斯加发现的鸟类。 羽毛具金属光泽 赤褐色的背部和翅膀 雌鸟 地理分布图 <tr><td>羽色 雌雄不同</td><td>栖所 </td><td>迁徙 不迁徙</td></tr>	羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙	

科名 连雀科	学名 <i>Bombycilla garrulus</i>	身长 20 厘米			
太平鸟(Bohemian Waxwing) 通常生活在北方森林中，以浆果和昆虫为食。有时会例外地出现在城镇和花园里。 · 巢 位于针叶树枝上的杯状巢，常常隐藏在浓密的叶簇里。 · 地理分布 在加拿大、美国西北和欧亚北部繁殖，度冬的南部界线每年都有变化。 耸立的冠羽 次级飞羽末端具光滑的斑块 亚成鸟 地理分布图 <tr><td>羽色 雌雄略有不同</td><td>栖所 </td><td>迁徙 迁徙</td></tr>			羽色 雌雄略有不同	栖所 	迁徙 迁徙
羽色 雌雄略有不同	栖所 	迁徙 迁徙			

科名 连雀科	学名 <i>Bombycilla cedrorum</i>	身长 18厘米	
雪松太平鸟(Cedar Waxwing) 羽色比北方的太平鸟浅，栖息地包括阔叶林、针叶林、稀树林以及灌丛，变化较大。以各种小型水果为食，或从树林上空滑翔下来捕食昆虫。 · 巢 坚固的杯状巢，常位于树冠的上部，隐藏在浓密的叶簇里。 · 地理分布 在加拿大和美国繁殖，冬季分布区域南移，从加拿大南部到南美北部。 过眼线在眼下方向弯曲 次级飞羽尖端的蜡斑 亚成鸟 地理分布图 <tr><td>羽色 雌雄略有不同</td><td>栖所 </td><td>迁徙 迁徙</td></tr>	羽色 雌雄略有不同	栖所 	迁徙 迁徙
羽色 雌雄略有不同	栖所 	迁徙 迁徙	

科名 连雀科	学名 <i>Phainopepla nitens</i>	身长 20 厘米
亮丝鹀(Phainopepla) 繁殖于半沙漠或沙漠的河岸地区，以槲寄生树和鼠李的浆果为食，也捕食昆虫，飞行轻快呈直线。 · 巢 由植物纤维筑成，以小嫩枝加以固定的隐蔽杯状巢。 · 地理分布 繁殖于美国西南部和墨西哥西部，在墨西哥过冬。  尖耸的冠羽 雌鸟 翅膀下覆盖住白斑，飞行时露出  地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙

科名 河鸟科	学名 <i>Cinclus cinclus</i>	身长 18 厘米
河鸟(Dipper) 在山区湍急的溪流中生活和筑巢，以步行甚至潜水的方式，找寻昆虫幼虫和甲壳动物等猎物。时常潜水，河鸟之名因此而来。 · 巢 大而呈球形，从侧面开口，在流动的水面上由苔藓、草和树叶筑成。 · 地理分布 主要分布在欧亚大陆及非洲西北部的山区和丘陵地。  身体结实而呈流线形 尾羽短而硬  地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙

科名 鹪鹩科	学名 <i>Campylorhynchus brunneicapillus</i>	身长 22 厘米
棕曲嘴鹪鹩(Cactus Wren) 生活于干旱地带，常站在仙人掌顶部鸣叫，捕食地面的昆虫和无脊椎动物，以拍翅作缓慢的短程飞行。 · 巢 位于仙人掌或多刺的灌丛中，由干枯的植物筑成，侧面有入口的球形巢。 · 地理分布 美国西南部和墨西哥。  身体结实 复杂的羽斑 仙人掌顶部  地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 鹟鹛科	学名 <i>Donacobius atricapillus</i>	身长 23 厘米
黑顶嘲鸫(Black - capped Donacobius) 栖息于沼泽中，以昆虫为食。常隐藏于植物里，受到骚扰时，会飞到显眼的树枝上，勇敢地叱责入侵者。求偶炫耀时，成对的鸟各自上下晃动头部、摇动尾巴并一齐鸣叫。 · 巢 位于略高于水面的叶丛中，由沼泽植物筑成深而结实结构。 · 地理分布 从巴拿马东部到阿根廷东北部。 · 附注 全世界最大的鹟鹛。 正专心 注视 的眼睛 结实而 有力的喙 机警 的姿势 腿极长 腿部的羽毛 炫耀时， 长尾用力摇动 地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 鹟鹛科	学名 <i>Cinnycerthia unirufa</i>	身长 18 厘米
棕鹟鹛(Rufous Wren) 栖息于潮湿，多苔的雨林、森林边缘和浓密的树林中。常以家族或小群活动，有时独立地在下层叶簇中捕食昆虫，也会加入混合鸟群中。配对鸟一齐进行“二重唱”式的鸣叫，声音响亮，音调似长笛。 · 巢 尚无记录。 · 地理分布 分布于委内瑞拉到秘鲁的安第斯山脉，海拔 3800 米的高度，分布区气候温和。 · 附注 大多为赤褐色，有些头羽的颜色较浅。 头羽浅色型 穿梭在荆棘和植物间而磨损的尾羽 适于跳跃的长腿 地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙

科名 鹪鹩科	学名 <i>Thryomanes bewickii</i>	身长 13 厘米
--------	-------------------------------	----------

苇鹪鹩(Bewick's Wren)

体型小，具有赤褐色或灰棕色羽毛，眼睛上方有一条狭长的过眼线。在丛林下层捕食昆虫时，尾巴会向两侧摇动。

- 巢 粗大而深的杯状巢，由植物、羽毛和羊毛筑成，位于裂缝或巢箱中。
- 地理分布 在美国的大部分地区和墨西哥北部繁殖，冬季时，北方种群在此范围内迁徙到南方。

喙纤细

赤褐色型

尾部常向两侧摇动

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 鹪鹩科	学名 <i>Thryothorus ludovicianus</i>	身长 14.5 厘米
--------	------------------------------------	------------

皇苇鹪鹩(Carolina Wren)

体型中等，藏匿于丛林下层捕食昆虫。栖息地包括花园、树林、农田和灌木丛。鸣声为悠扬的短音，变化无穷，全年都能听得到。

- 巢 由树叶、草和羽毛筑成，结构坚固，大多位于洞穴、灌木丛或裂缝中。
- 地理分布 美国东部和墨西哥。

此上方较长的过眼线

上翘的尾羽

蹲伏的姿势

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 鹪鹩科	学名 <i>Troglodytes troglodytes</i>	身长 8 厘米
--------	-----------------------------------	---------

鹪鹩(Northern Wren)

喙纤细，生活习惯隐秘，在森林、树林、农场、草地和花园里，常忙碌地在纠结的植被里寻找昆虫。虽然体形小巧，但其爆发式的鸣声十分响亮。

- 巢 由树叶、草和苔藓筑成的圆顶巢，位于裂缝或隐秘处。
- 地理分布 在北半球的温带区分布广泛。

头部较大

尾短

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 鹪鹩科	学名 <i>Troglodytes aedon</i>	身长 12 厘米
--------	-----------------------------	----------

莺鹪鹩(House Wren)

数量丰富且分布广泛，出没在花园、果园、农场、空旷的树林和林缘。常隐蔽在植被里，不易被发现，但鸣声时常可闻，以昆虫为食。

- 巢 苔藓和嫩枝筑成的圆顶形巢，开口在侧面，位于树洞中、断裂树枝上或巢箱中。
- 地理分布 美洲。




鸣叫时
喙完全
张开

翅膀
短圆

短尾



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 岩鹪科	学名 <i>Prunella collaris</i>	身长 18 厘米
--------	-----------------------------	----------

岩鹪(Alpine Accentor)

外形不显眼的地栖鸟类，在阿尔卑斯山草地的岩石地区繁殖。夏季捕食小昆虫，冬季改食水果和种子，并迁徙到较低处。

- 巢 草、根、苔藓和地衣筑成的杯状巢，位于岩缝中。
- 地理分布 非洲西北部、欧洲南部和亚洲部分的山区。




背部具条纹

笨重
的体形

蹲伏
姿势



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 岩鹪科	学名 <i>Prunella modularis</i>	身长 14 厘米
--------	------------------------------	----------

林岩鹪(Dunnock)


纤小而带条纹的鸟类，大多在地面取食。常飞上栖枝发出平静、重复、单调的鸣声。夏季食昆虫，冬季则以种子为主食。

- 巢 草和苔藓筑成的杯状巢，由较细的纤维作衬垫，位于树篱或灌木丛中。
- 地理分布 欧洲和中东的部分地区。




肩部和喉部的
灰斑

蹲伏的
姿势



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 嘲鸫科	学名 <i>Dumetella carolinensis</i>	身长 22 厘米
--------	----------------------------------	----------

灰猫嘲鸫(Grey Catbird)

行动诡秘，是浓密的落叶林中常见的鸟类，也常出现在花园和城镇公园里，躲在低处，以浆果、种子、昆虫和无脊椎动物为食。降落时发出似猫的“喵呜”声，因此得名。

· 尾常翘起

· 巢 嫩枝筑成的杯状巢，以细根衬底，位于灌木丛或缠结的下层丛林中。

· 地理分布 繁殖于加拿大南部和美国，冬季在美国东南、加勒比海、巴拿马以北的中美洲越冬。

· 附注 与近缘的小嘲鸫均能模仿其他鸟类的鸣声，但音调平，变化少，不像小嘲鸫那样能重复一段短音节。




黑色冠羽

灰色的体羽



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 嘲鸫科	学名 <i>Mimus polyglottos</i>	身长 25 厘米
--------	-----------------------------	----------

小嘲鸫(Northern Mockingbird)

胆大，喧闹，具侵略性。在花园、有浓密灌丛的树林中及半干旱地区栖息、繁殖，也喜欢生活在有人之处。能记住以前听过的短音，熟练地重复摹仿，加入鸣声中。以水果、浆果和昆虫为食。

· 巢 枯枝筑成的杯状巢，以细根、草、树叶和植物作衬里，置于灌丛和密林里较低树枝上。

· 地理分布 美国的部分地区和墨西哥，北部种群冬季在此范围内南迁。

· 附注 因摹仿其他鸟类的鸣声而得名。



长尾

白色翼斑


长腿便于在地面取食



地理分布图




亚成鸟


羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------


科名 嘲鸫科	学名 <i>Toxostoma rufum</i>	身长 29厘米
褐矢嘲鸫(Brown Thrasher) 体形较大，生活在丛林下层，常躲在浓密的树丛和树林边栖息。以其强壮的喙轻轻翻转树叶，惊起或找出昆虫吃。 · 巢 嫩枝筑成的杯状巢，衬以细软的材料，置于灌木丛或浓密纷乱的下层丛林中。 · 地理分布 繁殖于加拿大南部、中部及美国东部，在美国东南越冬。 · 附注 常在隐藏处鸣叫，每个短音仅重复两次。		
黄色眼睛， 不同于鸫亚科 鸟类的灰眼睛 强壮的腿 善于在 地面上跑跳 尾羽 尖端较圆 地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙

科名 嘲鸫科	学名 <i>Toxostoma curvirostre</i>	身长 28 厘米
弯嘴矢嘲鸫 (Curve-billed Thrasher) 外形和鹀亚科鸟类相似，生活于干旱地区和沙漠的灌木丛中，沿河岸和峡谷分布。常单独或成对，在显眼的枝条上观察或找寻地面上的食物，彼此间以短而尖锐的鸣声保持联系，喙纤细而呈弓形，适于在落叶堆刺探昆虫，有时也采食果子。 · 巢 由嫩枝筑成的杯状巢，衬以毛发，置于仙人掌或灌木丛中。 · 地理分布 美国西南内陆及墨西哥。 · 附注 比小嘲鸫和猫嘲鸫更具野性，避开人群居住，鸣声响亮，叫声复杂而悠扬，不摹仿其他鸟类鸣声。		
羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙


科名 鹡科	学名 <i>Chaetops frenatus</i>	身长 24 厘米
棕岩鹡(Rufous Rockjumper) 能在岩石表面快速奔跑，搜捕昆虫和蜥蜴，鸣声似笛声般，只出没在布满岩石的山坡上。 · 巢 粗糙的草、灯心草、地衣和枝干筑成的杯状巢，内衬细根和毛发，位于靠近岩石的地面上。 · 地理分布 南非。 警戒时的姿势 长尾用于维持平衡 适合在砾石间跳动的腿  雌鸟   地理分布图 		
羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 不迁徙

科名 鹂科	学名 <i>Drymodes superciliaris</i>	身长 22 厘米
眉纹鹂(Northern Scrub-robin) 体型细长，生性胆怯，很难在阴暗的雨林环境中发现它，在地面上以弹跳的方式移动前进，搜寻昆虫时尾羽上翘。鸣声似响亮的尖哨声，当鸣声被模仿时，会自己重复鸣叫多次。 · 巢 在地上扒压成圆坑，随便衬上一些柔韧的植物卷须、纤维和树叶。 · 地理分布 新几内亚和昆士兰东北部的澳大利亚地区。		
羽色柔和适于伪装 适于地面取食的长腿 长尾时常翘起  雌鸟   地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 鸚科	学名 <i>Erithacus rubecula</i>	身长 14 厘米
欧亚鸚(Eurasian Robin) 雌雄都有保护巢域的行为，整个冬季都会站在显眼的枝头上，鸣唱并炫耀红色胸部。欧洲西部型性情温顺，东部型则为胆怯的林地鸟。以地面的蠕虫和昆虫为食。 · 巢 苔藓和树叶筑成的大型巢，内衬毛发，位在石缝中。 · 地理分布 欧亚大陆到西伯利亚西部、非洲北部和中东，东部种群冬季南迁。  警戒姿势  亚成鸟  地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 部分迁徙

科名 鸫科	学名 <i>Luscinia megarhynchos</i>	身长 16.5 厘米
新疆歌鸫(Nightingale) 素净的红棕羽色，行为谨慎，鸣声悠扬悦耳多变化。栖息在林地和林木下层，取食昆虫、浆果和果实。 · 巢 枯叶筑成的厚杯状巢，内衬细草和毛发，位于灌丛中靠近地面处。 · 地理分布 繁殖于欧洲的部分地区、非洲北部、中东和亚洲中部，在非洲和阿拉伯半岛越冬。 双翅呈流线形 大眼 尾部纯栗色 亚成鸟 地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙

科名 鸫科	学名 <i>Luscinia calliope</i>	身长 15 厘米
红点颏(Siberian Rubythroat) 体型与欧亚鸫类似，但腿更长更强健，羽色也有很大的差异。在浓密的针叶林中繁殖，以地面上的无脊椎动物为食。 · 巢 具部分圆顶的杯状巢，用植物纤维和茎干筑成，位于地面上。 · 地理分布 繁殖于西伯利亚，在亚洲的热带地区越冬。 尾常在背上方轻摇 地栖性鸟类敏捷的腿 雌鸟 地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙

科名 鸫科	学名 <i>Luscinia svecica</i>	身长 14 厘米
蓝点颏(Bluethroat) 典型的鸫鸟，不躲藏，只在低矮植被中潜行。于森林、林喙与柳树灌丛中繁殖，以昆虫为食。 · 巢 杯状巢，位于植被茂密的地面上。 · 地理分布 在欧亚大陆和阿拉斯加繁殖，冬季移栖至非洲和亚洲。 · 附注 喉斑和胸斑有地理差异。 常展开尾羽轻摇 欧洲北部型具栗色喉斑 雌鸟 地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙

科名 鹟科	学名 <i>Sialia currucoides</i>	身长 18 厘米
-------	------------------------------	----------

山蓝鸲(Mountain Bluebird)

唯一一种非栗色的北美蓝鸲，夏季栖息在海拔 1500 米以上的开阔草地，冬季常群集到低地游荡，翱翔中捕食，也在地面上啄食昆虫。

- 巢 以植物筑成松散的杯状巢，位于树洞或巢箱中。
- 地理分布 繁殖于北美洲西部，冬季南迁到墨西哥。

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所 — ▲	迁徙 迁徙
---------	--------	-------

科名 鹟科	学名 <i>Saxicola torquata</i>	身长 13 厘米
-------	-----------------------------	----------

黑喉鸲(Common Stonechat)

体态丰满，面部黑色，鸣声尖厉粗鲁，听起来像是两块石头敲击的声音。栖息在开阔的石楠灌丛中，常停栖在灌丛的顶部，然后猛扑到地上捕食昆虫，偶尔也在空中捕食。

- 巢 植物筑成的松散杯状巢，具内衬，隐藏在地上或靠近地面的植被中。
- 地理分布 欧洲、中东和非洲，有些种群冬季南迁。

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所 —	迁徙 部分迁徙
---------	------	---------

科名 鹟科	学名 <i>Oenanthe oenanthe</i>	身长 15 厘米
-------	-----------------------------	----------

穗鹟(Northern Wheatear)

外表平庸，生活在裸地和开阔地带，以地面上的无脊椎动物为食，也能在空中飞捕昆虫。

- 巢 草和苔藓筑成的杯状巢，具内衬，位于洞穴中。
- 地理分布 在欧亚大陆和北美洲的北部繁殖，在非洲过冬。

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所 —	迁徙 迁徙
---------	------	-------

科名 鸚科

学名 *Enicurus ruficapillus*

身长 18 厘米

栗颈燕尾(Chestnut-naped Forktail)

生活于热带雨林的清澈溪流边，在溪中的石块上追赶昆虫，或在空中飞捕取食，生性谨慎，遇干扰时沿着河床移动。

· 巢 内衬植物纤维的深杯状巢，并在外突面上涂上一层泥。

· 地理分布 马来半岛、苏门答腊、婆罗洲。

· 附注 鸚科燕尾属鸟类共有 7 种，都生活于亚洲各地的山涧溪流，羽色鲜明，有明显叉状尾，在水中和岩石上活动，脚步非常稳健。

胸部羽毛呈鳞片状

腿强健而灵活



地理分布图



叉状尾



羽色 雌雄不同

栖所 

迁徙 不迁徙

科名 鸚科

学名 *Myiophonus caeruleus*

身长 32 厘米

紫啸鸫(Blue Whistling Thrush)

紫罗兰色体羽，羽缘银白，活动时全身闪闪发亮。能在流速很快的溪流中脚步稳健地移动，在岩石间跳跃，穿过悬崖峭壁间的沟壑、峡谷。成对生活于领地内，总是胆怯地藏身在山溪边的森林中，很少出现。以无脊椎动物和果实为生。

· 巢 以苔藓筑成杯状巢，常置于小洞旁边。

· 地理分布 在喜马拉雅山区的森林内，以及亚洲东部、东南部山区，远到爪哇。

银蓝色的羽尖闪闪发光

长翅，飞羽末端黑色



地理分布图



尾常呈扇形展开，并向两侧摆动

羽色 雌雄相似

栖所 

迁徙 不迁徙

科名 鸫科	学名 <i>Zoothera interpres</i>	身长 16 厘米
-------	------------------------------	----------

库氏地鸫(Chestnut-capped Thrush)

羽色丰富，但易受惊吓，生活于热带雨林中，躲在森林下层的林木上活动。不常鸣叫，若飞至树林中层则会炫耀鸣唱，鸣声变化多端，犹如精彩的乐曲。以果实，昆虫、蠕虫、蜗牛等无脊椎动物为食。

- 巢 杯状巢，筑于小树的枝桠分叉上。
- 地理分布 马来西亚、泰国、印尼和菲律宾的部分地区。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鸫科	学名 <i>Catharus guttatus</i>	身长 19 厘米
-------	-----------------------------	----------

隐士夜鸫(Hermit Thrush)

生活在北部森林和山地林区的夏候鸟，棕色的尾部十分特别，鸣声优美缓慢而抑扬顿挫，取食浆果和昆虫。

- 巢 植物和泥筑成大而结实的杯状巢，常位于针叶树下的地面上。
- 地理分布 繁殖于北美洲，南迁至危地马拉过冬。



地理分布图



山地型


羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 鸫科	学名 <i>Hylocichla mustelina</i>	身长 20 厘米
-------	--------------------------------	----------

黄褐森鸫(Wood Thrush)

鸣声悦耳动听，生活于森林中，觅食地面上的无脊椎动物，也取食树上的昆虫和果实。

- 巢 植物和泥组成的杯状巢，位于矮树上或森林下层。
- 地理分布 繁殖于加拿大、美国西部和新英格兰，在美国南部和中美洲度冬。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 鸫科	学名 <i>Turdus merula</i>	身长 24 厘米
-------	-------------------------	----------

黑鸫(Eurasian Blackbird)

雄鸟的纯黑羽色与橙色喙和眼环构成鲜明的对比，为人们所熟知的庭园鸟。常出现于欧洲分布区的草坪上，在东方分布区则生活于林边灌丛中，以爪翻抓树叶搜寻无脊椎动物为食，也吃果实。雄鸟会站在高处，发出乐曲般动听的鸣声。

- 巢 由植物和泥筑成的大型杯状巢，位于树上或灌丛里。
- 地理分布 欧洲、非洲北部和亚洲部分地区，某些种类冬季南迁，已引入大洋洲。



用粗钝的喙吃果实、搜捕昆虫

地理分布图

雌鸟

强健的腿能快速奔跑跳跃

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 鸫科	学名 <i>Turdus pilaris</i>	身长 25 厘米
-------	--------------------------	----------

田鸫(Fieldfare)

爱炫耀自己，常发出吵架般的喧闹声，繁殖季成小群生活于林区，冬季时大群游荡，常于开阔草地觅食无脊椎动物。秋冬两季，也食山楂、花楸等浆果，及苹果之类的落地果实。

- 巢 植物和泥组成坚实的杯状巢，内衬薄草，位于树上或灌丛里。
- 地理分布 欧亚大陆北部，于欧洲和亚洲西南部过冬。
- 附注 会向任何进入其领域者发出威吓。




头、颈和脸颊灰色

体型粗壮

强健的腿适于弹跳

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 鸫科	学名 <i>Turdus philomelos</i>	身长 23 厘米
-------	-----------------------------	----------

歌鸫(Song Thrush)

体腹斑点醒目，站立姿势笔直，在欧洲西北部的庭园和植被繁盛的公园里十分常见，为典型的林栖鸟类。取食无脊椎动物，在取食蜗牛时，会以石块作为砧板，将蜗牛壳摔破再吞食，也吃浆果。

- 巢 植物组成的杯状巢，内衬一层木浆或泥土，杯形光滑，位于树上或灌丛里。
- 地理分布 欧洲、非洲北部、中东和中亚，已引进大洋洲笼养和放养。



纤细的喙

直立姿势

胸腹部具斑点

腿长而细

脚环上有数字编号，表示这是一只人工饲养的小鸟

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 鸫科	学名 <i>Turdus viscivorus</i>	身长 28 厘米
-------	-----------------------------	----------

槲鸫(Mistle Thrush)

体型大，羽色浅，腹面有明显的斑点，较常在地面活动，有时栖于树上，成对或成家族群一起在开阔地域觅食无脊椎动物和树丛中的浆果。冬季会停栖在结果实的树上，独自或成对防御阻止其他鸫类入侵取食。飞行时的啁啾声十分刺耳，但鸣声大而清脆，由悦耳的短音构成。

- 巢 草和苔藓组成的杯状巢，通常置于枝桠分叉上，比其他鸟类巢位高。
- 地理分布 欧洲、非洲西北部、中东和亚洲中部，部分东部型槲鸫有南迁习性。
- 附注 在每年暴风雨来临的前一夜会站在树梢鸣叫，所以有时被称作“风暴鸟”。



强壮的喙

直立的炫耀姿势

长有力的腿

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 鸫科	学名 <i>Turdus migratorius</i>	身长 25 厘米
-------	------------------------------	----------

旅鸫(American Robin)

原栖息于森林中，现在乡镇公园和郊区花园也十分常见。是一种地面捕食鸟，可从地面拨出蠕虫并在树叶中搜寻昆虫和蜗牛，以及在果园内取食果实。早春可听到其短而悦耳动听的鸣唱。

- 巢 细枝、草和泥组成的大型巢，位置各不相同，从地面到树梢都有。
- 地理分布 加拿大、美国、墨西哥和危地马拉。
- 附注 在殖民地时期，因胸部红色而被称为“鸫”，但严格说来应属一种鸫类。




亚成鸟



地理分布图



韧性强的
跳跃腿

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 木鸫科	学名 <i>Cinclosoma ajax</i>	身长 23 厘米
--------	---------------------------	----------

新几内亚鹑鸫(Painted Quail - thrush)

很少离开地面，在热带森林的低地很难见到，细弱的啾鸣声十分独特，成对或集小群悠闲地漫游于浓荫处，寻觅昆虫。

- 巢 尚无记录，其近缘种类所筑敞开的杯状巢，位于地面低凹处。



不常使用的短翅

· 地理分布 新几内亚南部低地。

· 绿褐色体背是配合地面的伪装色



地理分布图



雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 木鸲科	学名 <i>Ptilorrhoa castanonota</i>	身长 23 厘米
栗鸲鸲 (Chestnut-backed Jewel-babbler) 生活于热带森林，成对或集成小群，在地面觅食昆虫等无脊椎动物。 · 巢 树边浅洞里的深杯状巢。 · 地理分布 新几内亚。  体色常被林荫遮掩 尾宽 翅短  地理分布图 		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 画眉科	学名 <i>Malacocincla malaccensis</i>	身长 13 厘米
短尾鸲鸲(Short-tailed Babbler) 典型的步行性画眉，从不离开林木下层地面，捕食甲虫和其他昆虫，叫声为刺耳的哨音紧接着颤鸣和啁啾声。 · 巢 由大片落叶遮挡住的地面巢。 · 地理分布 马来半岛、苏门答腊及婆罗洲等东南亚地区。  翅短圆 大脚紧抓栖木 尾短  地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙


科名 画眉科	学名 <i>Chamaea fasciata</i>	身长 16 厘米
鹪雀鹲(Wrentit) 尾羽翘起，个性活泼，生活于浓密的常绿阔叶灌丛及半干旱的浓密灌丛中，常只能听到鸣声。为强健的食虫鸟，在很小的领域中度过一生，雄鸟大声鸣叫炫耀自己。 · 巢 植物纤维、毛发和蜘蛛网筑成紧密的杯状巢，位于低灌丛内。 · 地理分布 美国西部的俄勒冈、加利福尼亚到墨西哥部分地区。  刺矛状尾部 体型纤小 浅黄色虹膜  地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 画眉科	学名 <i>Pomatostomus ruficeps</i>	身长 22 厘米
--------	---------------------------------	----------

栗冠弯嘴鹛(Chestnut-crowned Babbler)

体型修长，具长尾和纤细而前弯的喙，生活于开阔的灌丛、半沙漠和由澳大利亚无脉相思树形成的杂树林中。活泼好动，成小群取食低植被或地面的昆虫，见到人时会走避。常发出连续的啁啾声，受到刺激时声音更大。

- 巢 细枝筑成大的半球形巢，旁边有入口，内衬草或羊毛，位于树上。
- 地理分布 澳大利亚南部的内陆地区。



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 画眉科	学名 <i>Stachyris maculata</i>	身长 16.5 厘米
--------	------------------------------	------------

红腰穗鹛(Chestnut-rumped Babbler)

腿足强壮有力，能在低地热带雨林的下层林丛中攀爬，常集成小群，有时离开下层树冠到中层寻食，主食昆虫，也吃容易取食的小果子。体型虽小，但活泼而喧闹，鸣声由一连串的短音组成，常常接着发出啁啾声，鸣叫时鼓出喉部，露出颈部两侧的两块亮蓝色裸斑。

- 巢 以枯叶松散筑成的球状巢，位置稍高于地面，在枯叶和地面植物缠结处，仅有一则较可信的记录。
- 地理分布 马来半岛、苏门答腊和婆罗洲。



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 画眉科	学名 <i>Garrulax pectoralis</i>	身长 28 厘米
--------	-------------------------------	----------

黑领噪鹛 (Greater Necklaced Laughing - thrush)

好奇且好炫耀，常和他种噪鹛类生活在一起，成群结队在开阔地域穿梭，以大步跳跃的方式在林地上移动。取食昆虫、果实和草籽，频频以高亢刺耳的叫声相互对鸣。

- 巢 植物筑成的宽碟形巢，位于树上或灌丛中。
- 地理分布 从喜马拉雅东部，经中国南部到越南北部，已被引入夏威夷群岛。

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 画眉科	学名 <i>Garrulax ocellatus</i>	身长 33 厘米
--------	------------------------------	----------

眼纹噪鹛 (Spotted Laughing - thrush)

生活于山林灌丛中，体羽具小斑点，叫声嘈杂，胆大而好奇，随处可见。

成群在灌丛活动，组成混合食群环绕地面跳跃，寻食昆虫、草籽和果实。具有噪鹛特有的强健腿足，适于地栖。

- 巢 悬挂于灌丛或细枝桠分叉处，由细枝、竹叶等枯叶筑成的杯状巢，大而稀松，内衬细根。
- 地理分布 喜马拉雅山东部、缅甸北部和中国西南部。

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 画眉科	学名 <i>Leiothrix argenteauris</i>	身长 13 厘米
银耳相思鸟(Silver-eared Mesia) 产于山区灌丛或次生灌丛内，集成6~30只不等的群，在落叶堆里搜寻昆虫，并以啁啾声相互对鸣。 · 巢 由草、苔藓、地衣筑成杯状巢，内衬细树根。 · 地理分布 从喜马拉雅山东部和中国南部向南延伸至苏门答腊。 粗钝的喙 适于取食果实 和昆虫 腿足强健 雌鸟 地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 不迁徙

科名 画眉科	学名 <i>Minla cyanouroptera</i>	身长 15 厘米
蓝翅希鹛(Blue-winged Minla) 常由5~15只集成群，加入混合鸟群中在山林地区游荡，是敏捷的捕食者，在树叶上搜寻昆虫，也在飞行过程中捕食。 · 巢 竹叶和细树根筑成的杯状巢，经常包在苔藓里藏于灌丛中。 · 地理分布 从喜马拉雅山东部山区到马来半岛。 蓝色冠羽 深蓝色飞羽 地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙

科名 画眉科	学名 <i>Minla ignotincta</i>	身长 14 厘米
红尾希鹛(Red-tailed Minla) 生活在山丘地带的橡树林和杜鹃林中，捕食树梢的昆虫。 · 巢 苔藓筑的杯状巢，具内衬，位于高的枝叉上。 · 地理分布 从喜马拉雅山东部到越南北部山区。 翅宽圆 鲜明的白色眉斑 深黑色过眼线 停栖的姿态 地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙

科名 画眉科	学名 <i>Heterophasia capistrata</i>	身长 22 厘米
黑头奇鹛(Rufous Sibia) 活泼的小型画眉，生活在矮橡树林等山区林地的空旷地带，受到刺激时即竖起浓密蓬松的黑色冠羽。常像表演特技一样飞行，大多在树冠上部捕食昆虫，树上挂满果实时也出现于下层。 · 巢 苔藓筑成的杯状巢，位于枝末的分叉上。 · 地理分布 喜马拉雅山区。 冠羽倒伏 体型纤小灵敏 长尾 地理分布图		

羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 画眉科	学名 <i>Yuhina castaniceps</i>	身长 13 厘米
栗头凤鹛(Striated Yuhina) 喜表演特技，常 20~30 只集成一群，在粗大的枝叶间搜寻昆虫，偶尔取食浆果，取食时发出连续而紧凑的低鸣。 · 巢 由细草、苔藓、树根和叶子筑成杯状巢，和灌丛同色的冠羽位于土堤的洞内。 · 地理分布 从喜马拉雅东部、中国南部延伸到越南北部。 具斑纹的羽毛 喜马拉雅山亚种 地理分布图		

羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 画眉科	学名 <i>Yuhina flavicollis</i>	身长 13 厘米
黄颈凤鹛(Whiskered Yuhina) 具活动自如的尖耸冠羽和须毛，繁殖于山区林地中，在山脚或低地的树林中过冬。常以小群混入大群的画眉混合食群，以昆虫、蜘蛛和浆果为食，也取食花蜜。 · 巢 苔藓筑成的半球形巢或杯状巢，内衬细根，悬挂于细枝桠分叉处。 · 地理分布 从喜马拉雅山东部和中国南部直到越南北部。 竖起的冠羽 白色颈斑 尾端呈方形 地理分布图		

羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 文须雀科	学名 <i>Panurus biarmicus</i>	身长 16.5 厘米
---------	-----------------------------	------------

文须雀(Bearded Tit)

夏季食昆虫，冬季食种子，飞行在较低的芦苇上，速度极快，叫声为十分独特的“当”声，群集在芦苇中觅食。

- 巢 内衬芦苇绒毛的杯状巢，位于靠近地面的芦苇丛。
- 地理分布 块状分布于欧洲、亚洲到太平洋地区。

双眼距离较近，能精确瞄准猎物

紧握住支撑物的双脚

雌鸟

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 文须雀科	学名 <i>Paradoxornis heudei</i>	身长 18 厘米
---------	-------------------------------	----------

震旦鸦雀(Reed Parrotbill)

喙较粗短，栖息于湿地上，以芦苇茎内的昆虫为食，也食芦苇种子。

- 巢 位于水面的芦苇茎之间，深杯状的芦苇巢。
- 地理分布 亚洲东部。

翅短而圆

紧握茎干的脚

尾长

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 鹳莺科	学名 <i>Polioptila caerulea</i>	身长 12 厘米
--------	-------------------------------	----------

灰蓝鹳莺(Blue-grey Gnatcatcher)

身体细长，常在林寻食昆虫，集结大群迁徙。

- 巢 植物和蛛丝构成的杯状巢。
- 地理分布 美国、加拿大南部、墨西哥和古巴，北方种群在分布区的南部过冬。

雌鸟

长尾有平衡作用

地理分布图

雄鸟

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 莺科	学名 <i>Cettia Cetti</i>	身长 14 厘米
-------	------------------------	----------

宽尾树莺(Cetti's Warbler)

体型小而圆胖，常在芦苇丛外围和水边灌木丛观望、觅食昆虫，鸣声短而急促。

- 巢 由草构成的大型深杯状巢，筑于水边较低的植被中。
- 地理分布 欧洲部分地区，以及北非、中东和中亚；中东和中亚的种群冬季移栖到印度西北部。

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 莺科	学名 <i>Sphenoeacus afer</i>	身长 22 厘米
-------	----------------------------	----------

草莺(Cape Grassbird)

体型较大，栗、黑和浅黄三色条纹，在灌木丛和热带大草原栖息地有伪装的作用。常独自或成对活动，生性胆怯，受干扰时躲藏在草丛中，以地下或树洞的昆虫和蜘蛛为食。早晨常登上主干鸣叫或晒太阳。

- 巢 粗糙的草构成的杯状巢，内垫细草，筑于隐蔽的草丛中。
- 地理分布 津巴布韦、莫桑比克和南非的部分地区。

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 莺科	学名 <i>Locustella naevia</i>	身长 13 厘米
-------	-----------------------------	----------

黑斑蝗莺(Grasshopper Warbler)

雌鸟体型较长，筑巢季节常站在灌丛枝头，发出蝗虫似的颤鸣声。大多在矮树丛、荒地或湿地活动，以小昆虫为食。

- 巢 有铺垫的杯状巢，由草和树叶构成，隐蔽在浓密植被低洼处。
- 地理分布 从欧洲至中国西部都有繁殖，过冬时南迁至印度半岛北部和北非。

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 迁徙
---------	----	-------

科名 莺科	学名 <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	身长 13 厘米
-------	--------------------------------------	----------

水蒲苇莺(Sedge Warbler)

鸣声活泼而有节奏，混合了轻快、急促和模仿声，十分嘈杂；受到干扰时，不但不胆怯，还发出气势不弱的叫声。常见于芦苇丛边缘，以昆虫为食。

- 巢 又大又深的巢，筑于水边低矮植物的茎上。
- 地理分布 在欧洲和中亚繁殖，冬季移栖至南非的热带地区。



条纹状羽毛



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 莺科	学名 <i>Acrocephalus stentoreus</i>	身长 19 厘米
-------	-----------------------------------	----------

南大苇莺(Clamorous Reed Warbler)

体型比生长在北方的苇莺大，以昆虫为食，在灌丛沼泽、红树林以及芦苇丛中生活。分布区域广大，由非洲延伸到澳大利亚，鸣声嘹亮悦耳。

- 巢 大而精巧的杯状巢，由芦苇叶等巢材构成，内有铺衬，筑于靠近水面的芦苇茎之间。
- 地理分布 从非洲东北部经亚洲至新几内亚，有些种群有迁徙行为。



羽色 平淡



地理分布图



巢

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 莺科	学名 <i>Hippolais pallida</i>	身长 13 厘米
-------	-----------------------------	----------


草绿篱莺(Olivaceous Warbler)

捕昆虫时发出“雌——科”声，常在草原的刺灌丛等较空旷的地域中取食；鸣声极悦耳，大多在灌丛中繁殖。

- 巢 草、毛发和蜘蛛丝构成的杯状巢，筑在较低的灌丛或矮树上。
- 地理分布 繁殖区从波多黎各南部、西班牙、非洲北部至亚洲中部，过冬区位于非洲热带地区。



翅长



地理分布图


羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 莺科	学名 <i>Cisticola brunnescens</i>	身长 11 厘米
-------	---------------------------------	----------

淡顶云扇尾莺(Pale-crowned Cisticola)

具有显著的条纹和短尾，生活在潮湿草地，以蚂蚁和其他小昆虫为食；在繁殖季节，雄性会作俯冲式的飞行，并发出高亢的鸣声。

- 巢 以蜘蛛丝将青草缠绕而成的椭圆形巢，筑于稍高于地面处。
- 地理分布 撒哈拉以南的非洲地区块状分布。



地理分布图

白色条纹

短尾

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 莺科	学名 <i>Prinia gracilis</i>	身长 13 厘米
-------	---------------------------	----------

优雅鹪莺(Graceful Prinia)

栖息于灌丛，成对或三五成群在地面跳跃，或跃飞至空中捕捉昆虫，扇动翅膀时会发出清晰的响声。

- 巢 为圆顶或直立的椭圆袋状巢，侧面开口，由草和蜘蛛丝构成，筑在低矮植物上。
- 地理分布 从埃及、索马里经中东到印度。



地理分布图

浅色冠羽

尾逐渐变细

优雅活泼的停栖姿态


羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 莺科	学名 <i>Apalis thoracica</i>	身长 13 厘米
-------	----------------------------	----------

斑喉娇莺(Bar-throated Apalis)

羽色鲜明，栖息在小山坡的树林中，求偶时会发出“都梯”声，其他时间混群活动。常在林中各种高度寻找毛虫和成虫，不畏惧人类，生性极好奇。

- 巢 植物构成的长椭圆形巢，近顶部有一侧开口，位于灌木上。
- 地理分布 从肯尼亚向南延伸到南非。



地理分布图


长尾可平衡

喉部具灰黑色斑点

腿红色

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 莺科	学名 <i>Orthotomus sericeus</i>	身长 13.5 厘米
红头缝叶莺(Rufous-tailed Tailorbird) 在灌丛栖息，当其在林木下层中寻找昆虫时，尾部会翘起，十分特别。常沿着树枝快速奔跑追捕猎物，鸣声高亢而欢愉。 · 巢 先在树上大片树叶的边缘穿小孔，再以植物纤维和蜘蛛丝缝起，巢筑在二叶之间，呈杯状，内有衬垫。 · 地理分布 马来半岛、苏门答腊、婆罗洲和菲律宾西部的小岛。 羽冠 鲜明 尖喙可 穿透树叶 强而有力 的脚利于 抓握 尾常 翘起 地理分布图  羽色 雌雄相似 栖所  迁徙 不迁徙		

科名 莺科	学名 <i>Sylvietta whytii</i>	身长 10 厘米
红脸森莺(Red-faced Crombec) 羽色鲜艳，生活在林缘、开阔林地以及长有相思树属植物的热带草原。常在小树枝上连续跳跃，搜寻昆虫和小蜘蛛。 · 巢 草、树皮、植物卷须和蜘蛛丝缠绕而成的钱袋状巢，顶上有开口，内衬植物幼芽，悬挂在灌木或乔木的树枝上。 · 地理分布 非洲东部，从苏丹南部到莫桑比克北部。 尾极短 脚大而有力 地理分布图  羽色 雌雄相似 栖所    迁徙 不迁徙	 尾极短 脚大而有力 	

科名 莺科	学名 <i>Phylloscopus collybita</i>	身长 11 厘米
棕柳莺(Eurasian Chiffchaff) 栖息于开阔林地和灌丛上，体型小巧，呈暗绿色，鸣声为单调的“曲夫-缺夫”声，十分易于辨识。以矮树和灌丛上的昆虫为食。 · 巢 树叶、苔藓、羽毛、植物茎构成近似球形的巢，靠近地面。 · 地理分布 欧洲至非洲北部，于赤道以南的非洲和印度过冬。 过眼线模糊 西欧型 西伯利亚型 地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 迁徙

科名 莺科	学名 <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	身长 12 厘米
-------	-----------------------------------	----------

林柳莺(Wood Warbler)

较棕柳莺的羽色浅而黄，在树冠觅食和栖息，把巢筑在地面上。喜欢在无矮树丛的高树林里活动，鸣声颤抖，以昆虫为食。

- 巢 植物筑成的圆顶巢，位于地面。
- 地理分布 在欧洲繁殖，冬季移栖至非洲的赤道地区。



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 莺科	学名 <i>Seicercus montis</i>	身长 11.5 厘米
-------	----------------------------	------------

黄胸鹌莺(Yellow-breasted Warbler)

栖息在山地灌丛和林木已遭砍伐的地带，能从叶子下面啄食昆虫，鸣声为高亢而断续的抖音。

- 巢 草和苔藓筑成的圆顶巢，筑于岩石裂缝中。
- 地理分布 马来西亚南部、婆罗洲、苏门答腊、印尼的东部岛屿以及新几内亚和菲律宾西部。



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 莺科	学名 <i>Sylvia atricapilla</i>	身长 14 厘米
-------	------------------------------	----------

黑顶林莺(Blackcap)

常在高树上鸣叫，鸣声朝气蓬勃，羽色暗淡，以昆虫和浆果为食。

- 巢 草筑成的杯状巢，内衬毛发，位于林木下层的较低处。
- 地理分布 欧洲及北非，中东和亚洲中部部分地区。过冬区位于欧洲西南部至非洲的赤道地区。



地理分布图



雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 莺科	学名 <i>Sylvia communis</i>	身长 14 厘米
灰白喉林莺(Whitethroat) 栖息于灌丛和草原中，以昆虫和浆果为食，鸣叫时白色的喉部明显地震动，鸣声易于辨认。 · 巢 具内衬的杯状巢，由草构成，隐藏在灌丛中。 · 地理分布 在欧洲以及非洲北部、中东和亚洲中部繁殖，过冬区位于印度和非洲的热带地区。  翅羽棕红色 地理分布图		
羽色 雌雄略有不同	栖所 	迁徙 迁徙

科名 莺科	学名 <i>Sylvia rueppelli</i>	身长 14 厘米
鲁普氏林莺(Rueppell's Warbler) 停栖在岩石坡上浓密灌丛中，捕食昆虫，鸣声为“嗡嗡”、“嘎嘎”混合的短音。 · 巢 草茎构成的杯状巢，位于灌丛中。 · 地理分布 在希腊至以色列南部等地繁殖，在非洲东北部过冬。  黑色的头部和喉斑 体型粗壮 雌鸟 地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙

科名 莺科	学名 <i>Sylvia cantillans</i>	身长 12 厘米
亚高山林莺(Subalpine Warbler) 地中海地区普遍的种类，但常隐藏在开阔地区的浓密刺灌丛中或矮树丛里，极难发现。以昆虫、昆虫幼虫以及浆果为食。 · 巢 茎、草构成的杯状巢，内衬毛发和草，筑于灌丛低处。 · 地理分布 地中海，在中东和非洲北部过冬。  红色眼圈 西伯利亚型 外侧尾羽白色 地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 迁徙

科名 莺科	学名 <i>Sylvia undata</i>	身长 13 厘米
-------	-------------------------	----------

波纹林莺(Dartford Warbler)

大部分为留鸟，羽色鲜艳，在低矮的金雀花灌丛中度过严冬。春季的鸣声极为悦耳，食昆虫和蜘蛛。

- 巢 草、纤维材料构成的杯状巢，筑于低而浓密的荆棘里。
- 地理分布 欧洲西部和南部的部分地区与非洲西北部，在分布范围内有迁徙现象。

粗密的冠羽

尾长

林栖鸟的纤细体型

地理分布图

羽色 雌雄略有不同	栖所	迁徙 部分迁徙
-----------	----	---------

科名 莺科	学名 <i>Regulus regulus</i>	身长 9 厘米
-------	---------------------------	---------

戴菊鸟(Goldcrest)

栖息在混合林和针叶林中，时常隐蔽，冬季更为温顺，以昆虫和蜘蛛为食，叫声短而高亢。

- 巢 苔藓、草构成的吊床状巢，筑于针叶树的大树枝下。
- 地理分布 欧洲、非洲北部、亚洲直到日本，北方种群在分布范围的南部过冬。

羽冠竖立

体型丰满

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 莺科	学名 <i>Regulus satrapa</i>	身长 9 厘米
-------	---------------------------	---------

金冠戴菊(Golden-crowned Kinglet)

喜在高大针叶树上活动，鸣声微弱而尖，不易听见。北方种群冬季南迁，捕食低矮林层中的昆虫，因而易于发现。

- 巢 悬在针叶树的树枝下，苔藓和草筑成的深杯状巢，内衬羽毛。
- 地理分布 加拿大部分地区、美国、墨西哥和危地马拉的部分地区，有些种群在分布范围内南迁。

鲜明的白色眼纹

雌鸟

浅色翼斑

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 莺科	学名 <i>Regulus calendula</i>	身长 11 厘米
-------	-----------------------------	----------

红玉冠戴菊(Ruby-crowned Kinglet)

单只或成对不停地活动，觅食昆虫，振动双翅时会发出高亢的叫声。

- 巢 位于树上的球状巢，由苔藓筑成。
- 地理分布 繁殖于加拿大和美国西部，在美国南部、墨西哥和危地马拉过冬。



羽冠 鲜红

翅斑 雪白色

尾短 而宽



雌鸟



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 莺科	学名 <i>Leptopoecile sophiae</i>	身长 10 厘米
-------	--------------------------------	----------

花彩雀莺(White-browed Tit-warbler)

羽毛为较特别的深蓝和粉红色，栖息在山区低矮的桧木灌丛，以及河谷灌丛中。夏季成对或成小群，冬季则大群在灌丛中搜寻昆虫。

- 巢 由苔藓和动物毛发构成的圆顶巢，内衬羽毛，筑于灌丛中。
- 地理分布 印度、中国西南的喜马拉雅山区。



地理分布图



雌鸟



明显的白色条纹

羽毛混合 浅粉色和深蓝色

羽色 雌雄略有不同	栖所   	迁徙 不迁徙
-----------	--	--------

科名 鹟科	学名 <i>Muscicapa striata</i>	身长 14 厘米
-------	-----------------------------	----------

斑鹟(Spotted Flycatcher)

棕色，春季迁徙到林缘，典型的取食方式是先在树上观望，然后突然飞起，在空中捕捉昆虫后又回到原栖枝上。

- 巢 苔藓、纤维和蜘蛛丝构成的浅杯状巢，筑于爬藤、岩石裂缝、墙壁或树干上。
- 地理分布 繁殖于欧洲、非洲北部、中东和亚洲中部，冬季在非洲、中东和印度西北部过冬。



地理分布图



亚成鸟



大眼

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 鹟科	学名 <i>Ficedula hypoleuca</i>	身长 13 厘米
斑姬鹟(Pied Flycatcher) 春季迁徙至落叶林、果园或庭院中， 不像其他斑 那么隐蔽。栖息时，单 侧翅膀上扬，姿势非常特别。 · 巢 苔藓、树皮和细根捆成松散的杯 状巢，筑于树洞内。 · 地理分布 欧洲、非 洲西北和西伯利亚西南， 在非洲的热带地区过冬。  雌鸟  眼大 体型 丰满 尾开尾羽时会 露出白色尾缘  地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙

科名 鹟科	学名 <i>Ficedula strophilata</i>	身长 13 厘米
橙胸姬鹟(Rufous-gorgeted Flycatcher) 羽色灰蓝，栖息于山地混合林中，常见其单 只或成对活动，以飞捕昆虫为主。冬季山地 种群迁徙至低海拔的开阔地区过冬。 · 巢 筑于堤岸或树洞中，由细根、苔藓和细 纤维构成的松散杯状巢。 · 地理分布 从喜马拉雅的东部山 区至越南南部，冬季，部分种群 在分布范围内南迁。  大而深的眼睛 浅蓝 色额纹 棕红 色喉斑  地理分布图		
羽色 雌雄略有不同	栖所   	迁徙 部分迁徙

科名 鹟科	学名 <i>Ficedula parva</i>	身长 12 厘米
红喉鹟(Red-breasted Flycatcher) 体型极小，在山区低地的落叶林和混合林中繁 殖，隐在浓密的树叶中，以捕捉空中的昆虫 为食。冬季时栖息在林缘和灌丛等更为开 阔的地区。雄鸟的喉部为橙红色。 · 巢 位于腐朽的树洞内，细根、草茎和 苔藓筑成精巧的杯状巢，内衬毛发。 · 地理分布 由欧洲中部、东部经亚洲 到日本等地繁殖，冬季在印度、中国南 部和东南亚的部分地区过冬。  鸣叫时喉部振动  雌鸟  地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所    	迁徙 迁徙

科名 喷背鹟科	学名 <i>Batis capensis</i>	身长 12 厘米
---------	--------------------------	----------

海角喷背鹟(Cape Batis)

生活在森林中，取食昆虫和蜘蛛。雄鸟的胸部呈黑色，雌鸟为栗色；雄鸟在树冠上空飞翔时，会发出嘈杂的拍翅声来炫耀。

- 巢 植物筑成的杯状巢，以蜘蛛丝缚在枝干或枝叉处。
- 地理分布 非洲南部地区。

黑色颊斑

凝视的眼睛

嘴须有助于捕捉飞虫

雌鸟

尾短

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 细尾鹩莺科	学名 <i>Clytomyias insignis</i>	身长 15 厘米
----------	-------------------------------	----------

棕鹩莺(Orange-crowned Fairy-wren)

生活在潮湿的山地雨林中，只在低矮而浓密的林下植被中出没，因而很难被发现。以昆虫和蜘蛛为食，其羽色较浅，不同于其他鹩莺，常集成 4~12 只不等的小群；取食时，不停地发出高亢尖厉的鸣叫，与群体内的其他个体保持联系。

- 巢 尚无科学性记录。
- 地理分布 新几内亚。

长尾经常翘起

头较大

腿强健，适于跳行

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 细尾鹩莺科	学名 <i>Malurus melanocephalus</i>	身长 13 厘米
----------	----------------------------------	----------

红背细尾鹩莺(Red-backed Fairy-wren)

体型最小的鹩莺，栖息在热带和亚热带等树木稀少的开阔草原中。常集成小群，在地面上取食种子、昆虫和无脊椎动物。会根据食物供应情况，来决定迁移或是留在原来的栖息地中。

- 巢 以草筑成整洁的圆顶状巢，位于草丛或灌丛中。
- 地理分布 澳大利亚东部和北部。

红背羽

雌鸟

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 细尾鹩莺科	学名 <i>Malurus leucopterus</i>	身长 12 厘米
----------	-------------------------------	----------

蓝白细尾鹩莺(White-winged Fairy-wren)

栖息在干旱地带，以羽色艳丽的雄鸟、配偶的雌鸟和其他雄鸟群集生活，取食地面上昆虫为生。

- 巢 草和树皮筑成的圆顶巢，开口位于侧面，于覆盖隐蔽物的地面上。
- 地理分布 澳大利亚。

醒目的白色翼斑

适于在地面取食的长腿

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 细尾鹩莺科	学名 <i>Malurus splendens</i>	身长 14 厘米
----------	-----------------------------	----------

辉蓝细尾鹩莺(Splendid Fairy-wren)

栖息在靠近林缘的灌丛和草地中，小群在林木下层寻找种子和昆虫，在每个群体内有一只具蓝羽色的雄鸟。它们大多只在灌丛间短距离飞行。

- 巢 开口在侧面的蛋形巢，用草编成，位于灌丛中。
- 地理分布 澳大利亚。
- 附注 三个地理亚种的羽色各不相同。

辉蓝羽色

体型圆胖

翅短圆

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 细尾鹩莺科	学名 <i>Malurus pulcherrimus</i>	身长 14 厘米
----------	--------------------------------	----------

蓝胸细尾鹩莺(Blue-breasted Fairy-wren)

栖息在林地和灌木丛中，常以优势配偶鸟和帮手集成小群，无论取食、栖宿和筑巢都在一起。取食地面上的昆虫及其他小型无脊椎动物。

- 巢 开口在侧面的卵形巢，草编并以蜘蛛丝缠绕，内衬羽毛和落叶，位于低矮的灌丛中。
- 地理分布 澳大利亚西南部。

蓝色耳斑

翘起的尾长

白色腹部

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 刺嘴莺科	学名 <i>Dasyornis brachypterus</i>	身长 22 厘米
短翅刺莺(Eastern Bristlebird) 羽色为黄褐色，生活在灌丛中，取食地面上的种子和昆虫，常把长长的尾羽翘起，开展成扇形。 · 巢 开口在侧面的圆形巢，以粗草筑成并以嫩草编成通道，位于地面草丛中。 · 地理分布 澳大利亚东南部，从布里斯班到维多利亚东部的海岸。 · 附注 濒临绝种的鸟类。 很少使用短小的翅膀   地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 刺嘴莺科	学名 <i>Pycnoptilus floccosus</i>	身长 17 厘米
领航刺莺(Pilotbird) 当体型较大的华丽琴鸟(见 266 页)掀开落叶层，搜寻无脊椎动物时，体型小的领航刺莺就会紧随其后，分享美食，因而得到“领航”之名。性格非常地温顺，人们可以在一臂之隔的近距离观察它。 · 巢 大型凌乱的圆顶巢，开口在侧面，位于地面或堤岸上。 · 地理分布 澳大利亚东南部。 常上下摆动长尾  翅短圆 脚强健，适于在地面取食  地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 刺嘴莺科	学名 <i>Sericornis frontalis</i>	身长 11 厘米
白眉丝刺莺(White-browed Scrubwren) 羽色灰褐，生活于浓密的丛林中，在稍高于地面之处取食种子和昆虫，各地理种群的腹部斑点不同，羽色也不同。 · 巢 草编成的大型球状巢，开口在侧面，位于林木下的地面上。 · 地理分布 澳大利亚的南部和东部。  地理分布图 西南部型  昆士兰型 		
羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙

科名 刺嘴莺科	学名 <i>Acanthiza pusilla</i>	身长 10 厘米
---------	-----------------------------	----------

褐色刺嘴莺(Brown Thornbill)

具红色眼睛，以捕捉林木下层的昆虫为生，在各种类型的林地中生活，常成对或小群活动，很少在地面上取食。

- 巢 大而凌乱的蛋形巢，侧面开口，位于接近地面之处。
- 地理分布 南回归线以南的澳大利亚地区。



地理分布图



羽色 雌雄相似

栖所 

迁徙 不迁徙

科名 刺嘴莺科	学名 <i>Smicrornis brevirostris</i>	身长 9 厘米
---------	-----------------------------------	---------

褐色小嘴刺莺(Weebill)

具短喙，生活在树林中，性情温顺且好奇，喜欢徘徊在外部枝叶中，从叶面上捕捉昆虫，虽然体型小巧，但鸣声宏亮。

- 巢 植物茸毛、茎枝和草筑成整洁的圆顶状巢，入口似喷水孔，内衬羽毛，位于树木外部的高枝上。
- 地理分布 澳大利亚地区。



地理分布图



羽色 雌雄相似

栖所 

迁徙 不迁徙

科名 刺嘴莺科	学名 <i>Aphelocephala leucopsis</i>	身长 11 厘米
---------	-----------------------------------	----------

白脸刺莺(Southern Whiteface)

前额白色，在干燥而光秃的开阔地面取食种子、昆虫和其他无脊椎动物，常集成小群，并突然飞起。

- 巢 大而凌乱的草编球状巢，开口在侧面，位于灌丛的低处或树洞中。
- 地理分布 澳大利亚南半部的内陆地区。



地理分布图



羽色 雌雄相似

栖所 

迁徙 不迁徙

科名 王鹟科	学名 <i>Chasiempis sandwichensis</i>	身长 14 厘米
蚋鹟(Elepaio) 林栖鸟，在树冠中啄食，或从栖枝上飞起追捕昆虫为生。常停栖在枝头，尾羽高高翘起，性情大胆而好奇。 · 巢 以树蕨的叶片和地衣筑成小型杯状巢，并以蜘蛛丝绑在一起，位于灌丛中或低矮的树上。 · 地理分布 夏威夷群岛。 尾羽边缘呈白色 腹部白色  地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 王鹟科	学名 <i>Monarcha trivirgatus</i>	身长 15 厘米
镜斑王鹟(Spectacled Monarch) 在雨林中生活，因其分布区域不同，腹部羽色从纯白到金黄色，喜欢栖息在植被的低层，捕食昆虫和蜘蛛。 · 巢 植物纤维、叶脉和树皮筑成杯状巢，以苔藓装饰，位于枝桠分叉上。 · 地理分布 印尼东部、新几内亚，以及澳大利亚的东部和东北部。 喙基宽阔 胸部羽色随地理种群而不同 尾端白色  地理分布图  亚成鸟 		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 部分迁徙

科名 王鹟科	学名 <i>Machaerirhynchus flaviventer</i>	身长 13 厘米
船嘴鹟(Yellow-breasted Boatbill) 喙宽而平，搜寻枝叶间的小昆虫，或突然飞到空中追捕，栖息在雨林的树冠中，有时会与其他食虫鸟混合成群。 · 巢 以植物细枝筑成浅碟状巢，内衬植物纤维，位于树上高处。 · 地理分布 新几内亚和澳大利亚昆士兰东北部。 此处羽毛随地理种群不同而有差异 尾羽边缘白色  地理分布图 		
羽色 雌雄略有不同	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 王鹟科	学名 <i>Rhipidura leucophrys</i>	身长 20 厘米
--------	--------------------------------	----------

鹊鸂扇尾鹟(Willie Wagtail)

性情温顺，常把尾羽翘起并张开，在地面寻找昆虫和蜘蛛时，会摇晃身体并摆动尾巴，在开阔地带以短距离的快速奔跑捕食昆虫，有时也在空中飞捕。


- 巢 树皮、草和蜘蛛丝筑成的杯状巢，位于树木、建筑物或邮筒上。
- 地理分布 澳大利亚、新几内亚、摩鹿加群岛、所罗门群岛。



扇动尾羽以惊起昆虫

强健的腿适合地面寻食

地理分布图


羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 王鹟科	学名 <i>Rhipidura rufifrons</i>	身长 16 厘米
--------	-------------------------------	----------

棕额扇尾鹟(Rufous Fantail)

栖息在雨林和灌丛的中层，捕食时会把棕色尾羽翘起，张开呈扇形左右摇晃，惊起休息中的昆虫。


- 巢 草和蜘蛛丝筑成细密的杯状巢，巢的末端下垂，位于树枝分叉处。
- 地理分布 太平洋诸岛，新几内亚以及澳大利亚的东部和北部。



扇动尾羽以惊起昆虫

强健的腿适合地面寻食

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 鹟鹟科	学名 <i>Microeca fascians</i>	身长 14 厘米
--------	-----------------------------	----------

灰小鹟(Jacky Winter)

浅灰褐色，常在凉爽的黎明和黄昏时，追捕枝头和空中的昆虫，或猛飞到地上捕食无脊椎动物。总是成对或集小群活动，外形不醒目，但“佳科-温特”的鸣声很容易辨别。

- 巢 草和细根筑成的浅杯状巢，并以蜘蛛丝捆绑，内衬地衣，位于树木的水平高枝上。
- 地理分布 澳大利亚和新几内亚东南部的林地和草原。




浅色的眼纹

直立姿势

尾羽外缘白色

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 鸚鵡科	学名 <i>Petroica multicolor</i>	身长 12 厘米
---------------	--------------------------------------	-----------------

绯红鸚鵡(Scarlet Robin)

生活在森林和灌丛中，站在低矮的树枝上观察地上的无脊椎动物，并猛扑捕食。雄鸟炫耀猩红色胸部向配偶和竞争对手宣告自己的存在。

- **巢** 草、树皮、蜘蛛丝和地衣等筑成杯状巢，位于树枝浅凹中或分叉处。
- **地理分布** 澳大利亚、所罗门群岛、瓦努阿图、斐济和萨摩亚。
- **附注** 已发现 15 个亚种。



地理分布图



典型的立姿

雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所    	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鸚鵡科	学名 <i>Petroica macrocephela</i>	身长 13 厘米
---------------	--	-----------------

雀鸚鵡(Tomtit)

外形似鸚，生活在森林中，捕食树上和地面的昆虫，生性大胆而好奇，不惧怕人。

- **巢** 苔藓和羽毛筑成的杯状巢，位于树上。
- **地理分布** 新西兰。
- **附注** 斯奈尔群岛种群为黑色羽毛。



地理分布图



雌鸟

翼羽上的白色横斑

喉部的黄色横纹

羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鸚鵡科	学名 <i>Eopsaltria australis</i>	身长 16 厘米
---------------	---------------------------------------	-----------------

东黄鸚鵡(Eastern Yellow Robin)

体背灰色，体腹黄色，生活在森林的林木下层和灌丛中，从枝上飞扑捕食地面上的无脊椎动物，性情温顺，对接近领域的任何事物都很好奇。

- **巢** 树皮和草筑成的杯状巢，以蜘蛛丝捆绑，内衬细草叶，位于小树的树枝分叉处。
- **地理分布** 澳大利亚东部和东南部。



地理分布图

机警的眼神

腰羽黄色

羽色 雌雄相似	栖所    	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 厚头鹀科	学名 <i>Colluricincla harmonica</i>	身长 24 厘米
---------	-----------------------------------	----------

灰鸫鹀(Grey Shrike – thrush)

体型较大，喙呈钩状，性情温顺拘谨。生活在森林中，在林木下层和灌丛中捕食无脊椎动物和蜥蜴、雏鸟等小型脊椎动物，动作和伯劳一样敏捷。

· 巢 草和树皮筑成的杯状巢，位于稍高于地面的植被或缝隙中。

· 地理分布 澳大利亚及新几内亚部分区域。

· 附注 背部的褐斑随着地理种群而有所不同，西北部型的褐色斑最大，有些无褐斑。



地理分布图



西北部型

北部的褐色斑



东部型



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 厚头鹀科	学名 <i>Pitohui dichrous</i>	身长 23 厘米
---------	----------------------------	----------

黑头林鸫鹀(Hooded Pitohui)

体型较大，食果实，栖息在热带雨林和灌丛中，头、颈、胸、翼和尾呈黑色，其他部位为橙褐色，十分醒目。常成对或集小群活动，在林下植被或树冠中寻找浆果及更大型的果实吃。

· 巢 葡萄藤卷须筑成的杯状巢，内衬更细的卷须，位于靠近地面的灌丛中。

· 地理分布 新几内亚，包括印度尼西亚彭岛。



地理分布图

翅膀短圆

头、胸、颈为黑色



腿短而富弹性，善于在细枝跳跃

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 厚头啸鹛科	学名 <i>Pachycephala pectoralis</i>	身长 16 厘米
----------	-----------------------------------	----------

金厚头啸鹛(Golden Whistler)

栖息在雨林和灌丛中，以昆虫和浆果为食，鸣声为悦耳的哨音，结束鸣叫时发出像抽响鞭的声音。

- 巢 细枝、树皮、草和蜘蛛丝筑成的碗状巢，位于灌木的枝叉处。
- 地理分布 印尼和澳大利亚太平洋西南部岛屿。
- 附注 亚种间羽色不同。



头部粗壮


胸腹呈金黄色

典型的直立姿势

雌鸟



地理分布图

羽色 雌雄略有不同	栖所 	迁徙 部分迁徙
-----------	---	---------

科名 长尾山雀科	学名 <i>Aegithalos caudatus</i>	身长 14 厘米
----------	-------------------------------	----------

银喉长尾山雀(Long-tailed Tit)

性情活动好奇，行动敏捷，常聚成小群在树冠顶部游荡。找到昆虫和种子时，会发出细微的爆破音，平时的鸣声为弱而连续的“叽-叽-叽”声。


- 巢 苔藓、毛发和蜘蛛丝筑成的圆顶巢，开口在侧面，外部覆盖地衣，内衬羽毛，位于带刺的灌木丛中。
- 地理分布 欧亚大陆到日本。



北部型



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 长尾山雀科	学名 <i>Psaltiriparus minimus</i>	身长 11 厘米
----------	---------------------------------	----------

丛山雀(Bushtit)

常见于灌丛中，多在山腰活动，大多群栖在花园中。以昆虫和种子为食，某些地区的雄鸟具黑色耳斑，但尚无法确定是否为特有亚种的特征。

- 巢 以草和其他植物筑成非常精巧的编织巢，悬于树枝上。
- 地理分布 加拿大西部、美国西部、墨西哥西部以及危地马拉。




头顶较宽

强健的脚适于抓握


南部型



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 攀雀科	学名 <i>Remiz pendulinus</i>	身长 11 厘米
攀雀(Penduline Tit) 栖息在芦苇丛和灌丛中，生性活泼灵敏。夏季捕食昆虫，冬季以种子为食，往往花费数星期的时间筑巢。 · 巢 倒悬在矮树的枝端，由柳絮和绒羽制成。筑巢时，反复啄巢材使其黏结，具一个圆形巢室和垂直管状入口。 · 地理分布 欧洲东部和南部，经中东到西伯利亚、蒙古和中国部分地区。  巢的管状入口  地理分布图  亚成鸟 		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 部分迁徙

科名 攀雀科	学名 <i>Auriparus flaviceps</i>	身长 10 厘米
黄头金雀(Verdin) 尖锐的喙呈黑色，栖息在荒漠溪谷的灌木丛中，尤其喜欢在大片的牧豆树灌木丛中活动，行踪不易被发觉。常在细枝或树叶下面飞来飞去，捕食昆虫。非繁殖季节单独活动，亚成鸟无黄色头羽及褐色翼斑。 · 巢 以带刺的细枝筑成的球状巢，开口在侧面，位于灌木丛中或树下。 · 地理分布 美国南部和墨西哥北部。  头部大而圆  地理分布图  亚成鸟  尾羽通常不分岔 		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙

科名 山雀科	学名 <i>Parus atricapillus</i>	身长 14 厘米
小山雀(Black-capped Chickadee) 性情温顺活泼，叫声类似小鸡，常集成小群在树林、灌木丛和城郊庭园中活动。以昆虫、种子和浆果为食。繁殖季节成对活动，秋季集成嘈杂的小群，或与他种鸟类形成混合食群，喜欢在有向日葵或花生的农庄中觅食。 · 巢 植物茸毛、羽毛和毛发筑成的杯状巢，巢下垫有苔藓，位于枯树的树洞或巢箱中。 · 地理分布 加拿大南部和美国北部。  白色的外侧尾羽  地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙


科名 山雀科	学名 <i>Parus ater</i>	身长 11 厘米
--------	----------------------	----------

煤山雀(Coal Tit)

在树冠顶部觅食昆虫，却在地面上筑巢，出没在分布区内的林地中。

· 巢 苔藓筑成的杯状巢，位于树干、断裂树枝及土堤洞中。

· 地理分布 欧洲、非洲西北、中东、西伯利亚、东亚和中亚。



地理分布图



双颊和颈背呈白色

欧洲型



北非型

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 山雀科	学名 <i>Parus cristatus</i>	身长 11.5 厘米
--------	---------------------------	------------

凤头山雀(Crested Tit)

具长而尖的羽冠，鸣声轻柔，几乎全部栖息在针叶林中的树冠高处，所以不易发现其踪影。以松树叶簇中的昆虫、种子和浆果为食。

· 巢 在枯树上凿洞筑成杯状巢。

· 地理分布 从西班牙经欧洲到亚洲中部。



地理分布图



长而尖的羽冠

面部羽纹

短而强健的腿适于抓握

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 山雀科	学名 <i>Parus major</i>	身长 14 厘米
--------	-----------------------	----------

白颊山雀(Great Tit)

体型比其他山雀大而醒目，栖息在落叶林、混合林、农场、公园以及半开阔的地带，鸣声响亮且重复不断。以昆虫和果实为食，羽色具地域上的差异，某些亚洲种并无绿色或黄色体羽。

· 巢 草编杯状巢，位于树洞、墙洞或巢箱中。

· 地理分布 欧洲和非洲西北部，西伯利亚、亚洲中部、东部及东南部与印度半岛。



地理分布图



头和喙强大有力

黄色的腹部

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 山雀科	学名 <i>Parus caeruleus</i>	身长 11.5 厘米
--------	---------------------------	------------

青山雀(Blue Tit)

人们熟知的庭园鸟，在林地中也很常见，以昆虫、种子和果实为食。

- 巢 以苔藓、草和细枝筑成，衬草和羽毛，位于树洞、墙洞或巢箱中。
- 地理分布 欧洲，非洲北部和中东的部分地区。
- 附注 经常出现在庭院中寻食并利用巢箱。



• 头顶为蓝色

• 白色眉纹

• 翅和尾为蓝色



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 山雀科	学名 <i>Parus bicolor</i>	身长 16 厘米
--------	-------------------------	----------

簇山雀(Tufted Titmouse)

原栖息在林地、森林和灌丛中，但喜欢飞到能在冬季提供食物的庭园，成对或集小群活动，有时也加入混合食群，觅食昆虫、种子、果实和坚果。

- 巢 发毛、羊毛、树叶和草筑成的杯状巢，位于树洞、邮筒或巢箱中。
- 地理分布 加拿大东南部、美国东部及墨西哥东北部。



小而尖的羽冠

南部型

东部型



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所    	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鹟科	学名 <i>Tichodroma muraria</i>	身长 17 厘米
-------	------------------------------	----------

红翅旋壁雀(Wallcreeper)


一蹦一蹦地在石壁上攀爬，用长而弯的喙探到岩缝中觅食昆虫。

- 巢 位于岩缝中，以须根、草和苔藓筑成，内衬羊毛和毛发。
- 地理分布 从欧洲到亚洲东部。
- 附注 飞行时忽上忽下，像蝴蝶一样轻盈。



大片猩红色的翼斑

长爪便于攀爬石壁



地理分布图



雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 鸺科	学名 <i>Sitta europaea</i>	身长 14 厘米
-------	--------------------------	----------

茶腹鸺(Eurasian Nuthatch)

常沿着树枝或树干上下奔跑觅食昆虫，也吃些坚果，把坚果塞进树缝中，用喙凿开取食。

- 巢 树皮屑筑成的杯状巢，位于树洞内，常以泥巴封堵巢的入口，使孔径缩小。
- 地理分布 欧亚大陆。



短尾



地理分布图



西伯利亚型




羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鸺科	学名 <i>Sitta carolinensis</i>	身长 14 厘米
-------	------------------------------	----------

白胸鸺(White-breasted Nuthatch)

在落叶林和混合林中活动，能在各种角度的树干上，向上、向下或横向运动，捕食昆虫，也取食坚果，并用硬喙把果壳凿开，发出低沉而带有鼻音的呼哨啾鸣声。

- 巢 位于树洞中，内衬树皮屑以及柔软的材料。
- 地理分布 加拿大南部的部分地区、美国及墨西哥山区。



典型的倒立姿势

像锤子般的硬喙



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 小鸺科	学名 <i>Daphoenositta chrysoptera</i>	身长 12 厘米
--------	-------------------------------------	----------

杂色鸺(Varied Sittella)

性情活泼，喜群居，觅食树枝上的无脊椎动物。头、背及翅膀条纹的羽色因亚种的不同而有所差异。

- 巢 以虫茧、蜘蛛网、毛发和羊毛等筑成的杯状巢，并以树皮碎片加以伪装，位于树枝的垂直分叉处。
- 地理分布 澳大利亚和新几内亚的高原。



地理分布图



东部型






西北部型

羽色 雌雄略有不同	栖所     	迁徙 不迁徙
-----------	--	--------

科名 旋木雀科	学名 <i>Certhia familiaris</i>	身长 12 厘米
旋木雀(Common Treecreeper) 羽色灰褐，常在树干上疾速攀爬一小段距离后停住，用镊子般的喙在树皮裂缝中寻找蜘蛛和昆虫。栖息时，以硬而具刺的尾羽抵住树干以保持平衡，要攀爬另一棵树之前，先迅速降到低处。 · 巢 植物纤维编成的袋状巢，位于疏松的树皮、劈开的树干中或常春藤背后。 · 地理分布 欧洲西部及从欧洲东部到日本。		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙



科名 旋木雀科	学名 <i>Certhia americana</i>	身长 13 厘米
北美旋木雀(Brown Creeper) 与欧亚大陆的旋木雀类似，已能在树干上攀爬，栖息时用坚硬的尾羽抵住树干来平衡和支撑，常从下向上仔细检查每一棵树，搜寻树皮裂缝中的蜘蛛和昆虫。 · 巢 用植物纤维和树皮碎片筑成袋状巢，位于疏松的树皮、树干中或密常春藤后。 · 地理分布 加拿大西部和南部、美国、中美洲至尼加拉瓜的山地，北部种群到美国东南部和墨西哥北部过冬。		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 部分迁徙



科名 短嘴旋木雀科	学名 <i>Climacteris affinis</i>	身长 15 厘米
白眉短嘴旋木雀(White-browed Treecreeper) 虽然称为旋木雀，但也常在地面取食。爬树时不用尾羽支撑身体，在枝头停留的时间比在树干上的时间长，以蚂蚁为主食，总是单独或成对活动。 · 巢 位于接近地面的中空树干中，内衬兽毛和草。 · 地理分布 澳大利亚内陆地区。		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙



科名 啄花鸟科	学名 <i>Melanocharis versteri</i>	身长 14 厘米
---------	---------------------------------	----------

扇尾啄果鸟(Fan-tailed Berrypecker)

生性胆怯，栖息在雨林中，停在半空采摘林下植被的浆果，或在叶簇中搜捕昆虫。

- 巢 撕碎的蕨类筑的深杯状巢，外部饰以地衣，位于树枝分叉处或水平枝干上。
- 地理分布 新几内亚。



雌鸟



尾部的白斑在飞行时非常明显



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所    	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 啄花鸟科	学名 <i>Dicaeum hirundinaceum</i>	身长 11 厘米
---------	---------------------------------	----------

楔啄花鸟(Mistletoebird)

栖息在雨林、开阔森林和灌丛中，体型小巧，尾短，集群游荡生活，从一棵树飞到另一棵树上，在簇叶中寻找槲寄生植物的浆果(一种会黏在植物枝桠上发芽生长的种子)和花蜜、花瓣、昆虫。

- 巢 以植物茸毛和蜘蛛网筑成圆顶状巢，悬挂在树上。
- 地理分布 澳大利亚及印尼部分地区。



雌鸟



用尖喙衔浆果



地理分布图



长翅适于游荡飞行

羽色 雌雄不同	栖所    	迁徙 四处游荡
---------	---	---------

科名 啄花鸟科	学名 <i>Pardalotus punctatus</i>	身长 9 厘米
---------	--------------------------------	---------

斑啄果鸟(Spotted Pardalote)

羽色鲜艳，常单独或成对，在树冠顶部的簇叶中觅食昆虫，或躲在叶片下面捕食飞虫，捕食习性无规律可循。由于大多在树的顶部活动，因此人们通常只能听到鸣声。

- 巢 用树皮屑筑成圆顶状巢，位于凿在堤防上的管状洞穴尽头或在枯树干内。
- 地理分布 澳大利亚的东部和南部。



雌鸟



头顶具斑点



地理分布图



尾短

羽色 雌雄不同	栖所    	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 啄花鸟科	学名 <i>Pardalotus striatus</i>	身长 11 厘米
---------	-------------------------------	----------

黄端啄果鸟(Striated Pardalote)

性情活泼好奇，在树木的外部枝叶间捕捉昆虫，非繁殖季小群一起觅食，不停地发出短促的鸣声。

- 巢 以草和树皮筑成的圆顶状巢，内衬细软的材料，位于洞穴的尽头或树上的浅凹处。
- 地理分布 澳大利亚，塔斯马尼亚岛亚种冬季至澳大利亚大陆过冬。




白色翅纹






地理分布图







东南部型



东北部型

科名 太阳鸟科	学名 <i>Nectarinia violacea</i>	身长 17 厘米/13 厘米	
橙胸花蜜鸟(Orange-breasted Sunbird) 以细长的喙取食花蜜和小昆虫，栖息在石楠丛中，通常一处觅食地能集结一百多只鸟。 · 巢 以蜘蛛网将细根捆成蛋形巢，内衬绒毛，位于灌丛中。 · 地理分布 南非南部。 · 附注 雄鸟的长尾是最大的性别特征。  以脚爪抓握细枝采蜜  地理分布图  雌鸟 <tr><td>羽色 雌雄不同</td><td>栖所 </td><td>迁徙 不迁徙</td></tr>	羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙	

科名 太阳鸟科	学名 <i>Nectarinia senegalensis</i>	身长 14 厘米			
赤胸花蜜鸟(Scarlet-chested Sunbird) 雄鸟有闪亮的猩红色胸部，雌鸟则无，常群集于花朵盛开的树木周围，取食昆虫和花蜜，有时从一朵花上同时获得两种食物。 · 巢 以植物纤维和蜘蛛网筑成，有圆拱形顶部、走廊，以及一些像“胡须”般的饰物摇晃着，悬吊在细枝上，常离黄蜂的巢很近。 · 地理分布 非洲撒哈拉沙漠以南。  闪亮的冠羽和须毛  地理分布图  雌鸟 <tr><td>羽色 雌雄不同</td><td>栖所 </td><td>迁徙 不迁徙</td></tr>			羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙			

科名 太阳鸟科	学名 <i>Nectarinia famosa</i>	身长 25 厘米/15 厘米
---------	-----------------------------	----------------

孔雀石色花蜜鸟(Malachite Sunbird)

尾羽和喙都十分的细长，生性活泼、肆无忌惮，平时以喙探入花中取食花蜜，也会像鹰一样飞捕昆虫。常栖息在草原等开阔环境中，但已适应了山腰的灌丛及庭园中的栖息环境，领域性很强，会保卫花丛等觅食地，不许其他太阳鸟进入。繁殖季成对活动，其他时间单独活动，求偶时，雄鸟抖动翅膀，提起尾羽向雌鸟炫耀。无论躲在灌丛中或栖息在明显的枝头时都会鸣叫，鸣声混合了高亢的音节和快速尖叫。

- 巢 草和植物筑成的蛋形巢，以蜘蛛丝捆牢，内衬细软材料，位于灌丛的低处。
- 地理分布 从埃塞俄比亚到南非的分散山区。
- 附注 雄鸟的长尾是最大的性别特征。

体型结实

用于快速飞行的长翅

长尾用于炫耀

雌鸟

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 太阳鸟科	学名 <i>Nectarinia kilimensis</i>	身长 23 厘米/15 厘米
---------	---------------------------------	----------------

青铜花蜜鸟(Bronze Sunbird)

栖息在热带山区的林缘、灌丛以及开垦林地中，雄鸟为保卫领域，会凶猛地驱赶其他雄鸟，鸣声为响亮、悦耳的连续高音，以花蜜、昆虫和蜘蛛为食。

- 巢 草、花朵、地衣和树皮屑筑成的蛋形巢，以蜘蛛丝捆缚，位于灌丛中。
- 地理分布 扎伊尔东部、乌干达到莫桑比克的非洲东部山区。
- 附注 雄鸟因长尾与雌鸟的身长相差了 8 厘米。

弯曲的喙能够探入花中

羽毛在阳光下发出青铜色光泽

雌鸟的长尾在飞行时分外夺目

雌鸟

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 太阳鸟科	学名 <i>Aethopyga christinae</i>	身长 11 厘米
---------	--------------------------------	----------

叉尾太阳鸟(Fork-tailed Sunbird)

栖息在森林及林间空地上，常于树的高处，或花朵间窜来窜去，以在栖枝上取食花蜜为主，偶食昆虫，有时则飞在半空中取食。

· 巢 用草筑成并缚以蜘蛛丝的球状巢，位于树上。

· 地理分布 中国南部和越南北部。

地理分布图



羽色闪亮

雄鸟尾端呈尖叉状

雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 太阳鸟科	学名 <i>Arachnothera affinis</i>	身长 17 厘米
---------	--------------------------------	----------

灰胸捕蛛鸟(Grey-breasted Spiderhunter)

体格结实，尾短，长喙和身长很不成比例。栖息在热带雨林的树上及林木下层，以长喙捕捉蛛网上的蜘蛛、吸吮花蜜，或啄食种子为食。

· 巢 草茎筑成的杯状巢，以嫩蕨叶和小花朵装饰，悬挂在大叶片的背面。

· 地理分布 马来半岛、婆罗洲、苏门答腊、爪哇和巴厘岛。

地理分布图



在叶簇中暗橄榄绿的羽色为最佳保护色

胸部具条纹

短方形的尾

羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 绣眼鸟科	学名 <i>Zosterops palpebrosus</i>	身长 11 厘米
---------	---------------------------------	----------

灰腹绣眼鸟(Oriental White-eye)

常见它自在地栖息于开阔地、灌丛及林缘，大多成对或集小群活动，有时集成 30 只的大群。在枝叶的上层快速移动搜寻昆虫、花蜜和果实，并发出高亢的尖叫鸣声。

· 巢 细根、叶脉和茎干筑成的杯状巢，位于树上或竹丛中。

· 地理分布 印度半岛、中国南部以及东南亚的部分地区。


地理分布图



白眼圈

取食时双脚紧握枝干

羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 绣眼鸟科	学名 <i>Zosterops poliogaster</i>	身长 11 厘米
黄腹绣眼鸟(Broad-ringed White-eye) 栖息于山地雨林中，常集成大而嘈杂的群体，四处游荡，觅食昆虫和浆果。 · 巢 植物纤维和地衣筑成的深杯状巢，内衬更细的纤维，位于灌丛或小树上，有时悬在枝端。 · 地理分布 非洲东北部。		
 宽大的白色眼圈 翅端渐尖 脚强健，能像表演特技般地栖落  地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙

科名 吸蜜鸟科	学名 <i>Toxorhamphus poliopterus</i>	身长 13 厘米
灰翅弯嘴吸蜜鸟(Grey-winged Longbill) 栖息在山地雨林的边缘及次生林中，十分机警地在枝叶间飞窜，取食昆虫和花蜜。 · 巢 以绿色植物和蜘蛛丝筑成长袋状巢，并用白色的蜘蛛卵装饰，位于细长的树枝上。 · 地理分布 新几内亚。		
 适于捕捉昆虫及刺探花朵的喙  地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙

科名 吸蜜鸟科	学名 <i>Certhionyx pectoralis</i>	身长 14 厘米
横斑吸蜜鸟(Banded Honeyeater) 栖息在林地和水边植物中，在花朵盛开的树上觅食花蜜、昆虫和花朵，常集成嘈杂而具攻击性的群体。 · 巢 草和树皮筑成的杯状巢，以蜘蛛网捆绑，悬挂在树木和灌丛的外部枝叶上。 · 地理分布 澳大利亚北部。		
 亚成鸟  地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所    	迁徙 四处游荡

科名 吸蜜鸟科	学名 <i>Philemon corniculatus</i>	身长 37 厘米
---------	---------------------------------	----------

秃吮蜜鸟(Noisy Friarbird)

棕灰色的大型吸蜜鸟，喙上有一突起，黑色头部几乎完全裸露，多数时间都高高地停在树冠上，只有在发出喧闹鸣声或攻击他种鸟类时才能找到它，以浆果、大型水果、昆虫、花蜜和鸟蛋为食。

- 巢 由草和树枝筑成大型杯状巢，以蛛丝网捆绑，位于树木的外层高枝上。
- 地理分布 澳大利亚东部。




地理分布图



亚成鸟



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 吸蜜鸟科	学名 <i>Entomyzon cyanotis</i>	身长 32 厘米
---------	------------------------------	----------

蓝脸吸蜜鸟(Blue-faced Honeyeater)

体型较大，眼睛周围有裸露的蓝色皮肤，在稀树林和灌丛的枝干上取食昆虫、花蜜和水果，人为种植的香蕉也成为它的食物，有时在空中飞捕猎物。

- 巢 由粗糙的植物材料筑成大型的杯状巢，衬以柔软的巢材，位于树枝分叉上，有时也使用画眉或矿鸟的旧巢。
- 地理分布 新几内亚南部、澳大利亚北部和东部。
- 附注 与其他大型吸蜜鸟一样，对鸟类和人类都有攻击性。




地理分布图



亚成鸟



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 吸蜜鸟科	学名 <i>Lichenostomus penicillatus</i>	身长 18 厘米
---------	--------------------------------------	----------

白羽吸蜜鸟(White-plumed Honeyeater)

性情活跃，栖息在城镇花园和森林中，集小群在稀树林里，吸食花蜜和捕食小型无脊椎动物，求偶时会短距离振翼飞行，并发出似小鸡的“曲扣屋”鸣声。

- 巢 草筑成的杯状巢，内衬羽毛和毛发，以蜘蛛丝连结，悬于树上或灌丛中。
- 地理分布 澳大利亚。

耳边的白色羽簇

体型纤细

叉型尾

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 吸蜜鸟科	学名 <i>Phylidonyris novaehollandiae</i>	身长 18 厘米
---------	--	----------

黄翅澳吸蜜鸟(New Holland Honeyeater)

源于海岸地带，现今栖息在公园和庭院里。精力旺盛，成群游荡，聚集在花蜜丰富之处，也吃昆虫。

- 巢 由草和树枝筑成的杯状巢，以蜘蛛丝连结，有柔软内衬，位于灌丛或树林中。
- 地理分布 澳大利亚南部及西南部。

纯白色虹膜

鬃毛状羽毛

羽色斑驳

黄色斑纹

外侧尾羽为黄色

亚成鸟

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙/游荡
---------	----	-----------

科名 吸蜜鸟科	学名 <i>Anthornis melanura</i>	身长 20 厘米
---------	------------------------------	----------

钟吸蜜鸟(New Zealand Bellbird)

常见的森林鸟，流畅似钟声的鸣声终年可闻。常在开花的树上、林缘的果园中聚成一大群，取食花蜜、果实和昆虫。

- 巢 结构松散的杯状巢，由粗糙的材料筑成，内衬细草和羽毛，位于枝桠分叉处。
- 地理分布 新西兰。
- 附注 新西兰仅有三种吸蜜鸟。

脚大

地理分布图

羽色 雌雄略有不同	栖所	迁徙 不迁徙/游荡
-----------	----	-----------

科名 吸蜜鸟科	学名 <i>Melipotes ater</i>	身长 32 厘米
---------	--------------------------	----------

胡翁吸蜜鸟(Spangled Honeyeater)

生性安静，但因体型大且羽色鲜艳而十分引人注目，栖息在高山雨林的上层，行动迟缓，单独或成对活动，喙短而笨重，并没有吸蜜鸟所特有的刷状舌，因此主食浆果类的果实，偶尔捕食昆虫。鸣声为“粗特－粗特”声。黄色的面部垂肉在求偶炫耀中会变成红色，因栖息处人迹难至，所以对它了解较少。

- 巢 苔藓、树叶等植物筑成大型的杯状巢，结构松散，悬挂在树枝顶端。
- 地理分布 分布于新几内亚西部胡翁半岛的山区，海拔 1200 米到 3000 米处。

面颊的黄色垂肉

羽色 灰暗

大而有力的脚

长尾

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 吸蜜鸟科	学名 <i>Manorina flavigula</i>	身长 28 厘米
---------	------------------------------	----------

黄喉矿鸟(Yellow-throated Miner)

体型笨重，羽色灰褐，胸部和前额有深黄色斑纹。具群性，在种群内会帮忙照料雏鸟，集成小群生活，常栖息于稀树丛或旷野中，在取食地与栖息地之间游荡飞行，采食地面上的昆虫和种子，树上的浆果、水果，有时也吸取花蜜。具攻击性，在种群内经常吵闹，对他种鸟类很不友善，常整群飞起，将争食的鸟逐出领地，甚至在空中攻击入侵者。

- 巢 由草和嫩枝筑成疏松的杯状巢，内衬羊毛和羽毛，位于离地 6 米以上的树枝分叉上。
- 地理分布 澳大利亚部分地区。

喉部黄斑

强健的翅膀 利于飞行

强健的腿有助于地面取食

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 吸蜜鸟科	学名 <i>Anthochaera paradoxa</i>	身长 47 厘米
黄垂蜜鸟(Yellow Wattlebird) 最大的吸蜜鸟，体型细长，行动笨拙，两颊上悬挂着肉垂。鸟群会飞到桉树林、矮树丛中吸取花蜜，采食果园中的水果，也吃花园中的鸟饲料。喧闹而具攻击性，鸣声刺耳并带有喉音。 · 巢 嫩枝和树叶筑成的松散杯状巢，内衬绒毛和羽毛，位于高处的树枝分叉上。 · 地理分布 塔斯马尼亚岛。 长而渐尖的尾 地理分布图 双颊的肉垂 胸部有斑点 腹部黄斑 强壮的脚利于抓握树枝栖息 雌鸟 雄鸟 羽色 雌雄相似 栖所  迁徙 不迁徙		

科名 吸蜜鸟科	学名 <i>Promerops cafer</i>	身长 46 厘米/23 厘米
卡佛食蜜鸟(Sugarbird) 在石楠丛生的荒地上生活，除繁殖季节常单独或成对活动以外，多在取食地点集小群活动。取食山龙眼花的花蜜，花朵则为昆虫和蜘蛛外的补充食物。雄鸟栖落在花上显眼的位置鸣叫，向繁殖区域内的对手炫耀示威。 · 巢 嫩枝、草、欧洲蕨、根和松针筑成凌乱的杯状巢，内部整洁地衬以山龙眼的绒毛，位于枝桠分叉上或纠缠的灌木枝上。 · 地理分布 南非南部。 · 附注 雌雄两性都具有长尾，但雄鸟尾长 23 厘米，比雌鸟长得多。 腿短 黄色尾下覆羽 雄鸟的长尾用于在空中炫耀 山龙眼花 雌鸟 雄鸟 地理分布图 羽色 雌雄不同 栖所  迁徙 不迁徙		

科名 鹀科	学名 <i>Emberiza citrinella</i>	身长 16厘米
-------	-------------------------------	---------

黄鹀(Yellowhammer)

常在篱笆墙和农场里出没，雄鸟头部黄色，鸣声单调，取食地面上的昆虫和种子。

- 巢 草筑成的整洁杯状巢，衬以细材料，位于篱笆基部、低矮的灌丛中或地面上。
- 地理分布 欧洲、非洲西北的部分地区、亚洲中部。



雄鸟具黄色的头部



雌鸟




地理分布图



白色的外侧尾羽

羽色 雌雄不同

栖所 

迁徙 部分迁徙

科名 鹀科	学名 <i>Emberiza flaviventris</i>	身长 16厘米
-------	---------------------------------	---------

金胸鹀(Golden-breasted Bunting)

羽色明亮，栖息于旷野中，呈大波浪飞行，降落时会抖动尾巴，在地面取食种子和昆虫。繁殖季节过后，常和其他鹀类及金丝雀组成混合寻食鸟群。


- 巢 草和根筑成的浅杯状巢，衬细根，位于低矮灌丛或树上。
- 地理分布 撒哈拉以南的非洲开阔地区。



头部 黑白相间



雌鸟




地理分布图



白色的外侧尾羽

腿长

羽色 雌雄不同

栖所 

迁徙 不迁徙

科名 鹀科	学名 <i>Emberiza schoeniclus</i>	身长 15厘米
-------	--------------------------------	---------

芦鹀(Reed Bunting)

春季，雄鸟栖息于芦苇或灌丛的顶部，发出三个音节的鸣声；冬季则和其他食谷鸟组成混群，取食农场地面的种子和昆虫。

- 巢 草筑成的杯状巢，位于地上的植被里或灌丛中，通常靠近水面。
- 地理分布 繁殖于西欧到日本的欧亚大陆，部分种群冬天在欧洲南部、非洲北部、中东、中国北部和日本北部过冬。



白色颈羽



雌鸟




地理分布图



外侧尾羽白色

羽色 雌雄不同

栖所 

迁徙 部分迁徙

科名 鹀科	学名 <i>Calcarius ornatus</i>	身长 15 厘米
-------	-----------------------------	----------

栗领铁爪鹀(Chestnut-collared Longspur)

性情胆怯，在大草原上繁殖，以种子和昆虫为食。雄鸟飞行炫耀并发出婉转的鸣声来吸引雌鸟。

- 巢 草筑的杯状巢，位于洞中。
- 地理分布 北美洲中部，在南美和墨西哥过冬。
- 附注 鸟距指较长的后爪。



短尾

白色
外侧
羽毛



地理分布图



雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 鹀科	学名 <i>Plectrophenax nivalis</i>	身长 17 厘米
-------	---------------------------------	----------

雪鹀(Snow Bunting)


在冻原和偏远的南方山区繁殖，冬季集大群南迁或远离山区，停栖在近海地带，主食种子；夏季捕食昆虫。

- 巢 岩缝中的杯状巢。
- 地理分布 繁殖于北美洲北部和欧亚大陆，冬季南迁。
- 附注 雌鸟棕色，白色羽毛较少。



圆形头部

体形
结实



地理分布图



雄鸟冬羽

白色的
外侧尾羽


羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 鹀科	学名 <i>Passerella iliaca</i>	身长 18 厘米
-------	-----------------------------	----------

狐色带鹀(Fox Sparrow)

体型笨重，以林木下层的昆虫和种子为食，鸣声婉转似乐曲。


- 巢 灌丛或地面上的杯状巢。
- 地理分布 加拿大和美国西部，在加拿大西南和美国南部过冬。



头呈圆形

东部型具
棕红色羽斑

身体圆胖



地理分布图



西部型

羽色 雌雄相似	栖所    	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 鹀科	学名 <i>Melospiza melodia</i>	身长 16 厘米
歌带鹀(Song Sparrow) 鸣声高亢而悠扬，常出没于有灌木遮蔽的开阔地以及小河边的灌丛中，在地面取食种子和无脊椎动物。 · 巢 草和细枝筑成的杯状巢，位于水边灌丛中的地面。 · 地理分布 繁殖于从北极圈到墨西哥的北美洲地区，部分种群冬季南迁。		
西北部型 具条纹的羽饰 地理分布图 东部型 尾端钝圆		
羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 部分迁徙

科名 鹀科	学名 <i>Zenotrichia albicollis</i>	身长 17 厘米
白喉带鹀(White-throated Sparrow) 于林地或矮灌丛的地面取食种子和昆虫，也常到花园中取食。一年四季都能听到鸣笛般的鸣声。 · 巢 地面或灌丛中的杯状巢，内衬细草根。 · 地理分布 加拿大和美国东北部，在美国和墨西哥北部过冬。 · 附注 成鸟眼睛上方的黄色斑块由白色羽毛蜕变而成。		
头部条纹 弓背姿势 翼羽上的细纹 浅色体腹 亚成鸟 地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 部分迁徙

科名 鹀科	学名 <i>Junco hyemalis</i>	身长 16 厘米
白腹灯草鹀(Dark-eyed Junco) 在林缘或林中空地取食种子和昆虫，羽色有地理上的差异，大多具灰色体羽和深色头部，有些为棕色体羽、黑色头部。 · 巢 草织的杯状巢，位于灌丛中。 · 地理分布 繁殖于加拿大、美国北部地区及山区、墨西哥北部，北方种群南迁过冬。		
白翅型 青灰色型的雌鸟 体腹白色 地理分布图		
羽色 雌雄略有不同	栖所    	迁徙 部分迁徙

科名 鹀科	学名 <i>Spizella arborea</i>	身长 16 厘米
-------	----------------------------	----------


树雀鹀(American Tree Sparrow)

生活在灌丛遮蔽的宽阔地带，灰色胸部上带有黑色的斑点，冬天与其他地面取食鸟混群，取食种子和无脊椎动物。



地理分布图

- 巢 草和其他粗糙的植物组成的浅杯状巢，内衬羽毛，位于矮灌丛或地面。
- 地理分布 繁殖于阿拉斯加和加拿大北部，冬季南迁至美国的得克萨斯州过冬。



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 鹀科	学名 <i>Poospiza nigrorufa</i>	身长 15 厘米
-------	------------------------------	----------

棕黑歌鹀(Black-and-rufous Warbling Finch)

体型小而活跃，喙短，生活在广阔的灌丛中，也常到树木较稀疏的地区活动。常成对在地面或近地面处取食种子和昆虫，繁殖季节雄鸟会在一个比较醒目的地方鸣叫，炫耀栗色的脸部，宣告此处为它的领地。

- 巢 无详细的记录。
- 地理分布 巴西东北部的河谷盆地、巴拉圭东部、乌拉圭及阿根廷东北部。



地理分布图




羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鹀科	学名 <i>Sicalis flaveola</i>	身长 14 厘米
-------	----------------------------	----------

桔黄雀鹀(Saffron Finch)


生活在灌木或草地中，雄鸟黄色，羽毛浓密，前额部有深黄色斑纹，常成群在地面安静地取食小种子。

- 巢 筑于洞穴中，或利用其他生活在灌木或草地鸟类的旧巢。
- 地理分布 散布在南美洲，包括特立尼达岛，已引入巴拿马、牙买加和波多黎各等地。
- 附注 普遍的笼鸟。



地理分布图



羽色 雌雄略有不同	栖所 	迁徙 不迁徙
-----------	--	--------

科名 鹀科	学名 <i>Tiaris canora</i>	身长 11 厘米
古巴离草雀(Cuban Grassquit) 羽色艳丽，生活于开阔草地的灌丛边缘地区，常在地面上集群，觅食小种子，鸣声柔和、悦耳。 · 巢 草搭成的圆形巢，开口在侧面，位于灌丛或树下。 · 地理分布 古巴。已引入巴哈马群岛的新普罗维登斯群岛。 地理分布图 雌鸟		
羽色 雌雄不同	栖所    	迁徙 不迁徙

科名 鹀科	学名 <i>Geospiza fuliginosa</i>	身长 11 厘米
小地雀(Small Ground Finch) 三种地雀中体型最小的一种。性情胆小但活泼，以种子和昆虫为食，通常只在有限的岛屿范围内活动，有时和其他雀类混合成群。 · 巢 细枝、草及树皮筑成，结构松散，内衬地衣、羽毛及棉絮，位于灌丛及仙人掌上。 · 地理分布 厄瓜多尔西部的加拉帕戈斯群岛。 · 附注 为 14 种加拉帕戈斯雀类之一，在达尔文的进化论中曾提及此鸟，为适应特殊的食性而有不同的喙形。 地理分布图 雌鸟		
羽色 雌雄略有不同	栖所   	迁徙 不迁徙

科名 鹀科	学名 <i>Pipilo erythrophthalmus</i>	身长 22 厘米
棕胁唧鹀(Rufous-sided Towhee) 长尾，短腿，适于陆地生活，通常在有遮蔽或靠近遮蔽物的地面，觅食种子和昆虫。 · 巢 敞开的松散杯状巢，位于接近地面处。 · 地理分布 加拿大南部、美国、墨西哥，北方种群在分布区域的南部过冬。 · 附注 羽色有地理上的差异，雌鸟的羽色变化较大。 西部型的雌鸟		
羽色 雌雄不同	栖所    	迁徙 迁徙

科名 鹀科	学名 <i>Paroaria coronata</i>	身长 19 厘米
-------	-----------------------------	----------

红冠蜡嘴鹀(Red-crested Cardinal)

具有突显的鸟冠，鲜艳羽色，生性大胆、自信，且十分活跃。生活在树木稀少及有灌木生长的草原区，通常距水源很近。成对或一小群在地面觅食种籽，因鸣声悦耳多变，是很受欢迎的玩赏鸟。

- 巢 由小树根及草搭成整洁的杯状巢，位于灌丛及树林。
- 地理分布 玻利维亚东部、巴拉圭、乌拉圭、巴西南部及阿根廷北部，夏威夷群岛已有引进种群。



颈部白色

背部灰白色

地面捕食鸟的长腿



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鹀科	学名 <i>Catamblyrhynchus diadema</i>	身长 14 厘米
-------	------------------------------------	----------

绒顶雀(Plush-capped Finch)

因前额具有挺拔的金黄色羽冠而得名。常成对或在混合鸟群中觅食，主食昆虫和某些植物。在树林中下层的竹叶叶簇中，以短粗而结实的喙觅食。

- 巢 无详细的科学记载。
- 地理分布 从委内瑞拉北部延伸至阿根廷北部的安第斯山区。




头顶的绒羽

短腿



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鹀科	学名 <i>Spiza americana</i>	身长 16 厘米
-------	---------------------------	----------

美洲斯皮扎雀(Dickcissel)

因鸣声得名，具群性，成群结队迁徙，和麻雀一样在宽阔的草地觅食种子及昆虫。

- 巢 位于地面或靠近地面之处，为结构松散的杯状巢。
- 地理分布 在加拿大中部、美国东部与内陆地区繁殖，冬天分布在墨西哥南部及南美北部地区。




黄色眉纹

黑色羽斑

栗色覆羽

雌鸟



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 鹀科	学名 <i>Pheucticus ludovicianus</i>	身长 20 厘米
--------------	--	-----------------

玫胸白翅斑雀(Rose-breasted Grosbeak)

大嘴的树栖鸟，鸣声悦耳。经常出没于灌木丛和次生林中，取食昆虫、水果、种子、嫩芽及花。

- **巢** 位于树上，用树枝和草搭成结构疏松的杯状巢，具细软的内衬。
- **地理分布** 繁殖于落基山脉以东的北美地区，在中美洲、南美洲过冬。



飞翔时，白色翼斑十分显眼

冬鸟具黑色斑点

雌鸟



地理分布图



羽色 雌雄不同	栖所    	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 鹀科	学名 <i>Cardinalis cardinalis</i>	身长 22 厘米
--------------	--	-----------------

主红雀(Common Cardinal)

以艳丽生动的色彩，嘹亮悦耳的叫声而闻名，十分适应城郊花园内的生活。栖息于灌丛中，取食昆虫、水果和种子。雌雄两性几乎全年鸣唱。

- **巢** 位于稍高于地面的灌木丛中，以树枝、树叶搭成的粗糙杯状巢，内衬松树皮。
- **地理分布** 美国中部、东部和南部地区，以及墨西哥。



冠羽尖耸

面部黑色

粗喙

雄鸟全身红色

雌鸟



地理分布图



羽色 雌雄不同	栖所    	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鹀科	学名 <i>Saltator maximus</i>	身长 20 厘米
--------------	-----------------------------------	-----------------

黄喉舞雀(Buff-throated Saltator)

喙大而坚硬的林栖鸟，非常胆小，羽色平淡，常躲在灌丛或林缘矮树丛的叶簇中。在分布区内十分常见，单独或成对取食水果和昆虫。

- **巢** 筑于灌丛或矮树上，由粗糙的草、树枝及其他植物材料构成的杯状巢。
- **地理分布** 中美洲、南美洲的北部和东部。



白色眉纹

背部为鲜亮的橄榄色

地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所    	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鹀科	学名 <i>Passerina leclancherii</i>	身长 13 厘米
-------	----------------------------------	----------

橙胸彩鹀(Orange-breasted Bunting)

色彩绚丽，但性情胆怯，常只闻其声不见其影。居住于半干旱区且有灌木植被的山地边缘，在灌木枝叶、植物下方的地面或开阔地面上觅食种子和昆虫，即使是取食时也很少远离安全的隐蔽物。雄鸟在灌木的顶端鸣唱，声音清脆、震颤，曲调多变。

- 巢 尚无详细科学记载，其近缘的鸟类筑整洁的杯状巢，用草筑成，内衬嫩草和动物的毛发，位于灌木或矮树丛中。
- 地理分布 墨西哥西部的山麓和太平洋海岸。



地理分布图



翅端钝圆

天蓝色的尾部覆羽

体腹鲜黄色

雌鸟


羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鹀科	学名 <i>Passerina ciris</i>	身长 13 厘米
-------	---------------------------	----------

丽色彩鹀(Painted Bunting)

北美洲色彩最绚丽的鸟类，极为胆怯，除了正在鸣叫的雄鸟外，很难发现它的位置。以种子、昆虫及幼虫为食。

- 巢 筑于灌木或小树苗的树干中段，深而整洁的杯状巢，用树枝和草搭成，内衬松软的材料。
- 地理分布 繁殖于美国东南部和墨西哥，在中美洲、巴哈马群岛、古巴和牙买加过冬，也有某些种群在佛罗里达过冬。
- 附注 雌鸟和他种彩鹀的雌鸟外形相似，色彩单调，褐色条纹状的羽色提供了保护作用。



地理分布图



粗喙

体腹粉红色

雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 鹀科	学名 <i>Guiraca caerulea</i>	身长 17 厘米
-------	----------------------------	----------

褐斑翅蓝彩鹀(Blue Grosbeak)

森林的边缘很常见，喙大，能啄开种子坚硬的外壳，也取食小型的果实、昆虫和草籽，鸣声动人、悦耳。

- 巢 位于灌木或小树上，用树枝、草、草木根筑成紧密的杯状巢。
- 地理分布 美国和墨西哥北部，在美国南部、中美洲以及加勒比地区过冬。



黑色面颊

短尾

翅膀具栗色条纹

雌鸟



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 鹀科	学名 <i>Passerina cyanea</i>	身长 14 厘米
-------	----------------------------	----------

靛蓝彩鹀(Indigo Bunting)

夏季常出现在灌木丛和开阔林地中，以种子和昆虫为食。繁殖季雄鸟呈艳丽的深蓝色，常在树木或电线杆等高处鸣唱，鸣声重复，二声一度。

- 巢 筑于树上的杯状巢，内衬羽毛和嫩草。
- 地理分布 加拿大东南部和美国东部，冬季移栖至美国东南部、加勒比海诸岛及中美洲。
- 附注 鸣声为两拍和一拍的两个连续音阶，故称为“二声一度”。



喙小

覆羽颜色较深

尾羽呈V字型

雌鸟



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 唐纳雀科	学名 <i>Schistochlamys melanopis</i>	身长 17 厘米
---------	------------------------------------	----------

黑脸唐纳雀(Black-faced Tanager)

常成对或以家族的形式，出没在灌木和树木零散生长的开阔地带。生活于中等高度的林木中，取食浆果、种子、蚂蚁和昆虫，鸣声悦耳动听，性情温顺。

- 巢 置于低矮的林木上，开口较大，用草筑成的杯状巢。
- 地理分布 南美洲北部。




黑色的脸颊和喉部

体型纤细

全身皆为灰色

亚成鸟



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 唐纳雀科	学名 <i>Cissopis leveriana</i>	身长 27 厘米
---------	------------------------------	----------

鹊色唐纳雀(Magpie-tanager)

尾长，羽色鲜明、黑白相间，鸣声响亮似金属碰撞声，很容易辨识。广泛地分布在有草地散布其中的灌丛和林木区，或空旷的低洼地带，常成对或小群活动，喧闹且爱出风头。在林中各层均可取食，以树冠层的果实为主。

· 巢 隐蔽在浓密树林中，由小细枝和草构成，内衬嫩草的大型杯状巢。

· 地理分布 南美的热带地区。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 唐纳雀科	学名 <i>Rhodinocichla rosea</i>	身长 20 厘米
---------	-------------------------------	----------

鸫形唐纳雀(Rose-breasted Thrush-tanager)

栖息在枝叶交错的灌丛中，美丽而胆怯，很难发现。常单独或成对，在地面来回跳跃，掀开枯树叶边，寻找无脊椎动物为食。

· 巢 位于掩蔽物下，枝叶筑浅的杯状巢。

· 地理分布 墨西哥西部，以及从哥斯达黎加到哥伦比亚和委内瑞拉一带。



地理分布图



羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 唐纳雀科	学名 <i>Piranga olivacea</i>	身长 17 厘米
猩红比蓝雀(Scarlet Tanager) 栖息和进食都在树叶上，因此不常见。繁殖于落叶林，在热带雨林低地的树冠过冬，以昆虫和果实为食。 · 巢 树上的浅杯状巢。 · 地理分布 加拿大东南部和美国东部，冬季南迁至巴拿马和玻利维亚。  鲜红色体羽 翅膀 黑色 尾黑色  地理分布图  雌鸟		
羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 迁徙

科名 唐纳雀科	学名 <i>Piranga ludoviciana</i>	身长 17 厘米
黄腹比蓝雀(Western Tanager) 翅膀上的黄色条纹和宏亮的歌声，十分引人注目，通常独居，只有在迁移时才结成 30 只以上的群体。以昆虫为主食，夏末时也取食如浆果等的果实。 · 巢 高高地位于枞树或松树上，内衬细草的杯状巢。 · 地理分布 繁殖于加拿大西南部山区和美国西部地区，在美洲中部过冬。  地理分布图  头部在夏季呈桔红色 体腹黄色 腿短  雌鸟		
羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 迁徙



科名 唐纳雀科	学名 <i>Ramphocelus bresilius</i>	身长 18 厘米
巴西肿嘴雀(Brazilian Tanager) 啁啾不休，在森林边缘的灌丛中取食果实、种子和昆虫。 · 巢 位于矮树上或隐于沼泽地的草丛中，草制的杯状巢。 · 地理分布 巴西东南部和阿根廷东北部。  喙上具白斑 鲜亮的红色体羽 黑色翼羽呈圆弧形  地理分布图  雌鸟		
羽色 雌雄不同	栖所    	迁徙 不迁徙

科名 唐纳雀科	学名 <i>Thraupis sayaca</i>	身长 17 厘米
灰喉裸鼻雀(Sayaca Tanager) 生活在灌丛和开阔林地中，喜欢水边植被茂密的阴湿地区，停栖时常来回变换方向。主食果类，常光顾果园，使果农遭受重大的损失。 · 巢 隐蔽在小树丛中，密致的杯状巢。 · 地理分布 亚马孙平原以南的巴西、玻利维亚、巴拉圭、乌拉圭和阿根廷北部地区。 身体和头部呈灰色 淡蓝色翼羽和尾羽 地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙

科名 唐纳雀科	学名 <i>Anisognathus igniventris</i>	身长 16 厘米
朱腹岭裸鼻雀(Scarlet-bellied Mountain-tanager) 鸣声像铃铛一般，出没于安第斯山区丘陵的林地和灌丛中，及高海拔农场和放牧区。经常成对或成小群活动，以果肉、种子、树叶及树芽为食。 · 巢 位于树上或灌木丛中，用杂草筑成的杯状巢，内衬嫩草。 · 地理分布 从委内瑞拉到玻利维亚的安第斯山区。 鲜红色颊斑 蓝色肩斑 蓝色的尾部覆羽 唐纳雀典型的短腿 地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙

科名 唐纳雀科	学名 <i>Anisognathus somptuosus</i>	身长 17 厘米
蓝翅岭裸鼻雀(Blue-winged Mountain-tanager) 栖息于高山森林和次生林中，在树木的外层枝、树叶间穿梭，取食果实及搜捕昆虫。 · 巢 草制杯状巢，位于矮树中。 · 地理分布 从委内瑞拉到玻利维亚的安第斯森林中。 头顶黄色 肩羽蓝色 浅蓝色羽缘 体腹黄色 地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙

科名 唐纳雀科	学名 <i>Euphonia cyanocephala</i>	身长 10 厘米
金腰歌雀(Golden-rumped Euphonia) 生活在森林边缘树木的高处，以及砍伐后残存的树木上，以浆果为食。 · 巢 旁侧开口，由苔藓筑成的圆顶巢。 · 地理分布 从委内瑞拉至阿根廷西北部的安第斯地区、圭亚那高地、巴西东南部、巴拉圭东部及阿根廷东北部。		
 蓝色羽冠 金黄色腰羽 长翼 短尾 雌鸟  地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙


科名 唐纳雀科	学名 <i>Chlorophonia cyanea</i>	身长 11 厘米
蓝颈绿雀(Blue-naped Chlorophonia) 喙小而短粗，成对或成小群出现，常几乎不动地栖息于树上俯视。以槲寄生为主食，也采食其他果实及昆虫。 · 巢 位于垂直堤坎或突出峭崖的缝隙间，旁侧开口，以苔藓筑成圆形巢。 · 地理分布 散布于委内瑞拉至阿根廷北部。		
 蓝色眼环 背部蓝色 雌鸟 短尾  地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 唐纳雀科	学名 <i>Tangara seledon</i>	身长 13 厘米
绿头唐加拉雀(Green-headed Tanager) 典型的唐加拉雀属鸟类，唐加拉雀属依其而命名。集群生活，栖息在树冠顶部，经常和他种鸟群混杂在林地及灌丛中，觅食果子及昆虫。 · 巢 藏匿于树木及灌丛的浓密枝叶中，以草筑成的精致杯状巢。 · 地理分布 巴西东南部至阿根廷东北部。		
 颈背黄绿色 腰羽橙黄色 适于树栖的短腿  地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 唐纳雀科	学名 <i>Tangara schrankii</i>	身长 13 厘米
绿金唐加拉雀(Green-and-gold Tanager) 鲜艳的羽色是在树木上层枝条及叶簇中觅食昆虫和果实时，很好的保护色。 · 巢 位于小型棕榈科树木上的杯状巢。 · 地理分布 委内瑞拉低地及亚马孙河上游。  地理分布图  		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 唐纳雀科	学名 <i>Tangara arthus</i>	身长 13 厘米
金色唐加拉雀(Golden Tanager) 常见的热带雨林鸟，集小群采食果子，或在树上长青苔处捕食昆虫。炫耀时抬起头，垂下双翼，轻抬尾部，动作十分特别。 · 巢 无科学记载，仅知雌、雄鸟一起采集巢材，由雌鸟筑巢。 · 地理分布 委内瑞拉及玻利维亚境内的海岸地区及安第斯山区。  地理分布图  		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 唐纳雀科	学名 <i>Chlorophanes spiza</i>	身长 13 厘米
绿旋蜜雀(Green Honeycreeper) 身体细长，常在林中枝叶上用细长的喙吸取花蜜，并捕捉花瓣内的昆虫，也吃浆果。 · 巢 位于树上，由枯叶筑成的浅杯状巢。 · 地理分布 中美洲、安第斯山脉北部、亚马孙平原和巴西东部。  地理分布图   雌鸟 		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 唐纳雀科	学名 <i>Cyanerpes caeruleus</i>	身长 10 厘米
紫蓝旋蜜雀(Purple Honeycreeper) 常单独或成对，活泼地跳来跳去，用长而弯曲的喙吸取花蜜，或捕食叶簇中的昆虫、果实。栖息于花园、次生林等各种树木繁茂的栖息地中。 · 巢 位于树干或树枝末端小型杯状巢。 · 地理分布 巴拿马及南美北部的部分地区。		
 黑色羽翼 腿部黄色 雌鸟  地理分布图 		
羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 不迁徙 

科名 唐纳雀科	学名 <i>Diglossopsis cyanea</i>	身长 15 厘米
蒙面花鸟(Masked Flowerpiercer) 以带钩的喙尖将花冠管撕碎取食花蜜，也食昆虫及小浆果。常成对或家族群，生活在山区热带雨林里，接近树木生长线的地区，在低矮植物、及植被的中层移动和觅食，动作迅速，一刻也不休息。 · 巢 常位于灌木或小树上，以草及苔藓构成的杯状巢。 · 地理分布 从委内瑞拉北部一直到玻利维亚。		
 面具般黑羽毛 喙上细钩可以撕裂花管 腿细长  地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙

科名 蕉林莺科	学名 <i>Coereba flaveola</i>	身长 10 厘米
蕉森莺(Bananaquit) 体型娇小，活泼好动，在其分布区内十分常见，常单独或成对出现在树林或灌丛中，觅食浆果、花蜜和昆虫。 · 巢 类似蛋形的草球，入口在侧面，位于灌丛中或小树上，还会筑一种称为假巢或暂住巢的巢状结构。 · 地理分布 西印度群岛部分地区，墨西哥南部至阿根廷东北部。		
 白色眉纹 白色翼斑 短尾  地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙

科名 森莺科	学名 <i>Mniotilta varia</i>	身长 13 厘米	
黑白苔莺(Black-and-white Warbler) 栖息在森林及林地，和旋木雀(见 324 页)一样在树干或树枝缝隙及表面捕食昆虫。 · 巢 树旁地洞中的草制杯状巢。 · 地理分布 加拿大中部和东南部、美国的落基山以东地区。冬天在中美洲、南美洲或远至秘鲁越冬。  地理分布图  翼长而渐尖 雌鸟	羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙

科名 森莺科	学名 <i>Dendroica petechia</i>	身长 13 厘米
黄林莺(Yellow Warbler) 生活在紧临沼泽或水边的树林及灌丛中，以叶簇中的昆虫为食。 · 巢 位于靠近水边的灌丛中，小巧的杯状巢。 · 地理分布 加拿大、美国、中南美洲，有些北方种群冬季向南迁徙。		
羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 部分迁徙

科名 森莺科	学名 <i>Dendroica townsendi</i>	身长 13 厘米
黑脸黄眉林莺(Townsend's Warbler) 生活在针叶林中，常在树的高处活动，捕食小昆虫。 雄鸟喉部黑色，与雌鸟带条纹的黄色喉部明显不同。 · 巢 位于针叶树高处，以细杂草构成的杯状巢，内衬更细小的植物材料。 · 地理分布 繁殖于加拿大西部和美国西部，过冬在美国西部、中美洲、尼加拉瓜和哥斯达黎加等地。  地理分布图  黑色颊斑 黑色喉部 雌鸟		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙

科名 森莺科	学名 <i>Dendroica fusca</i>	身长 13 厘米
橙胸林莺(Blackburnian Warbler) 常于树顶觅食昆虫，繁殖于云杉林、冷杉林及橡树林等地，冬季在热带雨林中栖息。 · 巢 以草及树枝在针叶林中筑成的杯状巢。 · 地理分布 加拿大中部及东南、美国东部，冬天移至哥斯达黎加、秘鲁及西印度群岛。 地理分布图 雌鸟 白色翼斑 喉部红色		
羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 迁徙

科名 森莺科	学名 <i>Dendroica magnolia</i>	身长 13 厘米
黑纹胸林莺(Magnolia Warbler) 鸣声为有节奏的“乌啼-乌啼-乌啼”声，很容易识别。常在潮湿的针叶林中活动，取食树顶部叶面上的昆虫。雄鸟头部醒目的花纹，在冬季时会消失。 · 巢 位于小树的树枝上，由草枝筑成松散的杯状巢。 · 地理分布 加拿大及美国东北，冬季迁移至中美洲。 雌鸟 白色眉纹 白色羽缘 体腹上具黑色条纹 地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙

科名 森莺科	学名 <i>Dendroica coronata</i>	身长 14 厘米
黄腰白喉林莺(Yellow-rumped Warbler) 栖息于北方的森林、针叶林及混合林中，以昆虫为食。东部型(Myrtle Warbler)具白色喉部，西部开型(Audubon's Warbler)则为黄色喉部。 · 巢 杯状巢，内衬细草枝。 · 地理分布 中、北美洲，冬天迁移至美国的西部和南部，及西印度群岛、中美洲。 雌鸟 黄色羽冠 黄色腰羽 东部型 地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 迁徙

科名 森莺科	学名 <i>Setophaga ruticilla</i>	身长 13 厘米
--------	-------------------------------	----------

橙尾鸲莺(American Redstart)

林栖鸟，快速追捕昆虫时，耀眼的翼斑及尾斑时而闪现。

- 巢 位于小树及树苗叉处，巨大的杯状巢。
- 地理分布 加拿大及美国东部，冬季迁至西印度群岛、中美及南美北部。



地理分布图





尾侧有橙黄色长条

雌鸟



羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 森莺科	学名 <i>Seiurus aurocapillus</i>	身长 15 厘米
--------	--------------------------------	----------

橙顶杜鵑(Ovenbird)

羽色暗淡，生活于林区的浓密灌丛中，在地面上行走并从腐叶中找寻无脊椎动物为食。不怕生，常好奇地接近人类。

- 巢 由树叶、干草及草茎建成的圆形地面巢，内衬小树根。
- 地理分布 繁殖于加拿大南部及美国东部，冬季在佛罗里达、西印度群岛，甚至南迁至南美洲西北部越冬。



冠羽上的黑色条纹

白眼圈

地面取食鸟的长脚



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 森莺科	学名 <i>Geothlypis trichas</i>	身长 13 厘米
--------	------------------------------	----------

黄喉地莺(Common Yellowthroat)

行走时与鹪鹩一样尾羽上翘，生活在芦苇及高茎草丛中，也居住于灌丛及沼泽等茂密的植被中，以取食小昆虫为主。


- 巢 位于地面或接近地面，由片状树皮及草筑成的杯状巢，内衬较细的巢材。
- 地理分布 繁殖于加拿大南部、美国和墨西哥，冬季迁至美国南部、中美洲、哥伦比亚和委内瑞拉。



面具状的黑色羽毛

羽缘白色

尾端钝圆



地理分布图



雌鸟



羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 森莺科	学名 <i>Wilsonia citrina</i>	身长 13 厘米
---------------	-----------------------------------	-----------------

黑枕威尔逊森莺(Hooded Warbler)

生活在沼泽区的林地和灌丛地带，常藏匿在矮小的植物中。寻找昆虫时，会习惯性地轻轻振展尾羽。

- 巢 隐藏在地面上的浓密植被中，由草和树叶制成的杯状巢，内衬嫩草。
- 地理分布 美国东部，冬季迁至中美、哥伦比亚和委内瑞拉北部。




颈部像头巾一样的黑羽

雌鸟



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 森莺科	学名 <i>Icteria virens</i>	身长 19 厘米
---------------	---------------------------------	-----------------

黄胸巨鹏莺(Yellow-breasted Chat)

生活在灌木丛中，以昆虫及浆果为食，极为少见，仅在雄鸟作炫耀飞行，或在明显的栖息处鸣叫时可以见到。鸣声混合了啁啾声、嘎嘎声及口哨声。

- 巢 筑在灌丛低矮处，以草和枝做成的大型杯状巢，内衬细草。
- 地理分布 繁殖于加拿大南部及美国大部分地区，过冬在美国南部、中美洲等地或南至巴拿马。



眼周的白羽毛像戴眼镜般


白色的喉缘

身躯大而结实

尾长



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 管舌鸟科	学名 <i>Viridonia virens</i>	身长 11 厘米
----------------	-----------------------------------	-----------------

夏威夷绿雀(Common Amakihi)

夏威夷群岛中最常见的绿色旋蜜雀，能适应于不同类型的森林栖地，常在林中的干燥地带活动，以树的花蜜和昆虫为食。鸣声繁复，混合了颤音、柔和啾鸣，及有变化的细弱的“嗡嗡”声。不同岛间的雄鸟羽色差异较小，雌鸟则差异显著。

- 巢 位于蕨类或矮树上的小型杯状巢。
- 地理分布 夏威夷群岛。



细长的喙便于探入花瓣中

暗橄榄色翼羽



地理分布图

羽色 雌雄略有不同	栖所 	迁徙 不迁徙
-----------	--	--------

科名 管舌鸟科	学名 <i>Vestiaria coccinea</i>	身长 15 厘米
镰嘴管舌鸟(liwi) 体羽红色、翅和尾黑色、红喙尖而向下弯曲的食蜜鸟。常见于开花树木的上部，能在叶簇中藏得很隐蔽，行动缓慢、从容不迫。 · 巢 位于树上或灌木中，开放而松散的巢。 · 地理分布 夏威夷群岛。  地理分布图  飞行时可见翼内侧 的白色斑点		


羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------



科名 管舌鸟科	学名 <i>Palmeria dolei</i>	身长 18 厘米
冠旋蜜鸟(Crested Honeycreeper) 仅见于哈里卡拉山区的濒危鸟类，胆大而活跃，在树木和花丛顶端吸取花蜜，捕捉蠕虫和昆虫，会发出响亮的哨声。 · 巢 尚无科学记载。 · 地理分布 夏威夷群岛中毛伊岛上的哈莱阿卡拉山。  地理分布图  红色后 颈背 体羽上具 红、蓝斑点		

羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 绿鹎科	学名 <i>Cyclarhis gujanensis</i>	身长 15 厘米
棕眉胡椒鸟(Rufous-browed Peppershrike) 头大且喙坚实强壮，在树林中移动缓慢，常隐藏在浓密的叶簇中栖息，只能听到鸣声，以毛虫和昆虫为食。 · 巢 常悬于高处树枝的分叉处，巢壁很薄的草制杯状巢。 · 地理分布 从墨西哥东南部至巴拿马、南美洲阿根廷中部。  地理分布图  头部大而呈灰色 巴西北部型		

羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 绿鸫科	学名 <i>Vireolanius leucotis</i>	身长 15 厘米
灰顶绿鸫(Slaty-capped Shrike-vireo) 壮硕的森林鸟，喙结实而带钩。成对或集小群在森林的上部枝干与叶簇中活动，从容地觅食昆虫，即使在猎食时也不断鸣唱，但很难见到它的踪影。 · 巢 尚无科学记载。 · 地理分布 南美洲北部，南至玻利维亚北部。		
		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 绿鸫科	学名 <i>Vireo gilvus</i>	身长 14 厘米
歌绿鸫(Warbling Vireo) 不同于其他绿鸫的短促鸣声，歌绿鸫鸣唱悠扬而悦耳，因此得名。繁殖于开阔地和落叶林中，冬天移栖至热带雨林，以树木中上层间的昆虫为食。 · 巢 悬于树枝分叉处的篮状或杯状巢。 · 地理分布 繁殖于北美洲至墨西哥，在中美洲地区，或南至尼加拉瓜越冬。		
		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙

科名 绿鸫科	学名 <i>Vireo flavifrons</i>	身长 14 厘米
黄喉绿鸫(Yellow-throated Vireo) 具亮黄色眼斑和喉斑的大型绿鸫，常见于林缘和灌丛中。在树叶的中层搜寻昆虫为食，性温顺，不怕靠近观赏的人。 · 巢 悬在树枝上，以草及其他植物筑成的杂乱杯状巢。 · 地理分布 繁殖于加拿大东南部及美国东部，冬季迁至中美洲和南美洲北部越冬。		
		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 迁徙

科名 绿鸫科	学名 <i>Vireo olivaceus</i>	身长 15 厘米
--------	---------------------------	----------

红眼绿鸫(Red-eyed Vireo)

常藏身于树端，但从求偶时的鸣唱可以发现它。主要以昆虫为食，在秋冬两季也采食浆果。

- 巢 悬于树枝下，以草、树皮、地衣等筑成的杯状巢。
- 地理分布 繁殖于加拿大及美国，过冬远至阿根廷北部及乌拉圭。



白色眼线

灰色冠羽

双翼长而渐尖，适于长途迁徙

亚成鸟

地理分布图


羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 拟黄鹂科	学名 <i>Icterus jamaicaii</i>	身长 22 厘米
---------	-----------------------------	----------

草原拟黄鹂(Campo Oriole)

体型细长，羽色醒目，生活在森林、林地及零散树丛中。成对在树木不同高度间，取食昆虫与果实，不和其他鸟类混群。

- 巢 悬在树枝上，以树的纤维编筑成松散的袋状巢。
- 地理分布 巴西部分地区及其周围各国。
- 附注 常被视为与美洲棕鸟同种。



冠羽橙色

白色翼斑

腿短而粗壮

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所    	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 拟黄鹂科	学名 <i>Icterus galbula</i>	身长 22 厘米
---------	---------------------------	----------

橙腹拟黄鹂(Northern Oriole)

生活于森林和开阔林地的高大树木上，取食昆虫、浆果和果实。

- 巢 悬在枝端，由长纤维构成的深袋状巢。
- 地理分布 加拿大、美国及墨西哥，冬季迁至中美洲各国、哥伦比亚、委内瑞拉。
- 附注 美国西部型称为巴洛克氏拟黄鹂，东部型称为巴尔的摩拟黄鹂。



脸部有暗黄色的过眼线

白色翼斑

体腹黄色

巴洛克氏型雄鸟

巴尔的摩型雌鸟

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 拟黄鹌科

学名 *Psarocolius bifasciatus*

身长 50 厘米/40 厘米

帕拉拟黄鹌(Olive Oropendola)

体型硕大的热带鸟类，生活在近雨林地区、林缘以及砍伐后的林间空地。成群栖息于高高的林冠中，以大而尖的喙啄下各种果子，并整个吞咽，偶尔也捕食昆虫。群集时会发出连续性的高亢叫声，而当雄鸟绕着树木做炫耀飞行时，会发出响亮的“咯咯”声，拍翅声响亮，飞行笨拙而沉重。

· 巢 悬挂在高枝的末端，以草或其他植物编成的长形袋状巢，巢群常占据一整棵树或毗邻的几棵树上。

· 地理分布 从哥伦比亚、圭亚那到玻利维亚及巴西西部的亚马孙平原。

· 附注 雄鸟的平均身长(包括尾羽)约比雌鸟长 10 厘米。



羽色 雌雄相似

栖所

迁徙 不迁徙

科名 拟黄鹌科

学名 *Gymnomystax mexicanus*

身长 30 厘米

黑背黑鹌(Oriole Blackbird)

羽色不如黄鹌类(见 355 页)复杂，但习性和高亢多变的鸣声则与之类似。生活在近水源的花园、田野及热带草地中，常成对或一小群零零散散地在地面上走动觅食，或停歇于灌木和矮树上，以捕食地面上的昆虫。十分常见，同类常群集。

· 巢 位于树上，以杂草和其他植物筑成，厚巢壁的杯状巢。

· 地理分布 南美洲北部和中部的低地。



羽色 雌雄相似

栖所

迁徙 不迁徙

科名 拟黄鹌科	学名 <i>Sturnella neglecta</i>	身长 24 厘米
---------	------------------------------	----------

西美草地鸻(Western Meadowlark)

体背棕色具条纹，腹部黄色，常出现于草原和农场中，成小群在地上觅食，落单个体则栖息在篱笆高处等制高点。以短剑般强而有力的喙，翻找土堆中的昆虫和其他无脊椎动物为食。叫声如长笛的“噗噗”声。

- 巢 位于地面上的隐蔽处，以草及其他植物材料搭成的椭圆状巢。
- 地理分布 繁殖于加拿大南部到墨西哥中部，冬季分布区扩及加拿大西南部至墨西哥中部。
- 附注 与东美草地鸻外形极为相似，但鸣声不同。东美草地鸻为尖哨声。



头和喙呈锥形


深色的过眼线

背部具条纹

地理分布图



冬羽

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 拟黄鹌科	学名 <i>Quiscalus quiscula</i>	身长 32 厘米
---------	------------------------------	----------

拟八哥(Common Grackle)

羽色黑亮，非常引人注目，栖息于农田和城市郊区，终年集群生活，冬季和他种鸟类混居，以无脊椎动物、种子、果实及某些坚果为食。

- 巢 位于树的较低处，以草或树枝搭成的大而疏松的杯状巢。
- 地理分布 繁殖于北美中部和东部，从加拿大艾伯塔省到得克萨斯和佛罗里达，冬季生活于分布区的南半部。



尖锥形的喙

东部型特有的青铜羽色


脚大而强健


翼宽而渐尖

外侧尾羽上翘，使尾部上表面看起来凹凸不平

亚成鸟

地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 拟黄鹌科	学名 <i>Euphagus cyanocephalus</i>	身长 23 厘米
---------	----------------------------------	----------

蓝头黑鹌(Brewer's Blackbird)

常群集在农田、路旁、宽阔草地等空旷的地面上觅食。雄鸟羽色黑亮，有黄色眼环，雌鸟则体背呈深棕色，腹部呈浅棕色。以种子、昆虫和其他无脊椎动物为食。

- 巢 位于地面、灌丛中或树上，零散聚集的群巢，以细树枝搭筑，呈杯状，内衬细草。
- 地理分布 繁殖在加拿大南部五大湖以西的地区，及美国西部，越冬在加拿大西南部到佛罗里达和墨西哥中部等。



• 头部具紫色光泽

• 体羽在光线反射下反射出绿色光泽

• 流线形的细长体形

• 双腿适于陆上觅食

雌鸟

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------

科名 拟黄鹌科	学名 <i>Molothrus ater</i>	身长 19 厘米
---------	--------------------------	----------

褐头牛鹌(Brown-headed Cowbird)

生活于空旷的林地和天然的草地中，坚实的喙适于在农田和郊区花园中的地面上取食，常群集在家禽及牛等食草动物周围，取食被它们惊飞或引来的昆虫。

- 巢 寄居于其他雀鸟的巢中，如黄林莺(见 349 页)，红眼绿鹌(见 355 页)和歌带鹌(见 336 页)等。
- 地理分布 繁殖于北美洲，越冬至美国中部和墨西哥。



• 头部暗褐色

• 喙小而呈锥形

• 发亮的体羽

• 强壮长腿适于地上觅食

• 短尾末端呈钝状

• 强有力的双翼末端渐尖

亚成鸟




地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙
---------	---	-------


科名 雀科	学名 <i>Fringilla coelebs</i>	身长 15 厘米
苍头燕雀(Chaffinch) 已能适应花园的生活，取食地面上的种子、果实和昆虫，冬季常集群。 · 巢 位于树枝分叉处或灌丛中，以苔藓筑成的杯状巢。 · 地理分布 欧洲、非洲北部、中东、西伯利亚，有些种群在非洲北部和印度越冬。 翼羽上的浅色横斑 长腿 胸部 淡红棕色 雌鸟 地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 部分迁徙


科名 雀科	学名 <i>Serinus serinus</i>	身长 12 厘米
金丝雀(European Serin) 羽色黄绿相间，呈条纹状，以地面上小种子为食。春天，雄鸟会发出“嘶嘶”的鸣叫声，并表演螺旋型的下坠飞行。 · 巢 位于树上或灌丛中，以蜘蛛丝黏结草、树根及苔藓织成的小型杯状巢，内衬毛发和植物的细毛。 · 地理分布 欧洲大陆、地中海岛屿、非洲北部及土耳其。 脸部的黄色斑纹 喙短小 腿短 尾羽 边缘呈黄色 雌鸟 地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 迁徙


科名 雀科	学名 <i>Carduelis pinus</i>	身长 13 厘米
松金翅(Pine Siskin) 生活在针叶林中的鸟，活泼好动，可以倒挂着进食；食性广泛，嗑球果中的种子吃，也取食赤杨或桦树的茺荑花序；常是数百只群集在树上和草本植物中，取食种子、树芽、嫩叶和昆虫。 · 巢 位于针叶树上，以草、枝或苔藓筑成杯状巢，内衬树皮和羽毛。 · 地理分布 在北美和墨西哥的山区繁殖，冬季多数种群向南迁徙。 翼羽上的黄色光泽 地理分布图		
羽色 雌雄相似	栖所    	迁徙 部分迁徙

科名 雀科	学名 <i>Carduelis tristis</i>	身长 13 厘米
北美金翅(American Goldfinch) 雄鸟的黑黄相间繁殖羽，在冬季时会变成暗褐色。冬季常大量群集，取食野草种子、昆虫及嫩芽等。 · 巢 位于树枝分叉处，以树皮、草或茎干筑成的敞开式杯状巢。 · 地理分布 繁殖于加拿大南部及美国，冬季时北部种群南迁到墨西哥北部。  鲜黄色的夏羽 翼上的白色花纹  地理分布图  雌鸟 		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 部分迁徙
科名 雀科	学名 <i>Carduelis chloris</i>	身长 14 厘米
金翅(European Greenfinch) 常于花园和农田中出现，悠美动听鸣声中夹杂刺耳的长音，以种子、浆果和昆虫为食。雄鸟在春季时会在树林上空炫耀表演蝴蝶式的飞行。 · 巢 位于树上或灌丛中，以草茎和其他植物材料筑成的大型杯状巢。 · 地理分布 从欧洲、非洲北部到亚洲西部，某些种群冬季会南迁。  雌鸟 暗橄榄色的羽毛 黄色翼斑 尾羽边缘黄色  地理分布图 		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 部分迁徙
科名 雀科	学名 <i>Carduelis carduelis</i>	身长 12 厘米
红额金翅(Eurasian Goldfinch) 色彩十分艳丽，秋季时常集群出现在空旷地带，取食薊科植物顶部或地面上的种子。 · 巢 位于树木的水平枝干上，以植物材料筑成的杯状巢。 · 地理分布 欧洲、非洲北部、中东至亚洲中部。  黄色翼斑 飞行中可见浅色的尾部覆羽 尾分叉  地理分布图   亚成鸟		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙


科名 雀科	学名 <i>Carduelis flammea</i>	身长 12 厘米
白腰朱顶雀(Common Redpoll) 树栖雀类，在树木枝叶中觅食，有时身体倒悬，有时抓住银白杨的茺荑花序，主要以种子和昆虫为食。 · 巢 位于灌木和树上，用嫩枝和草筑的杯状巢，内衬细软植材。 · 地理分布 繁殖于加拿大北部、美国及格陵兰岛南部、冰岛和欧亚大部分地区，部分种群冬季南迁。  头顶 红色  强健的腿适于攀抓  雌鸟 地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 部分迁徙

科名 雀科	学名 <i>Carduelis cannabina</i>	身长 14 厘米
朱胸朱顶雀(Eurasian Linnet) 以带有鼻音的悦耳鸣声闻名。生活于有荆豆、覆盖石楠丛等空旷地区，秋季有秩序地群集在一起南徙。以种子为主食，也捕食昆虫。 · 巢 位于灌木及树木的较低处，用草和苔藓筑成的杯状巢。 · 地理分布 欧洲大部分地区，非洲北部、中东和中亚的部分地区，有些种群冬季南迁。  前额的红色斑点 头部灰色  羽缘白色  雌鸟 地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 部分迁徙

科名 雀科	学名 <i>Rhodopechys obsoleta</i>	身长 14 厘米
巨嘴沙雀(Desert Finch) 栖息于草原(酸化的草地)和半沙漠。羽色柔和有保护作用，翼及尾上的粉红、黑、白三色相间的花纹在飞行时显露。成对出现，不怕人类接近，在接近地面处取食种子和嫩芽。 · 巢 位于灌丛中或矮树上，以草茎、嫩草和细枝筑成的杯状巢，内衬羊毛、羽毛。 · 地理分布 间断分布于中东、伊朗、巴基斯坦西北部、中亚及中国西部等。  羽毛呈浅沙色  尾羽黑白相间 地理分布图		
羽色 雌雄略有不同	栖所 	迁徙 部分迁徙

科名 雀科	学名 <i>Carpodacus mexicanus</i>	身长 15 厘米
美洲家朱雀(House Finch) 常于郊外出现，已学会在人类居住的环境中取食和筑巢。冬季群集觅食种子和果园中的果实。 · 巢 位于灌木、梁柱或建筑物上，柔软材料筑成的杯状巢。 · 地理分布 加拿大西南部到墨西哥之间，已引入加拿大东南部及美国东部。  宽条状 红色眉纹 尾部覆羽 红色 短腿 雌鸟  地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 不迁徙

科名 雀科	学名 <i>Carpodacus roseus</i>	身长 16 厘米
北朱雀(Pallas' Rosefinch) 栖息于北半球的森林中，到处游荡找寻适当的繁殖地。冬季群集游荡，以取食地面的种子为主，也取食昆虫。 · 巢 无详细的科学记录。 · 地理分布 西伯利亚东部和蒙古北部，有些种群迁徙到中国、朝鲜和日本。  浅色 翼斑 粉红色 腰羽 近似叉形的尾部 雌鸟  地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所   	迁徙 部分迁徙/四处游荡

科名 雀科	学名 <i>Pinicola enucleator</i>	身长 23 厘米
松雀(Pine Grosbeak) 具有两个翼斑的大型雀类，喙宽大，适于取食嫩芽，以及种子、花朵、昆虫及浆果。繁殖期成对生活，冬季时常集群觅食。 · 巢 位于针叶树的高处，嫩枝、苔藓及石楠属植物筑成的杯状巢。 · 地理分布 北美洲、欧洲和西伯利亚的北部森林，某些种群冬季在分布范围南迁。  雌鸟 翼羽 边缘 白色  地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 部分迁徙

科名 雀科	学名 <i>Loxia leucoptera</i>	身长 17 厘米
-------	----------------------------	----------

白翅交嘴雀(White-winged Crossbill)

生活在北方针叶林中，喙尖端交叉，可用以啄开落叶松球果的鳞片，取食其中的种子。冬季常零散的群集。


- 巢 位于低矮的针叶树上的杯状巢。
- 地理分布 北美洲、欧亚大陆北部及海地岛，冬季南迁的界限，每年不同。



交叉的喙



雌鸟



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙/四处游荡
---------	--	------------

科名 雀科	学名 <i>Pyrhula pyrrhula</i>	身长 17 厘米
-------	----------------------------	----------

红腹灰雀(Eurasian Bullfinch)

羽色鲜艳，体形结实，头大，喙坚硬，鸣声为短促的尖笛声，以水果和花芽为食，常因取食花芽而对果树造成巨大损失。

- 巢 位于浓密的灌木丛，以嫩枝编成的浅杯状巢，内衬细根。
- 地理分布 欧洲、横穿中亚到太平洋的带状区域。




浅灰色翼斑

白色腰羽



雌鸟



地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 雀科	学名 <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	身长 17 厘米
-------	---	----------

锡嘴雀(Hawfinch)

生活在林中树梢的大型雀类，以巨喙咬开樱桃核，取食里面的果仁，也吃种子、嫩芽及果实。冬季集成小群，通常将自己隐藏起来。


- 巢 位于树上的浅杯状巢，以嫩枝和植物筑成，内衬细根。
- 地理分布 欧洲、非洲西北的部分地区，中东、亚洲中部和东部，以及西伯利亚南部。



飞羽末端长而突出



亚成鸟



地理分布图

羽色 雌雄略有不同	栖所 	迁徙 不迁徙
-----------	--	--------

科名 雀科	学名 <i>Euphonia personata</i>	身长 23 厘米
黑头蜡嘴雀(Japanese Grosbeak) 常于林地中出现的大型迁徙雀类，繁殖季节成对活动，冬季则小群聚集，以松果、浆果及昆虫等为食。 · 巢 树上的浅杯状巢，具内衬。 · 地理分布 繁殖于西伯利亚东南部、中国北部、日本北部，冬季在日本南部和中国东部越冬。 面具似的黑羽 喙大而有力 蓝色翼斑 翼上的白色横纹 亚成鸟 地理分布图		
羽色 雌雄略有不同	栖所  	迁徙 迁徙

科名 雀科	学名 <i>Hesperiphona vespertina</i>	身长 20 厘米
黄昏蜡嘴雀(Evening Grosbeak) 雄性体羽为黑黄两色，雌雄均具有白色翼斑。生活于林地中，以昆虫的幼虫和种子为食。冬季常到饲料台上取食。 · 巢 位于树枝分叉处，树枝筑成的杯状巢。 · 地理分布 加拿大南部、美国西部及墨西哥的针叶林中，有些种群移至美国中部和东部越冬。 雌鸟 眉羽黄色 喙大而硬 体型粗壮 尾短 雌鸟 地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 部分迁徙

科名 梅花雀科	学名 <i>Uraeginthus ianthinogaster</i>	身长 14 厘米
紫蓝饰雀(Purple Grenadier) 虽然羽色艳丽，但栖息地隐蔽，生活在干旱的热带丛林中，集小群在地面上觅食种子和昆虫。飞行时常发出低沉而模糊的鸣声。 · 巢 位于灌丛中，以草筑成的松散圆形巢，一端有开口，内衬羽毛。 · 地理分布 从埃塞俄比亚、索马里向南延伸到坦桑尼亚的非洲东部地区。 紫蓝色腰羽 尖锥状长尾 雌鸟 地理分布图		
羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 不迁徙

科名 梅花雀科	学名 <i>Estrilda astrild</i>	身长 12 厘米
横斑梅花雀(Common Waxbill) 非洲最常见的雀类，生活于开阔的高草丛中，有时栖地靠近水边，常一小群在地面或草丛中，取食种子，也吃小昆虫。 · 巢 位于干草丛或低矮的灌丛中，草编的蛋形巢，有管状入口，内衬柔软羽毛或草花。 · 地理分布 撒哈拉沙漠以南的非洲地区，有些种群已引入世界各地。		
		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 梅花雀科	学名 <i>Amandava subflava</i>	身长 9 厘米
橙腹红梅花雀(Zebra Waxbill) 体背下侧具红色覆羽，在草丛中觅食时十分显眼，取食种子、昆虫及柔软的枝条，午后常成群到水边饮水和沐浴。 · 巢 位于离地不远处的草编蛋形巢，常用其他鸟类的旧巢。 · 地理分布 非洲撒哈拉沙漠以南。 · 附注 又名斑纹梅花雀。		
		
羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 梅花雀科	学名 <i>Neochmia temporalis</i>	身长 12 厘米
红褐雀(Red-browed Finch) 出没于林缘、开阔地、灌木草原及城镇的花园中，飞行动作夸张，常成对或集成小群，急躁地在草丛或低矮植物中觅食小种子。 · 巢 以草茎编成具管状开口的巢，位于树上或灌木中，形似横置的瓶子。 · 地理分布 澳大利亚东部，西南部及南太平洋的社会群岛和马克萨斯群岛已引入。		
		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 梅花雀科	学名 <i>Taeniopygia guttata</i>	身长 12 厘米
---------	-------------------------------	----------

斑胸草雀(Zebra Finch)

生活在靠近水源的半沙漠，胸和尾布满黑白的斑纹。以种子为食，常群集在一起发出短促具鼻音的鸣声，相当活跃。



地理分布图

- 巢 位于灌木或中空的树枝中，草编成的圆顶巢，侧面开口。
- 地理分布 印尼东部和澳大利亚。



黑白相间的尾羽



雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所    	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 梅花雀科	学名 <i>Taeniopygia bichenovii</i>	身长 10 厘米
---------	----------------------------------	----------

双斑草雀(Double-bar Finch)

羽色灰褐，胸部有两条明显的黑色带纹，集小群于矮草丛或光秃的地面上觅食，在掩蔽物边取食小种子。

- 巢 以草编成，形似横置的瓶子，内衬细草，位于灌丛或草丛中。
- 地理分布 澳大利亚北部和东部。



地理分布图



双翼具斑点

脸部围着一圈黑羽

羽色 雌雄相似	栖所    	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 梅花雀科	学名 <i>Erythrura psittacea</i>	身长 11 厘米
---------	-------------------------------	----------


红喉鹦雀(Red-throated Parrot-finch)

生活在农田和空旷林地，除繁殖期群集取食草籽，也吃昆虫。因一身可与鹦鹉媲美的红绿羽色而得名。

- 巢 位于洞穴中或浓密草丛中隐蔽处，以草编成的圆形巢，开口在侧面。
- 地理分布 南太平洋中的新喀里多尼亚岛。



地理分布图



绿色体羽


红色尾部覆羽

羽色 雌雄相似	栖所    	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

身长 12 厘米

常见的非洲雀，生活在荆棘热带草原及河谷边的丛林。以植物的种子为食，午后常一小群地在水坑中饮水和沐浴，栖息时拥成一团。

- **巢** 位于树枝顶端或较高的树上，以草茎末梢筑成的大型圆顶巢，结构疏松，内衬羽毛。
- **地理分布** 非洲东北部，苏丹、埃塞俄比亚、坦桑尼亚境内。



地理分布图

尾羽末端
呈圓弧形

羽色 雌雄相似

栖所   

迁徙 不迁徙

科名 梅花雀科

学名 *Padda oryzivora*

身长 16厘米

身体笨重，外形圆滑的食谷鸟，生活于热带草原及农场中，以草籽和播种的谷物为食，也取食昆虫，在非繁殖季节常群集到田里觅食。

- **巢** 以草编成钟形的圆顶巢，通常位于建筑物的檐下。
- **地理分布** 爪哇和巴厘岛，也引入世界各国的热带地区。
- **附注** 生性喜集群，适合人工饲养繁殖，是亚洲地区十分普遍的笼养鸟，有些国家已出现野生的笼中逃逸鸟。



地理分布图

● 側腹部
淡粉色

羽色 雌雄相似

栖所

迁徙 不迁徙

科名 梅花雀科

学名 *Amadina fasciata*

身长 12厘米

生活于热带草原及干燥林地中，以种子和昆虫为食。只有雄性成鸟具有红色喉斑，繁殖季节成对活动，而其他时间则群集在一起，生性活泼而聒噪。

- **巢** 用草和羽毛编成的球状巢，有时会使用麻雀或燕子的旧巢。
- **地理分布** 非洲的撒哈拉沙漠以南地区。



地理分布图

雌鸟

腹部的
栗色斑点

羽色 雌雄不同

栖所

迁徙 不迁徙

科名 梅花雀科

学名 *Chloebia gouldiae*

身长 13 厘米


七彩文鸟(Gouldian Finch)

羽色十分艳丽，又称胡锦。生活在热带开阔林区和灌丛中，常一小群在地面上觅食种子，是十分受欢迎的宠物鸟。



地理分布图

- 巢 浅地洞中由草编成的松散圆顶巢。
- 地理分布 澳大利亚北部。
- 附注 有三种色型：黑头型、红头型和少见的黄头型。



羽色 雌雄略有不同

栖所

迁徙 不迁徙

科名 文鸟科

学名 *Vidua regia*

身长 30 厘米/13 厘米

箭尾维达鸟(Shaft-tailed Whydah)

栖息于广阔的亚热带草原上，觅食掉落在地面上的种子，跳跃时双脚同时落地，十分特别。繁殖期初，会聚集成雄鸟数量比雌鸟多的小群体，雄鸟在飞行中炫耀长尾吸引雌鸟，一停止炫耀，雄鸟的长尾便褪换成和雌鸟相同的新羽。繁殖期后聚集一大群觅食，一起在大树上栖息。

· 巢 不筑巢，和杜鹃一样寄生在紫耳蓝饰雀巢中，维达鸟的幼雏与寄主雏鸟的喙形和鸣声都十分相似，一起由雄蓝饰雀喂养。

· 地理分布 非洲南部的部分地区。

精致的尾羽只在求偶期初期出现

尾羽末端膨大



雌鸟

地理分布图

羽色 雌雄不同

栖所

迁徙 不迁徙

科名 文鸟科	学名 <i>Passer domesticus</i>	身长 15 厘米
--------	-----------------------------	----------

家麻雀(House Sparrow)

原属食谷鸟，已成为杂食性，以昆虫、水果，甚至剩饭为食，在离原产地很远的人类居住的环境中，大量繁殖。

· 巢 建筑物上以草等巢材筑成凌乱松散的巢。

· 地理分布 源于欧亚、非洲北部和中东等地，现已引入世界各地。



地理分布图



冠羽灰色

雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所  	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------


科名 文鸟科	学名 <i>Montifringilla nivalis</i>	身长 17 厘米
--------	----------------------------------	----------

白斑翅雪雀(White-winged Snowfinch)

栖息于高山草地到雪线之间，荒凉的岩石或碎石地带，以种子为食。

· 巢 以草叶和毛发筑成杯状巢，位在岩壁上。

· 地理分布 欧洲南部、土耳其、伊朗、蒙古西部、中亚和喜马拉雅山区。



地理分布图



头部灰色

翼斑

尾羽黑白相间

羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------


科名 文鸟科	学名 <i>Sporopipes frontalis</i>	身长 11 厘米
--------	--------------------------------	----------

点额织布鸟(Speckle-fronted Weaver)

性情温顺，不怕人，常三五成群在草原的地面上觅食草籽，黄昏时数只集中在同一树枝上，或挤在夜栖专用的薄顶巢中过夜。飞行中，尤其是向其他个体示威时，常重复发出悠扬而间杂着“喳喳”声的欢愉啼鸣。

· 巢 树上由干草编成的球状巢，其中一侧具管状开口。

· 地理分布 热带非洲地区，从撒哈拉沙漠以南穿过埃塞俄比亚到肯尼亚。



地理分布图



额头的小斑点

颈背棕色

浅色羽缘

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 文鸟科	学名 <i>Ploceus ocularis</i>	身长 16 厘米
--------	----------------------------	----------


眼斑织布鸟(Spectacled Weaver)

生活于灌丛、丛林、河边树林、农田和郊区花园中，生性胆怯，极少离开藏身处活动，常成对在枝干爬上爬下，觅食昆虫、蜘蛛、千足虫及花蜜、种子和果实，雄鸟会在巢边倒悬着身体炫耀。

- 巢 悬于水面上的树枝上，精致的圆形巢，下方有长长的管状开口。
- 地理分布 非洲撒哈拉以南地区。



浅色眼睛位于黑眼线中



地理分布图



雌鸟

橄榄绿的背部

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 文鸟科	学名 <i>Ploceus cucullatus</i>	身长 17 厘米
--------	------------------------------	----------


黑头群栖织布鸟(Village Weaver)

非洲最常见的织布鸟，在村庄附近的树上群集，觅食昆虫和种子，雄鸟倒挂于巢下，拍打翅膀炫耀。

- 巢 以芦苇等青草编成椭圆形巢，一侧为巢室，另一侧为入口，管状开口垂直地悬在下方。
- 地理分布 非洲撒哈拉以南，沙漠地区除外。



脸罩式的黑羽




地理分布图



雌鸟

黄色的羽缘

腹部金黄色


羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 文鸟科	学名 <i>Quelea cardinalis</i>	身长 11 厘米
--------	-----------------------------	----------

绯红奎利亚雀(Cardinal Quelea)

喜群居，成群四处游荡，在浓密的草丛及沼泽中繁殖，觅食小种子。雄鸟站在高高的芦苇尖鸣唱，抖动羽毛和翅膀并张开其扇形尾羽炫耀。

- 巢 草编成结构密实的巢，绑缚于草秆间，一侧的顶部具开口。
- 地理分布 肯尼亚到莫桑比克。
- 附注 近缘的普通奎利亚雀常聚集成几百万只。



地理分布图



雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 部分迁徙/四处游荡
---------	--	--------------

科名 文鸟科

学名 *Euplectes jacksoni*

身长 33 厘米/13 厘米

杰克逊氏寡妇鸟(Jackson's Widowbird)

生活于高纬度的空旷地带和热带草原区，个性活泼，十分常见。繁殖季节，雄鸟会环绕着选定的一片草丛，快速飞升到空中，将长尾拱起尽情炫耀。繁殖季节结束后，常群集在农田中，觅食地面或草丛的种子和昆虫。

- 巢 位于低矮草丛中，轻薄而开口在侧面的巢，草编，有时将生长在旁的青草也编入其中，内衬种子。
- 地理分布 从肯尼亚到坦桑尼亚北部。
- 附注 雄鸟尾部长达 20 厘米，与雌性明显不同。




地理分布图



雌鸟

羽色 雌雄不同

栖所 

迁徙 不迁徙

科名 文鸟科


学名 *Anomalospiza imberbis*

身长 13 厘米

寄生织布鸟(Parasitic Weaver)

短尾，喙坚实，生活于接近水源的草原中，以种子为主食。繁殖期单独、成对或三五成群活动，雄鸟炫耀时发出“思威令”的鸣声。平时群集，飞行以微弱的信号联系。

- 巢 巢寄生，产卵在柳莺等鸟类的巢中，并靠其哺育雏鸟。
- 地理分布 仅分布于非洲撒哈拉以南的部分区域。
- 附注 羽色不醒目，使得它在接近寄主鸟巢不易被发现，故又名“杜鹃雀”。




地理分布图



雌鸟

羽色 雌雄不同

栖所 


迁徙 不迁徙

科名 八哥科	学名 <i>Aplonis magna</i>	身长 35 厘米
--------	-------------------------	----------

长尾辉棕鸟(Long-tailed Starling)

尾长而渐尖，常左右摆动得像是随时会掉下来。两性均具长尾，但只有雄鸟的具有光泽的暗绿色羽毛和细长的颈羽。出没于较高及较低地形、次生林、林缘及花园中，集成小群觅食树上或林下的小果实，叫声尖厉起伏，鸣唱中夹杂着许多短促而连续的颤音。

- 巢 无记录，可能位于高处的洞穴中或建筑物上。
- 地理分布 新几内亚西北部的比亚克岛和南佛岛上。



雄鸟羽色发亮

尾羽末端呈尖锥形

脚大

腿强健

地理分布图

羽色 雌雄略有不同

栖所 


迁徙 不迁徙

科名 八哥科	学名 <i>Onycognathus morio</i>	身长 28 厘米
--------	------------------------------	----------

南非红翅棕鸟(Red-winged Starling)

体型纤细，腿长，在沐浴或飞翔时，会露出翅膀上一大片栗色的次级飞羽。在地面和树上觅食果实、昆虫，以及花蜜。非繁殖季节成群活动，但到了繁殖季节则分开成一对对的，配偶间关系密切。筑巢于山上、悬崖及多石的山丘，也常在建筑物中营巢。

- 巢 泥土与植物纤维构成的碗状巢，位于悬崖的边缘或缝隙中，凸出地面的岩石，以及墙壁上。
- 地理分布 撒哈拉以南的非洲部分地区。



羽毛发亮


栗色的次级飞羽

末端钝圆的宽尾

雌鸟

地理分布图

羽色 雌雄不同

栖所 

迁徙 不迁徙

科名 八哥科	学名 <i>Lamprotornis superbus</i>	身长 18 厘米
---------------	--	-----------------

栗头丽椋鸟(Superb Starling)

原栖息于开阔地带，已能适应农田和城镇的生活环境，性情温顺，具社会性，总是三五成群地在地面上觅食昆虫和其他无脊椎动物、果实及种子，也常到猎人的营地周围乞食。

- 巢 草筑的球状巢，位于灌丛或树洞中。
- 地理分布 苏丹、埃塞俄比亚到坦桑尼亚。



地理分布图

亚成鸟

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 八哥科	学名 <i>Sturnus vulgaris</i>	身长 20 厘米
---------------	-----------------------------------	-----------------

欧洲八哥(Common Starling)

已能完全适应城镇的生活，常十分醒目地集成一大群。繁殖期巢群零落聚集，雄鸟会勇敢地护巢。常半张开喙，在地面上探寻蠕虫和昆虫。

- 巢 位于岩石、树洞、建筑物或巢箱内的杯状巢。
- 地理分布 欧洲、非洲北部、中国西部和印度，已引入北美洲、南非和澳大利亚南部。



亚成鸟

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 八哥科	学名 <i>Leucopsar rothschildi</i>	身长 25 厘米
---------------	--	-----------------

长冠八哥(Rothschild's Myna)

羽色洁白，体型壮硕，头上有较长的冠羽。求偶时，雄鸟会竖起冠羽，不断地上下摆动头部。具社会性，除繁殖期外均群集在一起，在树上觅食果实和昆虫。

- 巢 位于树洞中的杯状巢。
- 地理分布 印尼的巴厘岛。
- 附注 由于栖所被破坏，野生种群已濒临灭绝，目前正尝试以人工饲养繁殖。



亚成鸟

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 八哥科	学名 <i>Lamprotornis splendidus</i>	身长 30 厘米
--------	-----------------------------------	----------

光彩辉棕鸟(Splendid Glossy Starling)

具社会性，常集群聒噪地游荡于空旷林地以及热带河流边的大树之间，觅食树冠上层的果实和昆虫。喜食野生的无花果，果实累累的无花果树常吸引大群的鸟争相觅食。由于大部分时间在树冠中活动，很难发现行踪，只有当它们在树木间飞行时，可以由特殊的弓身姿势来辨识。拍翅时产生明显的“瑟瑟”声，鸣声混杂着尖锐的哨音、刺耳的磨锉声和低沉的鼻音，当数百只鸟聚在一起过夜时，这种鸣声尤其清楚。

· 巢 以离地较高处的树洞为巢，内衬干草。

· 地理分布 非洲西部和中部的森林地带。



地理分布图



尾长而宽




青铜色的颈部覆羽

亚成鸟

翼上覆羽羽缘具黑色光泽

翼长

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 部分迁徙/四处游荡
---------	--	--------------

科名 八哥科	学名 <i>Cosmopsarus regius</i>	身长 35 厘米
--------	------------------------------	----------

金胸棕鸟(Golden-breasted Starling)

体型修长，尾羽渐尖，除了金黄色胸羽之外，外表和习性也和其他辉棕鸟不同。群集在热带稀树草原或干旱灌丛中，以觅食小果实为主，并大量捕食昆虫，性情机警，遇外来侵扰时，会以啁啾的哨声示警。

· 巢 内衬植物材料的树洞巢。

· 地理分布 从索马里到坦桑尼亚的非洲东部地区。



地理分布图



亚成鸟




眼大而明显

胸部上半呈紫色

腹部金黄色

腿长

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 八哥科	学名 <i>Acridotheres tristis</i>	身长 23 厘米
--------	--------------------------------	----------

家八哥(Common Myna)

体格强健而胆大，飞行露出白色翼斑，已适应城市的环境，繁殖期以外，常群集在旷野、花园和街道上，觅食水果、种子、昆虫、蠕虫及人类的残羹剩饭，黄昏时成群栖息在树上，发出嘈杂粗厉的“咯咯”、“喀嗒”声。雄鸟求偶时会竖起额头的硬羽不断点头，向雌鸟炫耀。

· 巢 草根、树枝筑成的粗糙碗形巢，位于树洞和建筑物上。

· 地理分布 从伊朗到东南亚都分布，已引进阿拉伯、非洲、澳大利亚及一些太平洋岛屿上繁殖。

· 附注 引进家八哥的地区，因食物和栖地的过度竞争，对原有鸟类造成相当大的危害。



地理分布图



亚成鸟



白色翼斑

强健的脚适于行走

尾短

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 八哥科	学名 <i>Streptocitta albigollis</i>	身长 23 厘米
--------	-----------------------------------	----------

白颈九官鸟(White-necked Myna)

出没在各种热带森林低地，体型笨重，喙厚实，双腿强健，翅膀巨大呈圆弧形，直线飞行，细长的尾羽在水平飞行时具平衡作用，能在林中穿梭自如。十分嘈杂，大多在树木的中层高度间活动，找寻果实等食物。

· 巢 尚无记载，应与八哥一样以树洞为巢。

· 地理分布 印尼的苏拉威西岛。

· 附注 具有黄色喙及喙纯黑色两个亚种。



南方亚种

长尾末端呈尖锥形



腿短而强壮，适于树栖



地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙/四处游荡
---------	----	-------------

科名 八哥科	学名 <i>Mino dumontii</i>	身长 25 厘米
--------	-------------------------	----------

黄面九官鸟 (Yellow-faced Myna)

脸上有裸斑，飞行时露出鲜明的白色腰部、尾上覆羽和翼斑，栖息于热带雨林、林缘的大树，及广阔平原上单独生长、四周环境开阔的树上。白天成对或集小群活动，黄昏时群聚栖息，觅食林中的水果，偶尔飞出树丛捕食昆虫群，停栖时不断发出沙哑叫声，繁殖期，前一个繁殖季长成的个体作“帮手”，协助亲鸟筑巢和孵蛋。

- 巢 在近地面的树洞中，以枝条、树叶、干枝筑成碗状巢。
- 地理分布 新几内亚、俾斯麦群岛和所罗门群岛。



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------


科名 八哥科	学名 <i>Gracula religiosa</i>	身长 29 厘米
--------	-----------------------------	----------

九官鸟 (Hill Myna)

野生的九官鸟出没于热带雨林和森林里，常小群在树梢觅食水果和浆果，捕食昆虫、飞蚁，吸取花蜜，在地面不灵巧，只能笨拙跳跃。平时不断发出“啁啾”声，声音或低沉，或刺耳，如乐声般变化多端，由于擅模仿人语而成为十分普遍的玩赏鸟。

- 巢 大树洞穴深处的杯状巢。
- 地理分布 在印度半岛成块状分布，中国南部、喜马拉雅山东部及东南亚地区。
- 附注 将雏鸟与亲鸟分开，由人工喂养训练更能惟妙惟肖地模仿人语。



羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 八哥科	学名 <i>Buphagus africanus</i>	身长 22 厘米
--------	------------------------------	----------

黄嘴牛鹛 (Yellow-billed Oxpecker)

生活在草地上，以长颈鹿、犀牛、斑马、牛等大型草食性哺乳动物身上的扁虱及寄生虫为生。它们以锐爪在动物身上攀爬，用尾巴支撑身体，扁平而末端短粗的喙适于啄食，或探入动物的伤口食取受伤组织，晚上成群在树上、芦苇丛或岩石间栖息。

- 巢 内衬羽毛、草和毛发的树洞巢。
- 地理分布 撒哈拉以南的非洲地区。



地理分布图



亚成鸟

眼 红色

用于支撑身体的短尾

爪强健，用于在动物身体上攀爬

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 黄鹂科	学名 <i>Oriolus oriolus</i>	身长 22 厘米
--------	---------------------------	----------

金黄鹂 (Golden Oriole)

雄鸟羽色艳丽，黄黑相间，生活在落叶林中，喜欢栖息在高大而树叶稀疏的树上。善于伪装，常胆小地隐藏起来，在树梢叶簇中觅食水果、昆虫时很难发现，唯有发出高亢、三声一度如笛声的啼鸣时，才能发现它们。飞行快速，常像燕子般向下俯冲，即使是水浴时，也是身子刚入水就马上飞回安全的树上，几乎不在地面活动。

- 巢 悬于大树较外侧的水平枝叉上，由草、羊毛、条状树皮筑成杯状巢，内衬细草。
- 地理分布 繁殖于欧洲、亚洲中部和印度北部，在非洲和印度过冬。



地理分布图



黑色眼纹

狭长的双翼

尾短

外侧尾羽 黄色

短腿 适于树栖

雌鸟

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 迁徙
---------	--	-------

科名 黄鹂科

学名 *Sphecotheres viridis*

身长 28 厘米

绿裸眼鹂
(Green Figbird)

身体硕壮修长，具有力的喙，眼睛周围有明显的裸斑，雌鸟的暗紫灰色斑纹不容易发现，雄鸟的裸斑呈浅红色，焦虑或兴奋时会变成明亮的深红色，于林缘或已被砍伐的林区出没。展开长翼往下飞翔觅食野果时，双翼外缘的白色羽毛显露无遗，也常出没在城镇和郊区散生的树上，食取人工种植的香蕉和巴婆果。成鸟单独或成对觅食，亚成鸟则聚集成群，叽叽喳喳彼此尖叫不停。

- 巢 以藤类卷须制成浅杯状巢，并以细枝条悬挂在树木高处的水平枝叉上。
- 地理分布 印尼东部的罗地岛和帝汶岛、新几内亚东南部、澳大利亚的东部和北部。



地理分布图

雌鸟

羽色 雌雄不同

栖所

迁徙 不迁徙

科名 卷尾科


学名 *Dicrurus forficatus*

身长 27 厘米

马岛冠卷尾(Crested Drongo)

前额耸立着一簇羽毛，总是醒目地站在树梢、电线杆和岩石上觅食，不太刻意藏身躲避敌害，有时会猛烈攻击驱赶飞过的猛禽。在空旷林地捕食时，先机警地在栖处观察后，再弓身冲向半空中捕食飞虫，用粗短略带钩状的喙攫住猎物，长而向外弯曲的叉状尾使它在空中非常灵活。在辽阔的草地活动时利用草食性动物作为流动栖所，借机捕食被惊飞的昆虫，及灌丛和草原火灾时逃生的昆虫，单独或成对觅食，发出金属声似的弦音。

- 巢 以植物编成浅杯状巢，悬挂在树枝末端的水平枝叉间。
- 地理分布 马达加斯加岛和西北侧的科摩罗群岛。



地理分布图

羽色 雌雄相似

栖所

迁徙 不迁徙

科名 卷尾科	学名 <i>Dicrurus paradiseus</i>	身长 63 厘米
大盘尾(Greater Racquet - tailed Drongo) 头顶长有蓬松后弯的冠羽，尾部延伸出两条特别长尾羽，细线般的长羽干末端为球拍状羽片，飞行时在身后随风飘浮。典型的食虫鸟，在雨林和竹林中单独或一小群反复地由同一栖息处飞出，利用灵活的双脚捕捉树枝间和空中的大型昆虫，有时带回栖息处，有时直接吃掉。常加入其他鸟类组成的猎食群，将昆虫赶出森林，以方便猎捕。和其他卷尾科鸟类一样会猛烈反击想捕食它们的猎食者，善于模仿其他鸟类的叫声，可以发出类似金属敲击声及悠扬悦耳的“啾啾”声。 · 巢 以细枝、树皮、草茎和蛛网构成深而疏松的杯状巢，位于树高处水平枝叉末端。 · 地理分布 印度半岛喜马拉雅山区到中国南部，最南分布至婆罗洲、爪哇和巴厘岛。 · 附注 卷尾科中尾最长、体型最大的一种。		
 叉形尾 长柄状的外侧尾羽 膨大的尾羽末端常向外弯  地理分布图 		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 垂耳鸦科	学名 <i>Creadion carunculatus</i>	身长 25 厘米
鞍背鸦(Saddleback) 生活在树丛中，嘴侧有两块鲜艳的肉垂，觅食水果、花蜜及树皮上的昆虫为生，成对活动，不常飞行。 · 巢 树洞和浓密叶簇中的杯状巢。 · 地理分布 现仅存于新西兰及附近几个小岛上。		
 地理分布图  南岛型的亚成鸟  马鞍形状的栗色斑纹		
羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙

科名 鸺鹛科	学名 <i>Grallina cyanoleuca</i>	身长 27 厘米
--------	-------------------------------	----------

鸺鹛(Magpie-lark)

在农场和城镇中很常见，大多在池塘和湖边湿地觅食、筑巢，以细长的双腿支撑身体，捕食地面和浅水区的昆虫、水螺等小型无脊椎动物。从容扇动一双大圆翅，笔直有力地飞行；交配后仍成对生活在一起。常聚集成群，直立高举双翼，轮流发出鸣声来表明自己的领域。


- 巢 水平枝叉上的泥制碗状巢，内衬细草、羽毛。
- 地理分布 澳大利亚及新几内亚南部。

长而宽的双翼

腿强健，适于行走和涉水

雌鸟

地理分布图

羽色 雌雄不同	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鸺鹛科	学名 <i>Struthidea cinerea</i>	身长 32 厘米
--------	------------------------------	----------


灰鸺鹛(Apostlebird)

尾长，性情急躁，鸣声粗厉，飞行能力不强，大多在地面活动，奔跳着寻找昆虫之类的无脊椎动物和小种子。它们经常由 12 只组成家庭，觅食、栖息、筑巢都在一起，互相以喙理羽，孵卵和育雏时都会相互帮忙，所以英文名字称为“门徒鸟”，是参照圣经 12 门徒的故事而来。在鸟群中通常只有一只雌鸟，有时例外的有两只以上。

- 巢 泥制碗状巢，内衬细草，悬于距地面约 15 米高的水平枝叉上。
- 地理分布 澳大利亚的东部和北部。

短翼

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 森燕科	学名 <i>Artamus cinereus</i>	身长 18 厘米
森燕(Black-faced Woodswallow) 虽然外表粗壮，在空中却能借着长而末端渐尖的双翼轻松飞行，捕捉昆虫也十分灵巧。出没在树木稀疏的空旷处，先在高枝上张望或在空中盘旋，再突然俯冲以喙捕食飞过的昆虫。常成对或一小群出现，栖息时挤成一团，繁殖期时群居，家族间会互相帮忙筑巢。 · 巢 以细枝在灌丛或中空的树干中筑成的杯状巢。 · 地理分布 帝汶、新几内亚南部及澳大利亚。  地理分布图  东部型  西部型具有黑色尾下覆羽		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 铃鹞科	学名 <i>Cracticus torquatus</i>	身长 27 厘米
灰钟鹞(Grey Butcherbird) 性情凶猛，有力的长喙末端带钩，飞行迅猛，以从栖息处突然俯冲猎捕小鸟、昆虫、蜥蜴和鼠类为生，无法像猛禽一样以双爪攫住猎物，只能用喙带回栖处，将猎物卡在树枝间或插在荆棘中撕裂。成对定居在一固定区域中，对入侵者会猛烈抵御，鸣声悦耳而轻快，繁殖期的雄鸟与雌鸟会相互不停地点头，并进行“二重唱”。 · 巢 在垂直的枝叉上以细枝精编的杯状巢，内衬细根和藤类的卷须。 · 地理分布 澳大利亚，沙漠地区除外。  地理分布图  亚成鸟  喙强壮 末端具钩 适于栖握的短腿 双爪不适于抓捕猎物		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 铃鹬科

学名 *Gymnorhina tibicen*

身长 40 厘米

黑背钟鹬(Australasian Magpie)

出没在空旷林地和树木稀疏的农场中，在澳大利亚随处可见雄鸟成群聚集。发出优美的合鸣声，以强壮的喙在地上挖掘昆虫的幼虫及无脊椎动物为食。社会结构复杂，雄性的统治者和族群里的所有雌鸟交配后，雌鸟各自分开筑巢，族群里其他年轻的雄鸟也可以和雌鸟交配，但不得参与育雏，族群各自保卫自己的繁殖领域，邻近的族群不得侵入。

- 巢 树上有内衬的浅碗状巢。
- 地理分布 新几内亚中南部、澳大利亚，已引入斐济和新西兰。



地理分布图



雌鸟



羽色 雌雄不同

栖所

迁徙 不迁徙

科名 铃鹬科

学名 *Strepera graculina*

身长 50 厘米

斑噪钟鹬(Pied Currawong)

体型修长，喙强大有力，双眼发亮，行动诡秘，看上去就是一副不怀好意的样子。在繁殖季节里，它是个不折不扣的盗巢者，总是在树林中盗食鸟蛋和雏鸟，或昆虫(尤其是竹节虫)。它也以地面上的浆果和腐肉为食，或在空旷草地上搜捕昆虫。冬天时则群集在一起四处游荡，一起栖息，甚至常飞到城镇里。

- 巢 大型的杯状巢，具内衬，位于叉状的树枝上。
- 地理分布 澳大利亚东部的森林地区。



地理分布图



亚成鸟



羽色 雌雄相似

栖所

迁徙 部分迁徙/四处游荡

科名 造园鸟科	学名 <i>Ailuroedus crassirostris</i>	身长 33 厘米
---------	------------------------------------	----------

绿猫鸟(Green Catbird)

生活在雨林中，属于造园鸟科但并不筑亭，平时在树林中层觅食果实和嫩叶，偶尔在地面笨拙地跳动或飞行一小段距离。生性安静，但进入繁殖期的雄鸟会变得喜欢表现，摇头晃尾并发出猫叫般的尖叫声，追逐着雌鸟。

- 巢 位于树枝分叉、羊齿植物顶端或树藤纠结处的杯状巢。
- 地理分布 澳大利亚东部。
- 附注 雄鸟只与一只雌鸟交配，会护卫鸟巢并协助育雏，与其他的亭鸟不同。



地理分布图




羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 造园鸟科	学名 <i>Ptilonorhynchus violaceus</i>	身长 30 厘米
---------	-------------------------------------	----------

缎蓝亭鸟(Satin Bowerbird)

雌鸟和亚成鸟聚小群在林中觅食水果、嫩叶和昆虫，成熟的雄鸟则把大部分的时间都用于筑“凉亭”上。它们在领地上以小枝筑成林荫小道，用炭和唾液的混合物把凉亭涂黑，然后以羽毛、花朵、石子装饰，尤其喜爱亮蓝色的小石子，雌鸟经过时，雄鸟发出吱吱嘶嘶的鸣声，并以喙衔起明亮的物品展示求偶，交配后，雌鸟离开凉亭独自筑巢育雏。

- 巢 细枝和干叶筑成的浅杯状巢，位于枝叉上或槲寄生丛中。
- 地理分布 澳大利亚东部。



地理分布图



羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 造园鸟科

学名 *Chlamydera maculata*

身长 28 厘米

点斑大亭鸟(Spotted Bowerbird)

生活在浓密而干燥的森林中，在山脚下和溪边觅食昆虫、种子和浆果。雄鸟以筑亭的方式求偶，以枝茎交织成短走道，混合草汁和唾液将凉亭染成红色，道两端用骨头、石子、蜗牛壳和草装饰成白绿两色，雄鸟发出高低不同的“吱啁”声，展示颈部的红斑来吸引雌鸟，采一夫多妻制。



· 巢 水平枝叉上或匍寄生植丛，以树枝筑成的疏松碟形巢。

· 地理分布 澳大利亚东部的内陆及部分沿海地区。



地理分布图



凉亭的装饰物

由淡色羽端构成的点状斑纹

羽色 雌雄相似

栖所

迁徙 不迁徙

科名 风鸟科

学名 *Cicinnurus regius*

身长 28 厘米/17 厘米

王风鸟(King Bird of Paradise)

雄鸟羽色艳丽，但藏身在雨林低谷中很难发现，在枝叶间跳跃寻觅昆虫和浆果。求偶时会在一棵合适的树上将全身羽毛蓬起，举扬尾羽，并发出连续的尖叫声吸引雌鸟，交配后雌鸟离开独自筑巢。

· 巢 在树洞中以棕榈叶编成巢壁很厚的杯状巢。

· 地理分布 新几内亚的低洼地区。

· 附注 因雄鸟尾羽较长，所以身长比雌鸟长很多。



地理分布图



雌鸟

羽色 雌雄不同

栖所


迁徙 不迁徙

科名 风鸟科	学名 <i>Paradisaea apoda</i>	身长 130 厘米/38 厘米
--------	----------------------------	-----------------

大极乐鸟(Greater Bird of Paradise)

生活在雨林中，觅食昆虫和水果，雄鸟两胁成簇的羽毛十分可观，求偶时成群站在光秃的高枝上，将全身羽毛弯成拱形，发出响亮的叫声向雌鸟炫耀。与他种极乐鸟单独求偶的方式不同，被雌鸟选中的雄鸟会伫立不动，交配后雌鸟独自筑巢，当雌鸟和雄亚成鸟外出觅食时，雄鸟独自留在巢里。

- 巢 尚无记载，可能以枝叶筑成杯状巢，位于树上。
- 地理分布 新几内亚东南部和阿鲁群岛。
- 附注 雄鸟因有尾扇，因此身长较长。



地理分布图



雌鸟



羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 风鸟科	学名 <i>Paradisaea rudolphi</i>	身长 63 厘米/29 厘米
--------	-------------------------------	----------------

蓝极乐鸟(Blue Bird Of Paradise)

栖息在雨林的山麓，觅食水果和昆虫，雌鸟和雄性幼鸟小群觅食，雄成鸟单独觅食。求偶的雄鸟选择空旷的栖木倒挂身体，把腹部及双胁的蓝羽毛展成扇形不断地抖动，并有节奏地伸缩尾端那片深红棕色羽毛，发出无变化的抖音，雌鸟便走近停在雄鸟的腿足间观赏演出，等雄鸟将身体荡回她身边。

- 巢 矮树上的浅杯状巢。
- 地理分布 新几内亚东部。
- 附注 由于雄鸟长有长尾扇，所以雌雄两性的身长相差 34 厘米以上。



地理分布图



雌鸟

饰羽末端
延伸成圆形

羽色 雌雄不同	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

科名 鸦科	学名 <i>Platylophus galericulatus</i>	身长 33 厘米
-------	-------------------------------------	----------

马来冠鸦(Crested Jay)

头顶由两根大羽毛组成长羽冠，拥有嘹亮歌喉，当它发出刺耳的哨声和“嘎嘎”声时，冠羽随着上下摆动，栖息于雨林低地及海拔 800 米以上的山林中，成对小群出现。分布区域大，所以较不常见。平时以活蟑螂、蝗虫等大型昆虫、马陆之类的无脊椎动物为食。像许多小型雀类一样会群起围攻猛禽，驱逐敌害，可能因为栖息处远离人群，和人类接触时相当驯服，但也有攻击人类的记录。

- 巢 树木或较高的幼苗上，以硬枝筑成。
- 地理分布 从泰国西南部到婆罗洲、爪哇一带。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鸦科	学名 <i>Cyanocitta cristata</i>	身长 28 厘米
-------	-------------------------------	----------

冠蓝鸦(Blue Jay)

生性大胆而好奇，飞翔时发出尖叫声，并炫耀闪闪发光的蓝色翼羽及尾羽，在农村、公园和郊区都很常见。觅食地面及林间的种子、浆果、坚果之类的果实、昆虫及小生物，并常盗巢偷食，盗巢鸟。虽然具迁徙习性，但仍会在地下或树洞中贮存大量坚果。家族群或成对活动，聚集成群迁徙。

- 巢 用细枝、草茎筑成的杯状巢，位于树上或灌木丛中。
- 地理分布 北美洲东部和中部。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 鸦科	学名 <i>Cyanocitta stelleri</i>	身长 29 厘米
暗冠蓝鸦(Steller's Jay) 生性胆怯，有着细长冠羽，栖息在山腰的树林中、空旷的针叶林、混合林及稀树区，靠灵活的翅膀，在树丛里穿梭自如，在空地里平稳疾飞。活动时发出尖叫声和柔和的低鸣声，仅在食物丰富地区聚集成大群。以坚果、种子及果实为主食，会将种子埋在地下以备过冬。用爪把食物带回栖息处，也会用爪和喙凿开橡果、挖地、剥树皮，也捕食比昆虫小的无脊椎动物，偶尔盗食卵和雏鸟。 · 巢 用细枝筑成的碗状巢，内衬细根，位于树上。 · 地理分布 北美洲西部的阿拉斯加到尼加拉瓜。  地理分布图  深色亚种 双翼蓝色 蓝尾		
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙

科名 鸦科	学名 <i>Aphelocoma californica</i>	身长 29 厘米	
灌丛鸦(Scrub Jay) 飞行缓慢，但在地面上相当灵活，生活在干燥低谷、水边的砍伐林、耕地和郊区。以长腿跳行，在地面及矮丛中觅食坚果、种子、小昆虫之类的无脊椎动物、小蜥蜴、蛙类、鸟蛋、雏鸟和鼠类，食性很广。聒噪而容易激动，常成群聚集赶走捕食者。 · 巢 灌丛或矮树上的杯状巢。 · 地理分布 美国西部到墨西哥南部。 · 附注 生活在佛罗里达州的灌丛鸦，家庭成员间相互帮忙筑巢、育雏。  地理分布图  白眉纹 脚强健，能紧握食物 亚成鸟 <tr><td>羽色 雌雄相似</td><td>栖所 </td><td>迁徙 不迁徙</td></tr>	羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙
羽色 雌雄相似	栖所 	迁徙 不迁徙	

科名 鸦科	学名 <i>Calocitta colliei</i>	身长 70 厘米
-------	-----------------------------	----------

黑喉鹊鸦(Black-throated Magpie-Jay)

有着向前弯的华丽冠羽和末端尖长的尾羽，是鸦科中最华丽的一种，激动时冠羽会挺起，伸展到喙的上方。常聚集小群，在河边矮坡的稀树林中觅食昆虫和浆果类果实，以多变的叫声相互联系，嘈杂地围攻驱逐入侵者。雌鸟孵蛋时，很多同类都会帮忙觅食。

- 巢 以树枝筑成，有铺衬，在高于 30 米的树上。
- 地理分布 墨西哥西北的太平洋沿岸。



黑色喉斑

羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	---	--------

科名 鸦科	学名 <i>Garrulus glandarius</i>	身长 35 厘米
-------	-------------------------------	----------

檀鸟(Eurasian Jay)

个性谨慎多疑，羽色绚丽，以刺耳的哀鸣声闻名。生活在落叶林和混合林，成对小群活动，以坚果、种子、果实、昆虫及小型哺乳动物为食，秋天将橡果埋在空地作为存粮。

- 巢 用树枝和木质茎干筑成较粗糙的巢，位于高树上。
- 地理分布 从欧洲和非洲西北，经中亚到东亚和东南亚。



翼上的蓝色斑纹

飞行时露出白色腰羽



印度亚种

羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 鸦科	学名 <i>Pica pica</i>	身长 48 厘米
-------	---------------------	----------

喜鹊(Common Magpie)

生性活泼好奇，走路时大摇大摆地发出刺耳的“啁啾”声。原生活于灌丛和树上，现在则迁移到耕地和城镇中生活，以昆虫和无脊椎动物为主食，但小生物、腐肉、果实和种子等其他食物也吃，并盗巢偷食。虽然飞行能力不强，但飞行动作仍相当灵巧，长尾翼能做出突然攻击或迅速闪躲等动作。

- 巢 树枝筑成的碗状巢，内衬细枝和泥巴，并用枝条织成疏松的圆顶，位于灌木或树上。
- 地理分布 北美洲西北、欧洲、非洲西北、中东、中亚和东亚。

翼纹

深色羽毛在光线映照下变换出蓝、绿、紫的光泽

白色肩斑

长尾的末端尖细

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鸦科	学名 <i>Nucifraga columbiana</i>	身长 30 厘米
-------	--------------------------------	----------

加州星鸦(Clark's Nutcracker)

体型修长，原产于山区针叶林中，主食松果，略向下弯的喙可探入松果啄出种子，或直接把整颗松果扯下，用脚抓住再将喙探入取食。它会把种子收集在喉囊中，贮藏起来作为冬季的存粮，一旦种子欠收，便立即大量迁移到较低的森林。也以各类种子和果实为食，盗食鸟蛋或凿开朽木找寻昆虫，鸣声为嘹亮的单音。

- 巢 用树枝筑成的杯状巢，通常位于针叶树的树枝末端。
- 地理分布 北美洲西部，从加拿大南部到墨西哥北部。

翅膀长而圆

地理分布图

羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 不迁徙/四处游荡
---------	---	-------------

科名 鸦科	学名 <i>Pyrrhocorax graculus</i>	身长 38 厘米
-------	--------------------------------	----------

黄嘴山鸦(Alpine Chough)

宽阔的双翼加上分叉的尾翼，使它在强劲山风吹袭下，仍能藉气流表演巧妙的翱翔。和大部分鸦科鸟类不同的是头部较小，喙细长，叫声为尖颤的啸声。在地面时用两只短腿活跃地行动，从岩缝和大草原里找寻食物。虽然主要以昆虫、蜗牛和果实为食，但也会吃小动物的腐尸或垃圾堆里的残食。夏季在高山上生活，冬季则移往低地。社群性高，通常由一对亲密的配偶鸟为主，组成一个大群体，共同生活在洞穴中，繁殖时各自分开，但一起筑巢。

- 巢 以大量枝条和干燥的根筑成，位于岩洞里或洞穴边缘。
- 地理分布 西班牙、非洲西北部、欧洲南部、中东和亚洲。



羽色 雌雄相似	栖所  	迁徙 不迁徙
---------	--	--------

科名 鸦科	学名 <i>Corvus monedula</i>	身长 33 厘米
-------	---------------------------	----------

寒鸦(Eurasian Jackdaw)

体型小，眼睛明亮，以草原和农地上的昆虫、水果和腐肉为食，具社群性，聒噪而自信，英文名字取自于粗暴的“杰科”叫声。

- 巢 用枝条筑成的精美杯状巢，位于树、悬崖或建筑物的缝穴中。
- 地理分布 欧亚大陆南到非洲西北，北方种具迁徙性。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所    	迁徙 部分迁徙
---------	---	---------

科名 鸦科	学名 <i>Corvus frugilegus</i>	身长 47 厘米
-------	-----------------------------	----------

秃鼻鸦(Rook)

体型笨重，喙末端渐尖和面部裸露，所以能深入土中，将昆虫的幼虫置于突起的喉囊中带回巢里。秋天以坚果、种子及从混耕田地(将谷物沿着牧草两旁播种的田地)取得的谷物为食，食性非常广泛，包括动物腐肉和厨余。社群性很强，不但聚集一大群觅食、栖息、筑巢，连繁殖时都是一大群嘈杂地聚在一起。

· 巢 用树枝筑成的凌乱结构，内铺软材，位于大树树顶。

· 地理分布 欧洲、中东、中亚和东亚，西伯利亚种冬季移栖到伊朗南部、印度北部、中国南部。

已引进新西兰。



羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 鸦科	学名 <i>Corvus brachyrhynchos</i>	身长 45 厘米
-------	---------------------------------	----------

短嘴鸦(American Crow)

常在北美洲的空旷地区出现，全身黑亮，尾梢呈圆形，稳健的飞翔着。因为它们总是成群偷食玉蜀黍及豆类等农作，而变得声名狼藉，食性广泛，也吃水果、昆虫、幼鸟和鼠类等小动物。繁殖期成对筑巢，有时会好几对住在一起。平时白天分散外出觅食，晚上聚集大群一起栖息。鸣声为尖锐的“科阿”声，也会发出其他各种叫声来传达讯息。

· 巢 由树枝构成的大型杯状巢，内衬细软的植物，位于树上、灌木丛或电线杆顶端。

· 地理分布 北美洲。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所   	迁徙 部分迁徙
---------	--	---------

科名 鸦科	学名 <i>Corvus corone</i>	身长 47 厘米
-------	-------------------------	----------

食腐肉乌鸦(Carrion Crow)

适应力极强，能在各种不同的环境中生存繁衍，以动植物为食，也吃剩饭，会将甲壳类动物摔破来吃。
非繁殖期群居在一起。

- 巢 用树枝筑成的大型巢，内衬细材，位于树梢。
- 地理分布 欧亚大陆、中东和尼罗河谷。
- 附注 有黑头和全黑两个地理亚种。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 部分迁徙
---------	----	---------

科名 鸦科	学名 <i>Corvus albicollis</i>	身长 55 厘米
-------	-----------------------------	----------

白颈渡鸦(White-necked Raven)

体型硕大，威武有力，有一个向上隆起，厚而坚实的喙，能迅速处理掉种子、坚果、水果、昆虫、小型鸟类、鼠类、蜥蜴、腐肉，甚至乌龟之类的任何猎物，它还会把猎物摔向岩地上，再撕碎吞食。主要生活在山区和悬崖峭壁，总是从容挥动有力的双翼翱翔，甚至会展示一些翻转、俯冲等特技表演。

- 巢 用树枝筑成的大型碗状巢，内衬羊毛、毛发和草。位于悬崖边缘。
- 地理分布 非洲东部和南部。



地理分布图



羽色 雌雄相似	栖所	迁徙 不迁徙
---------	----	--------

名词解释

(按中文笔画顺序排列)

- **八色鸟** 生活在森林中的地栖性鸟类，头大、体态丰满，翅长但尾极短，八色鸟科鸟类的通称。
- **八哥** 八哥科中的一类，体型较为笨重，喙粗壮。
- **三趾鹑** 外形和大小都与鹑相似的地栖性鸟类，喙较细长，三趾鹑科鸟类的通称。
- **大嘴鸟** 以果实为生的非雀形目森林鸟，具有巨大且尖端粗壮的喙，大嘴鸟科的通称。
- **兀鹫** 生活于美国加州的秃鹫。
- **山雀** 栖息在树林和灌丛中的小型雀形目鸟类，喙小而有力，脚强健，觅食动作轻巧敏捷，山雀科的通称。
- **广嘴夜鹰** 夜行性的非雀形目鸟类，喙短而宽，嘴裂较大，猛扑捕捉地面上的猎物，广嘴夜鹰科的通称。
- **飞羽** 大而长的羽毛，着生在翼或尾上，用于飞翔。
- **区** 地理分布区的同义词。
- **王鹟** 生活在热带地区，大多具鲜艳羽色的鹟类，分布在亚洲、非洲和澳洲，王鹟科的通称。
- **王霸鹟** 霸鹟中的一类，攻击性很强，常驱赶其他鸟类、掠夺猎物。
- **开阔森林** 树木和林下植被较稀疏的森林，林内视野开阔，行动方便。
- **无脊椎动物** 不具脊椎骨的小动物，如蠕虫、昆虫、蜘蛛、蜗牛、虾和蟹。
- **五色鸟** 体型小而结实，喙短粗的非雀形目鸟类，栖息在树林和灌丛中，五色鸟科鸟类的通称。
- **太阳鸟** 属于雀形目鸟类，体型小巧而羽色艳丽，以极为纤细的喙和细软的管状舌从花中啜饮花蜜。
- **凤头雨燕** 生活在空中，喙短而宽，翅和尾均长，在空中捕食昆虫，在树上栖落、休息和筑巢，雀形目凤头雨燕科的通称。
- **凤头鹦鹉** 具羽冠的大型澳洲鹦鹉。
- **凤冠雉** 具有长尾和长腿的大型森林鸟，形似狩猎鸟，常栖落在树上，属宝冠鸟科。
- **乌鸫** 体型中等大小的雀形目鸟类，大部分呈黑亮羽色，泛指旧大陆及美洲的几种鸫鸟。
- **爪** 鸟的脚趾末端，坚硬且略有弯曲的部分。
- **引入** 以人为方式将某种鸟类带到非正常的分布区，并已繁殖成数量固定种群。
- **水禽** 指经常在水中、水面上及水边活动的鸟类，涵盖许多种鸟类。
- **水雉** 小型水禽，腿、足、趾和爪均长，漫步于漂浮的水生植物上，水雉科的通称。
- **示蜜鸟** 体型较小的非雀形目鸟类，在枝叶间捕食昆虫，或吃蜂巢中的蜂蜡，示蜜鸟科的通称。
- **石鸫** 夜行性的滨鸟，头和眼均大，栖息在开阔地带，石鸫科的通称。
- **平胸鸟** 指一些大型鸟类，它们不像其他鸟类胸骨上有龙骨突起，因此不能飞行，如：鸵鸟及鸕鸵等。
- **叫鸟** 分布在南美洲的大型水禽，脚趾大而长，但不具蹼，喙短小弯曲，叫声宏亮悠长，叫鸟科的通称。
- **卡拉鹰** 隼科中的一中，捕食弱小且行动迟缓的猎物或腐尸。
- **田鹬** 栖息在沼泽地的鹬科鸟类，以长而纤细的喙，伸入泥滩深处觅食。
- **白鹭** 体型细长，体色纯白的鹭科鸟类，繁殖鸟具细长松软的饰羽。
- **主红雀** 部分的鹟科鸟类，体型类似麻雀，具有鲜艳的羽色，喙强壮，用以食取种子。
- **穴鸟** 喙的上方具有管状鼻孔的海鸟，翅狭窄，飞行迅速，从海面捕捉小动物为食，属水薙鸟科。
- **头罩** 鸟类的头部被同色羽毛所覆盖的区域。
- **尼烈** 羽色暗淡，行动迟缓的非雀形目鸟类，栖息在森林中，从栖枝上飞出追捕昆虫为食，指部分美洲五彩鸟科鸟类。
- **地理分布** 某一种鸟类生活的所有地区，本书的地理分布图，还包括了已人为引入该种鸟类的地区。
- **亚成鸟** 尚无繁殖能力的未成熟幼鸟，羽毛的颜色和图案常与成鸟不同。
- **亚种** 种的地理区分，亚种鸟的某些特征会与同种内的其他亚种不同。
- **百灵** 地栖性雀形目鸟类，外型不显眼，雄鸟以长距离的鸣叫飞行来展示自己，百灵鸟科的通称。

- **过眼线** 从头部两侧穿过眼睛周围的一条不同颜色的带纹。
- **吃蜂鸟** 体型纤细，喙细长，长尾的非雀形目鸟类，从栖落处飞出追捕昆虫为生，吃蜂鸟科的通称。
- **吸汁啄木** 啄木鸟中的一类，在树杆上钻洞吸吮树汁。
- **吸蜜鸟** 小至中型的雀形目鸟类，舌尖特化成刷毛状，从花朵中吸蜜为食，有时也捕食昆虫，吸蜜鸟科鸟类通称。
- **吸蜜鹦鹉** 以觅食花蜜和花粉为生的澳洲鹦鹉。
- **肉瓣** 突出而下垂的裸露皮肤，通常颜色鲜艳，在炫耀时能够膨大。
- **迁徙** 鸟类在繁殖区和非繁殖区之间，进行有规律的季节性迁移。
- **朱鹭** 体型如鹅般大小的涉禽，腿和颈均较长，喙长而向下弯曲，部分朱鹭科鸟类的通称。
- **企鹅** 无飞行能力的海鸟，短腿，着生在体腹后侧；以浆状的窄翅划水在水面下捕食，在陆地上能直立行走，企鹅科的通称。
- **伞鸟** 栖息在雨林中，具有炫耀用的肉瓣、裸皮斑、色彩艳丽或形状奇特的羽毛，雀形目伞鸟科鸟类的通称。
- **色型** 和同种内其他个体不同的羽色类型，色型与性别、年龄和亚种无关，也不是因为遗传变异(变种)而产生。
- **凫** 鸭中的一类，腿较长，常在陆地上行走；在浅水中或泥滩表面觅食，习性似雁类。
- **次生林** 原始的森林被砍伐后，再度长出的树木的新生林，次生林中没有高大的树木，树木的高度都差不多，为鸟类提供了与原始森林不同的栖息地。
- **次级飞羽** 长在翅膀内侧的长飞羽。
- **羽冠** 指鸟的头顶上由羽毛形成的冠。
- **红头美洲鹭** 一种常见的美洲鹭，这个名称有时用来统称整个美洲鹭科。
- **红尾鸲** 具红棕色腰和尾部的鸣禽，属鸲科的一部分；也指某些森莺科中的鸲莺。
- **红树林沼泽** 位在热带港湾和泻湖中的森林栖息地，树木靠长出地面的树根来支撑。
- **红鹳** 生活在碱水中的涉禽类，腿、翅和颈均长，喙短宽而弯曲，用以滤出水中细碎的食物，红鹳科的通称。
- **寿带** 属鹟科，具有细长的尾羽。
- **杜鹃** 杜鹃科鸟类的通称，体型修长，以昆虫为食，栖息在树林、灌丛中或地面上，大多具有巢寄生的习性。
- **极乐鸟** 一种栖息在森林中的雀形目鸟类，雄鸟的羽色绚丽醒目，有时出现奇特的炫耀饰羽，风鸟科鸟类的通称。
- **花蜜** 花的甜汁。
- **苍鹰** 在森林中栖息的大型鹰，翅宽而圆，尾较长。
- **走鸻** 腿长脚小，奔跑迅速的鸻鹬类，生活在干燥而开阔的地带，包括部分燕鸻科的鸟类。
- **拟八哥** 体型细长，羽色亮丽的美洲乌鸫，具有细而渐尖的喙，有些具有长尾；也用来指某些八哥和棕鸟。
- **拟棕鸟** 栖息在热带森林中的大型雀形目鸟类，喙强健、渐尖，编织长的袋状巢，巢群悬挂在大树的枝条上，指一部分的拟黄鹟科鸟类。
- **拟翠鸟** 体态小巧而丰满的非雀形目鸟类，喙细而长，觅食时从栖落处飞出，在空中或枝叶间捕食昆虫，拟翠鸟科通称。
- **求偶舞场** 某些鸟种所特有的一种公共(求偶)炫耀场地；一定数量的雄鸟同时在此炫耀，雌鸟在旁观看，选择其中一只雄鸟交配。
- **秃鹭** 食腐肉的猛禽，头颈全部或部分没有羽毛，指部分美洲鹭科及鹭鸶科鸟类。
- **体羽** 覆盖在鸟的躯干或翅膀上，有保护作用的小片羽毛。
- **伯劳** 凶猛的雀形目鸟类，体型较小，头部大，喙短而粗壮，尖端具钩，捕食小型动物，伯劳科的通称。
- **佛法僧** 体型健壮，头大而喙宽的非雀形目鸟类，具长翅，觅食时常停在栖木上观望，然后猛扑地上的猎物，以波浪式的飞行来炫耀，佛法僧科鸟类的通称。
- **谷食鸟** 以种子为主食的鸟类，粗短的喙可以嗑开或打开种壳，食取里面的种子。
- **鸠** 指部分小型鸠鸽科鸟类，鸽的同义词。
- **灶鸲** 狭义的灶鸲指雀形目森莺科灶鸲属鸟类，它们将巢筑成圆顶状，开口在侧面，很像旧式的烤面包炉；其余几种筑炉灶状泥巢的鸟类，属于灶鸟科，被称为灶鸟，与灶鸲不同。
- **冻原** 由低矮植物构成的栖息环境，通常是两极地区附近的湿地，下层的土壤在冬季结冰，夏季时表层土壤解冻，长出低矮植物。
- **初级飞羽** 长在翅膀外侧的长羽毛。

- **松鸡** 体型粗壮，羽毛浓密，在地面上生活的狩猎鸟。
- **刺嘴莺** 小型的雀形目鸟类，以昆虫为食，喙短而薄，刺嘴莺科的通称。
- **画眉** 翅短圆、脚强健，栖息在森林和灌丛中，常集成嘈杂的小群；雀形目画眉科鸟类的通称。
- **雨林** 热带常绿森林，一年四季雨水充沛。
- **雨燕** 长期在空中生活的非雀形目鸟类，翅狭长，喙短而宽，在甯捕食昆虫。雨燕的脚很小，只能停在岩石表面而无法栖息在树枝上，雨燕科的通称。
- **矿鸟** 中等体型，具有群居性的一种吸蜜鸟。
- **欧亚大陆** 欧洲和亚洲大陆及邻近岛屿的总称。
- **鸢鹰** 体态轻盈的猛禽，翅长，尾常呈叉状，飞行敏捷，捕食弱小的猎物或食腐肉，属鸢鹰科的一部分。
- **非雀形目鸟类** 雀形目鸟类以外的种类（参照 38 页）。
- **非繁殖羽** 雄鸟艳丽的繁殖羽脱换后，长成具有伪装效果的羽毛。
- **鸣叫** 鸟类发出的短音，纯粹只是用于传递信息，与鸣唱不同。
- **鸣禽** 作家对于雀形目鸟类的泛称。
- **岩鹡** 体型似麻雀，喙薄而尖的鸟，岩鹡科鸟类的通称。
- **果鸠** 栖息在树林和灌丛中，以觅食树上的果实为主的鸽形目鸟类。
- **果鸦** 体型以鸦，以果实为主食的伞鸟，具有鲜艳的羽斑。
- **侏儒鸟** 体型小巧、羽色艳丽，食果实的雀形目鸟

类，栖息在森林和灌丛之中，侏儒鸟科的通称。

- **爬刺莺** 能在枝干上奔跑捕食昆虫的鸟类统称：雀形目旋木雀科、纹雀科和短嘴旋木雀科鸟类均属之。
- **金刚鹦鹉** 生长在南美和中美洲的鹦鹉，尾较长，喙强壮，以体型庞大而闻名。
- **夜鹰** 夜间飞行的非雀形目鸟类之一类，翅和尾均长，嘴和喙较宽，在空中飞捕昆虫，夜鹰科的通称。
- **浅洼** 地面上的巢洞，是鸟类在地面上转动身体挤压，并用脚后踢所形成的凹洞。
- **泥滩** 海滨、海湾或宽阔河流因潮汐作用形成的泥地。
- **卷尾** 指雀形目卷尾科鸟类，机警、敏捷，喙强而有力，大多为黑色，从栖枝上飞出捕食昆虫。
- **细尾鹩莺** 产于澳洲的小型雀形目鸟类，细长的尾羽常常翘起，细尾鹩莺科的通称。
- **织布鸟** 小型雀形目鸟类，喙强壮，能嗑开种子，大多以新鲜的植物纤维筑巢，织布鸟科的通称。
- **帮手** 在筑巢和孵化阶段为亲鸟提供帮助的其他同种鸟类。
- **型** 色型的同义词。
- **型，类型** 种的变化词，有三种含义：(1)使用于指称一类已被确认的亚种；(2)指由两个以上的亚种组成的大范围种群；(3)种内的某一个色型。
- **树栖鸟** 脚适于抓握水平生长的树枝，站立或休息的鸟类，通常生活在树木或灌丛中；树栖鸟并非一定为雀形目鸟类。
- **树鸭** 腿和颈较长的鸭类，

常群居，叫声如同嘈杂的哨音，有些在树上休息、筑巢。

- **鸫** 脚强健有力，喙短而坚实，在枝干上觅食，能用喙凿开坚果，雀形目鸫科的通称。
- **胡椒鸫** 体态笨重，喙粗壮且尖端具钩的绿鸫。
- **草鸮** 腿较长的猫头鹰，面盘呈心形，草鸮科其中一种。
- **草地** 指一大片广阔空旷的地区，主要植物为各种高矮不一的草本植物。
- **砂鸡** 喙短而翅长的非雀形目鸟类，腿部覆羽，生活在干旱、开阔的陆地，外型似狩猎鸟，砂鸡科的通称。
- **砍林鸟** 体型细长的雀形目鸟类，在枝杆上攀爬，有时用尾羽支撑身体；不同种之间喙的形状变化多端，长短粗细不一；砍林鸟科的通称。
- **厚头啸鹟** 头部较大的雀形目鸟类，喙强壮或尖端具钩，鸣声洪亮悦耳，厚头啸鹟科的通称。
- **面盘** 猫头鹰两眼周围的羽毛形成的两个半圆形结构，使脸部看起来像一个心形盘子。
- **鸕** 具蹼足的水鸟，常生活在海滨，具强壮的喙，捡食垃圾，有些捕食为生，属鸕科。
- **鸦** 大型的雀形目鸟类，一般为黑色，在地面觅食，泛指所有的鸦科鸟类。
- **鸦雀** 小型的雀形目鸟类，喙短而粗壮，擅于从芦苇或竹茎中啄食昆虫，文须雀科的通称。
- **鸦鹃** 体态苗条的非雀形目杜鹃科鸟类，飞行能力较差，隐藏在植被中，在地面以奔跑的方式行动。
- **咬鹃** 树栖性非雀形目鸟类，体型坚实，尾长，头

- 圆，喙短而宽；觅食时从栖落处飞出在半空中捕食昆虫，或悬在空中食果实，咬鹃科的通称。
- **蚁鸟** 雀形目蚁鸟科的通称，栖息在雨林中，捕捉被蚁群惊起的昆虫等无脊椎动物为生。
 - **钟雀** 生活在森林中，鸣声宏亮似钟声，指称某几种伞鸟科和吸蜜鸟科鸟类。
 - **钟鹊** 栖息地位在树林和灌丛中，用强壮而具钩的喙捕食，并把猎物插在荆棘或夹在树枝间吞食，雀形目铃鹊科鸟类的通称。
 - **种** 具有共同起源，可以相互交配并产生可繁衍后代的个体集合。
 - **适应** 鸟类的生理结构和行为为符合现存的生活环境而产生进化。
 - **信天翁** 翅膀狭长的海鸟，常长距离飞翔，在岛屿上筑巢繁殖，信天翁科鸟类的通称。
 - **皇鸠** 羽色暗淡，属于鸠鸽科鸟类的大型果鸠。
 - **独居** 指鸟类总是单独或成对生活，不与同种的其他个体联系。
 - **狩猎鸟** 指可捕猎的雉科鸟类而言：人类常为满足食欲或只为娱乐而猎捕它们。
 - **胆怯** 生性胆小的鸟类，随时准备躲藏到植被或其他遮蔽物中。
 - **鸕** 生活在开阔地带的鸟类，体型大小似鹅，脚小，颈长，具有长而强健的腿，鸕科鸟类的通称。
 - **炫耀** 鸟类为表明性兴奋或攻击欲望等情感，而作出引起注意的行为。
 - **美洲五彩鸟** 体型健壮，羽毛蓬松的非雀形目鸟类，喙短而粗壮，常从栖落处飞出，到附近的植被中捕捉猎物，属美洲五彩鸟科。
 - **美洲乌鸫** 指分布在美洲，羽色乌黑的雀形目鸟类；有时也指拟黄鹀科。
 - **美洲秃鹰** 食腐肉的鸟类，分布在美洲，体型较大，头部裸露，美洲秃鹰科鸟类的通称。
 - **美洲夜鹰** 分布在美洲地区的夜鹰，常在白天飞行。像其他夜鹰一样，外形像鹰隼。
 - **冠雉** 形似狩猎鸟的树栖鸟，腿长而强健，具裸露的肉瓣，宝冠鸟科的部分鸟类。
 - **绒羽** 结构蓬松的羽毛，构成部分或全部的羽毛，有保温和隔热的功能。
 - **栖息地** 某种鸟通常栖息的环境类型。
 - **栖落** (1) 鸟类休息或过夜；(2) 鸟类休息和过夜的场所；(3) 许多鸟一同休息或夜宿的场所；昼行性鸟类在夜间休息，夜行性鸟类则在白天休息。
 - **桉树灌丛** 生长在半干旱地带的低矮桉属林地，树木的枝干很多。
 - **莺** 以昆虫为食，啼唱声优美悦耳，指雀形目莺科和森莺科鸟类；也用来指某些刺嘴莺科鸟类。
 - **撿拾** 游荡寻找食物并啄起。
 - **鸕** 小至中型的雀形目鸟类，喙细长，鸣唱声十分悦耳，鸕科的通称。
 - **鸕鹚** 体型细长且具蹼足的水禽，能游泳并在水面下捕鱼，鸕鹚科鸟类的通称。
 - **鸭** 大部分时间生活在水中的水禽，以宽扁的喙从淤泥或水中滤食。
 - **鸕鹚** 体型细长的小型雀形目鸟类，喙薄而尾长，在树木和灌丛中捕食昆虫，鸕鹚科的通称。
 - **秧鸡** 体型小而细长，具长腿的非雀形目鸟类，通常栖息在沼泽或草原中，秧鸡科的通称。
 - **造园鸟** 指雀形目造园鸟科鸟类，雄鸟会以细枝筑成像凉亭一样的构造，吸引雌鸟前来交配。
 - **隼** 体型强壮的猛禽，翅渐尖，喙粗短且略有弯曲，隼科鸟类的通称。
 - **鸕** 用于指雀形目鸕科和鸕鹚科的部分鸟类，体型较小，大多数的鸕类胸部羽色为橙黄、红色或粉色，非显眼。
 - **留鸟** 一生中都在某个特定区域生活的鸟类。
 - **唐加拉雀** 雀形目鸟类，羽色艳丽，大多栖息在热带林和灌丛中，属唐纳雀科；大多具有能够嗑开种子的喙，但以果实为主食。
 - **海雀** 体型似企鹅的海鸟，有飞行能力，靠双翅推进潜水觅食，而不是用脚在水中活动；海雀科鸟类的通称。
 - **海燕** 小型穴鸟，常在低空拍翅飞行，海燕科鸟类的通称。
 - **浮游生物** 在海水或湖泊中游动、漂浮的小型动、植物所组成的生物混合群落。
 - **家禽** 一些为了符合实用、美观或其他需求，而在农场或笼养繁殖的鸟类。
 - **冢雉** 体型如家鸡般大小的地栖性鸟类，它们会筑起土堆，把蛋放在其中孵化，或在温暖的地上掘洞孵蛋，冢雉科的通称。
 - **扇尾鸟** 生活在森林或灌丛中的王鸕，在叶簇间捕食昆虫时展开或翘起扇状尾羽；属王鸕科的一部分。
 - **展示** 鸟类为了向其他个体表示自己的存在而作出的炫耀行为。
 - **姬啄木** 体型小巧的啄木

- 鸟。
- **绣眼** 一种体型小巧的雀形目鸟类，栖息在树林和灌丛中，喙小而纤细，眼周有羽毛构成的白环，绣眼科的通称。
 - **理羽** 鸟类用喙和爪梳理身上的羽毛，保持整洁。
 - **梅花雀** 体型小巧可爱的雀形目鸟类，喙强健，能嗑开种子，羽色通常为鲜红或橙黄色，梅花雀科的通称。
 - **菲比霸鹟** 霸鹟中的一类，因叫声如“菲一比”而得名。
 - **黄鹌** 行动敏捷，喙细长的雀形目鸟类，栖息在树林或灌丛上层枝叶中，觅食果实和昆虫；此所称的黄鹌，指旧大陆黄鹌科和一部分美洲拟黄鹌。
 - **盔** 从鸟的头部或喙部向上长出的坚硬角质结构。
 - **雀** 体型小，羽色暗淡，用以嗑开种子的喙短而结实，指雀形目雀科及一部分的鹀科鸟类。
 - **雀鸟** 雀科鸟类的通称，体型似麻雀，喙短粗，擅于嗑开种子；此词也常指形态与雀类相似的其他科鸟类，如梅花雀。
 - **雀形目鸟类** 属于雀形目的鸟类，通常为树栖鸣禽（参照 244 页）。
 - **雀鹰** 小型鹰，翅短圆，尾和爪均长，擅于捕食小鸟。
 - **啄木鸟** 啄木鸟科鸟类通称，常在枝干上攀爬，部分依靠尾羽来支撑身体；喙强壮而渐尖，能够在树木上凿洞。
 - **啄果鸟** 体型较小的雀形目鸟类，喙短小，在树冠中捕食昆虫，属于啄花鸟科。
 - **眼圈** 眼周围由羽毛或裸皮所形成，与脸部羽毛颜色不同的窄环。
 - **蛇鸟** 蛇鹈的同义词。
 - **蛇鹈** 生活在北美洲的蛇鹈类之一，也是世界上其他三种蛇鹈的通称。
 - **蛇鹈类** 颈长似蛇，喙薄如剑，具蹼足的水禽，在水面下游泳、捕鱼；蛇鹈科鸟类的通称。
 - **鸻** 鸻形目鸻鸟类的通称，头圆，喙较短，典型觅食方式是在开阔的地带短距离奔跑，捕食地面上的小昆虫之类的猎物。
 - **领域** 一只、一对或一小群鸟，为了觅食或筑巢所防御的区域，不允许其他鸟类进入，领域面积的大小不同，小至围绕该鸟的一小块面积，大至数平方公里。
 - **鸽** 羽毛柔软浓密，头小而圆，鼻孔由鲜润的蜡膜覆盖，叫声为“咕咕”声，有些种类树栖，有些则地栖，能快步行走，鸽形目鸠鸽科鸟类的通称。
 - **猎禽** 以捕猎为生的鸟类，多指昼行性猛禽，有时也指捕食比昆虫大的猎物的陆栖鸟，包括猫头鹰、贼鸥和伯劳等等，但只捕食昆虫和鱼的鸟类不包括在猎禽的定义之内。
 - **猫鸟** 指称能像猫一样发出“喵呜”声的鸟类，如：嘲鸫科的灰猫嘲鸫，造园鸟科的绿猫鸟等等。
 - **猫头鹰** 大多为夜行性猛禽，眼大，位于面盘之中，脚爪强健有力适于抓握，飞行时悄然无声，鸱鸃科和草鸱科之统称。
 - **猛禽** 猎禽的同义词。
 - **族类** 亚种的同义词。
 - **旋木雀** 小型鸣禽，喙纤细而略向下弯，攀援在枝干上，有些用尾羽支撑身体，旋木雀科和短嘴旋木雀科鸟类的通称。
 - **旋蜜雀** (1)指唐纳雀中的一类，用细长的喙吸取花蜜，有时归入裸鼻雀亚科；(2)指形似雀类，同种间喙形多变的管舌鸟科鸟类，栖息于岛屿上。
 - **情侣鸚鵡** 体型较小，喙纤细，尾短的非洲鸚鵡，通常成对生活，彼此联系密切。
 - **隐蜂鸟** 蜂鸟中的一类，在森林中独居。
 - **维达鸟** 具长尾的织布鸟，通常把蛋寄生在梅花雀的巢中。
 - **绿鸠** 食果实的鸽形目鸟类，羽毛为伪装而呈绿色，栖息在林木和灌丛中。
 - **绿鹇** 体型小而细长的一种雀形目鸟类，具短而坚实的喙，在枝叶间捕食昆虫，绿鹇科的通称。
 - **绿霸鹟** 羽色单调的小型霸鹟，因鸣声得名。
 - **琵鹭** 生活在浅水中的大型涉禽，具有长腿和长颈，以其扁阔而钝圆的杓状长喙，从水中滤出食物，属朱鹭科。
 - **棕鸟** 体型细长的雀形目鸟类，喙锋利，用于觅食昆虫和果实，部分八歌科鸟类称之。
 - **棕色** 一种偏红的颜色。
 - **鹀** 体型似麻雀，以种子为食，用短而坚实的喙嗑开硬壳，部分鹀科鸟类的通称。
 - **森燕** 头大，喙短而宽，翅膀较长，小群在空中追捕昆虫，雀形目森燕科的通称。
 - **雁** 腿长，喙短粗有力的水禽，擅于行走、以草类或刨挖植物的根为生。
 - **搜寻** 在某一区域上空游曳以寻找食物。
 - **蛰伏** 鸟类暂时的休眠，此时鸟类不活动，降低体

- 温以保存能量。
- **辉棕鸟** 属于八哥科中的一类，羽色闪亮鲜艳。
 - **喇叭鸟** 栖息在森林中的非雀形目鸟类，主要在地面活动，颈长、头圆、腿长而强健，叫声低沉，喇叭鸟科的通称。
 - **啼唱** 鸟类为了显示自己的存在，或向异性炫耀而发出的叫声，这种声音通常十分精巧，种与种之间有特异性。
 - **黑燕鸥** 羽色暗淡的燕鸥，前额颜色较浅，对偶成鸟常在巢边相互点头炫耀。
 - **猛** 翅膀宽阔的猛禽，捕食动物或食取腐肉，部分鸢鹰科的鸟类称之。
 - **猛鹰** 猛禽中的一种，翅狭长，用于在低空滑翔，腿和尾均较长，指部分鸢鹰科的鸟类。
 - **阔嘴鸟** 指雀形目阔嘴鸟科鸟类，栖息在森林中，体型非常强壮，具有宽阔的喙。
 - **温顺** 在本书中指鸟类不害怕人的特征。
 - **游荡** 指鸟类无一定目的和方向的漫游。
 - **游禽** 具蹼足的水禽，包括有鸭、雁和瘤鸭等雁鸭科鸟类。
 - **鸬鹚** 体态笨拙的水禽，喙形狭长，在喙和喉部有一个可膨胀的皮囊垂下，鸬鹚科的通称。
 - **窝卵数** 一对亲鸟或对偶鸟一次孵化的卵总数。
 - **鸱** 小型的地栖性鸟类，腰部白色，引人注目，属鸱科的一部分。
 - **犀鸟** 非雀形目鸟类，翅和尾均长，长而略弯的喙上常覆盖着角质盔；犀鸟科为树栖鸟，地犀鸟科则只在地面觅食。
 - **属** 由共同祖先演化而来，关系密切的种的集合。
 - **鹞** 一类体型小巧而丰满的地栖性狩猎鸟，尾较短。
 - **蜂鸟** 体型小巧，羽色鲜艳的非雀形目鸟类，喙纤细，常悬空从花朵中吸食花蜜，蜂鸟科的通称。
 - **鹌** 雀形目鹌科鸟类称之，主食果实，鸣声悦耳。
 - **鼠鸟** 体型小而丰满，羽色鼠灰色的非雀形目鸟类，具长尾，以树叶和嫩芽为食，鼠鸟科的通称。
 - **腰部** 鸟背的较低处，位在尾巴之上、双翅合拢时的翅尖之下。
 - **鹳** 腿和颈细长，喙尖而笔直或略向上弯曲的鹳科鸟类。
 - **雏鸟** 需要留在巢中，由成鸟照料的幼鸟。
 - **鹇** 体型粗壮的地栖性狩猎鸟，尾短，翅圆。
 - **滨鸟** 生活在水边的非雀形目鸟类，常在地面行走、奔跑，腿、翅和颈较长，包括鸻、鹬及其他习性相似的鸟类。
 - **裸鼻鸱** 羽毛柔软的非雀形目鸟类，头和眼均较大，喙短而宽，会从栖枝上向猎物猛扑，裸鼻鸱科的通称。
 - **群** 由数个个体组成的小团体。
 - **群体** 由于社群性而使一群鸟聚集并生活在一起。
 - **群巢** 指繁殖鸟群彼此在附近筑巢，也指巢群的所在地。
 - **模仿** 鸟类能模仿其他鸟种的啼唱和鸣叫，或偶尔听到声响的能力。
 - **歌鹰** 生活在开阔地带、体型细长的猛禽，外型较不同于一般的鹰。
 - **碱水沼泽** 海滨平坦地带的沼泽，该处的水为碱水。
 - **翡翠** 大型的翠鸟，叫声嘈杂，具强壮坚实的喙，常离水源生活。
 - **蜡嘴雀** 形似麻雀的鸟，用于嗑开种子的喙十分强壮，指雀科的部分种类及鹀科的主红雀。
 - **孵化** 持续提供蛋温暖，使蛋内的胚胎得以发育。
 - **腐肉** 动物的尸体中被鸟类或其他食腐动物食取的腐烂部分。
 - **寡妇鸟** 具长尾，无巢寄生习性的织布鸟，因具有黑色长尾而被称为“寡妇”鸟。
 - **翠鸟** 栖息在热带森林中的非雀形目鸟类，尾长而下垂，喙长且强壮，常站在栖枝上观望，然后猛扑猎物，翠鸟科的通称。
 - **翠鸟** 头大、喙如短剑的非雀形目鸟类，大多以喙插入水中捕捉昆虫和鱼为食，有些在地面上觅食，翠鸟科的通称。
 - **蕉鹃** 体型细长，羽毛松软的非雀形目鸟类，栖息在树林和灌丛中，尾长，翅圆、喙粗短，以果实为食，尖帽科鸟的通称。
 - **鸺鹠** 栖息在低矮植被中，与鸺相似的雀形目鸟类，喙纤细，在落叶中探寻食物。
 - **鹟** 指分布在欧亚大陆和非洲的鹟科鸟类。
 - **鹟类** 雀形目中的一类，能从栖枝上跃飞至空中捕捉猎物，然后再返回原处吞食，包括鹟科、王鹟科及霸鹟科。
 - **鹟** 体型细长的雀形目鸟类，尾较长，活动时尾部会上下摆动，指称部分的鹟科鸟类；也用于指某些外形似鹟的鹟和霸鹟。
 - **瘤鸭** 大型水禽，以游水为主，身型较长，腿短，用

细长的颈伸到水面下觅食水生植物。

- **潜鸟** 身体呈流线形的水禽，脚位在体腹的后端，擅于在水中追捕猎物，潜鸟科鸟类的通称。
- **潜鸭** 在水面下游游泳觅食的鸭类，用蹼足划水前进。
- **潜海燕** 形似穴鸟的海鸟，在波浪中潜泳和穿梭，觅食浮游生物，潜海燕科鸟类的通称。
- **鹤** 高大的非雀形目鸟类，具有长颈和长腿，喙短而尖利，经常出没在靠近水边的开阔地带，鹤科鸟类的通称。
- **燕** 小型的雀形目鸟类，喙短而宽阔，翅狭长，尾分叉，在栖枝上休息，在空中追捕昆虫为生，燕科的通称。
- **燕鸥** 属鸬形目燕鸥科，喙短而宽，眼大，尾羽呈分叉状，在空中飞捕昆虫为食。
- **燕鸥** 生活在海上或内陆的水禽，翅狭长而渐尖，喙尖，通常为叉形尾。从空中向下俯冲入水中捕捉猎物，燕鸥科的通称。
- **噪钟鹊** 喙大，形似乌鸦的雀形目鸟类，属铃鹊科。
- **噪鹊** 画眉中的一类，鸣声像笑声，常很多只鸟一起“合唱”。
- **鸚哥** 对原产于南美洲的鸚鵡的一般称呼。
- **鸚鵡** 非雀形目鸟类，脚强健，擅于抓握，喙短而强壮，尖端具钩，能够灵巧的咬开食物，鸚鵡科的通称。
- **雕** 强壮的大型猛禽，行动敏捷，以猎捕其他动物为生，为鹰科的一部分。
- **鸛** 形似鸛类的狩猎鸟，常栖息在开阔地带，在地面上觅食，属雉科。
- **鸛** 体型小，羽色暗淡，地

栖为主的雀形目鸟类，具有纤细的食虫喙，常在地面上奔走，不能蹦跳，属鸛科的一部分。

- **鸛** 鸛科中的一类，树栖，羽色艳丽，性性喧闹，具社群行为。
- **鸛** 生活在低矮植被中的雀形目鸟类，喙短而纤细，尾羽常翘起，鸛科的通称；有些与鸛外形相似的刺鸛科、细尾鸛科和刺嘴鸛科鸟类也称鸛。
- **鹭珠鸡** 体型结实的一种狩猎鸟，尾羽较短，大多栖息在气候干旱的开阔地带。
- **鸛** 体型细长的鸛科鸟类通称，腿、翅、颈和喙均长。
- **鸛** 地栖性的非雀形目鸟类，飞行能力有限，头小，颈长，腿长且强健，鸛科的通称。
- **翼带** 颜色鲜艳的条带，与翼展平行。
- **翼斑** 位在翅膀上的鲜艳色斑或白色斑纹。
- **覆羽** 生长在翅膀和尾部周围的体羽，有些覆盖住大片飞羽的基部。
- **鹭** 属于涉禽中的一类，具长腿、长颈、宽阔的翅膀和短剑般的喙，常涉水捕鱼，鹭科鸟类的通称。
- **鹰** 猛禽中的一种，行动敏捷，捕食活的动物。
- **鸛** 外形似鸛的猫头鸛；鸛科中面盘较小，喙较突出的澳洲猫头鸛也称之。
- **鸛** 颈细长、喙尖的水禽，尾羽甚短，在水下靠瓣足推进，追捕猎物，鸛科的通称。
- **鳞状图案** 由外缘颜色较深或较浅的圆形羽毛，重叠生长而成的羽饰图案。
- **灌丛** 植被类型之一，由灌

木、矮树或二者混合而成，面积大小不一，通常浓密而且带刺。

- **霸鸛** 产于美洲地区的鸛类。
- **鸛** 鸛科通称，具有长腿和长颈，喙长而渐尖的大型鸟类；能在陆地上行走，也能在河、湖及沼泽等浅水区域涉水前进。

鄧子知
雅

PDG

中名笔画索引

二 画

七彩文鸟.....369
九宫鸟.....378
刀嘴海雀.....156
刀嘴蜂鸟.....214

三 画

三光鸟.....314
三趾鸥.....151
三趾滨鹬.....145
大鹄鸨霸鹟.....252
大刀嘴凤冠雉.....107
大极乐鸟.....387
大青鹭.....59
大夜鹰.....203
大型冠郭公.....188
大蚁鸱.....248
大食蝇霸鹟.....256
大鸨.....130
大贼鸥.....147
大黄脚鹬.....142
大眼斑雉.....117
大盘尾.....381
大斑啄木.....241
大鹃鸱.....273
大蓝八色鸟.....265
大裸鼻鸱.....205
山蓝鸲.....289
山鹬.....144



川秋沙.....85
广嘴夜鹰.....204
小山雀.....320
小长尾鸬.....162
小地雀.....338
小灰头稚冠雉.....106
小沙百灵.....267
小夜鹰.....205
小海雀.....156
小绿阔嘴鸟.....244
小绿鹭.....62
小黑鸨.....130
小嘲鸫.....284
小嘴鸫.....139
小雕.....99
小辫鸫.....137
叉尾太阳鸟.....328
叉尾妍蜂鸟.....211
叉尾霸鹟.....257
马来鱼鸬.....198
马来冠鸦.....388
马来犀鸟.....231
马岛冠卷尾.....380
马拉巴鸚鵡.....179

四 画

巨地鸬.....163
巨蜂鸟.....213
巨嘴沙雀.....362
巨鹭.....60
巨鸬.....49
王风鸟.....386
王绒鸭.....82
王鹭.....88
王霸鹟.....252
无须夜鹰.....204
云雀.....268
木百灵.....268
太平鸟.....279
太平洋鸥.....148
太平洋鸚哥.....178
太阳鸚哥.....181
公主鸚鵡.....174
凤头鸬.....43
凤头山雀.....321

凤头卡拉鹰.....101
凤头百灵.....267
凤头雨燕.....209
乌林鸮.....200
牛背鹭.....61
牛霸鹟.....256
毛发啄木.....241
毛脚燕.....270
长尾鸮.....200
长尾贼鸥.....147
长尾辉棕鸟.....374
长尾阔嘴鸟.....244
长尾霸鹟.....255
长刺歌雀.....356
长冠八哥.....375
长脚白腰海燕.....52
长脚秧鸡.....125
长靴拍尾蜂鸟.....214
爪哇禾雀.....368
反嘴鸫.....134
丹顶鹤.....120
文须雀.....300
火簇拟啄木.....234
双色树燕.....269
双冠鸬.....56
双眼无花果鸚鵡.....176
双领鸫.....140
双斑草雀.....367
孔雀石色花蜜鸟.....327
孔雀雉.....115
丑鸭.....83
巴布亚吸蜜鸚鵡.....170
巴西肿嘴雀.....344
水蒲苇莺.....302
水雉.....131

五 画

扑动鹭.....242
艾草榛鸡.....109
示蜜鸟.....233
古巴离草雀.....338
石鸡.....111
布布克鹰鸮.....202
东玫瑰鸚鵡.....174
东非冕鸮.....121

东美洲王霸鹟·····257
 东黄鹟鹀·····317
 东菲比霸鹟·····253
 东蓝鹟·····288
 北方大鹰·····95
 北方山齿鹀·····110
 北方白腹穴鸟·····50
 北方尖尾鸭·····80
 北方鲚鸟·····55
 北朱雀·····363
 北极海鹦·····157
 北美杜鹃·····190
 北美金翅·····361
 北美蚊霸鹟·····253
 北美旋木雀·····324
 北美黑啄木·····243
 卡佛食蜜鸟·····333
 卢鹀·····334
 田鹀·····292
 田鹀·····144
 凹嘴鹳·····68
 印加燕鸥·····154
 印度八色鸟·····264
 丛山雀·····319
 丛冢雉·····106
 白兀鹫·····92
 白兀鹫·····92
 白头海雕·····90
 白头硬尾鸭·····85
 白头鹳·····66
 白羽吸蜜鸟·····331
 白羽蚁鸟·····249
 白尾金喉蜂鸟·····212
 白尾热带鸟·····53
 白尾鹟·····288
 白尾海雕·····91
 白肩长尾鹳伯劳·····276
 白面鹭·····59
 白秋沙·····84
 白眉丝刺莺·····312
 白眉金鹀·····189
 白眉鸦鹑·····193
 白眉短嘴旋木雀·····324
 白翅交嘴雀·····364
 白翅原鹑鹑·····272
 白胸鹑·····323
 白盔林鹀·····277
 白啄木鸟·····239
 白脸角鹀·····195
 白脸刺莺·····313

白颈九官鸟·····377
 白颈渡鸦·····395
 白颈翠鸟·····222
 白斑翅雪雀·····370
 白颊山雀·····321
 白喉针尾雨燕·····209
 白喉带鹀·····336
 白喉蜂虎·····224
 白腰朱顶雀·····362
 白腹灰蕉鹀·····186
 白腹灯草鹀·····336
 白腹沙鸡·····158
 白鹡鸰·····271
 白额拾叶雀·····247
 白额拾叶雀·····247
 白鞘嘴鹀·····146
 白燕鸥·····155
 白嘴潜鸟·····46
 白鹳·····66
 主红雀·····340
 玄燕鸥·····154
 穴居鹀·····201
 闪耀紫耳蜂鸟·····210
 加州兀鹫·····87
 加州星鸦·····392
 加利福尼亚鹀·····109
 加拿大黑雁·····75
 加拿大鹤·····119
 圣文森亚马孙鹦哥·····184
 尼罗雉·····135

六 画

地中海隼·····104
 地鸱·····164
 地啄木·····238
 圭拉鹀·····191
 亚洲和平鸟·····275
 亚高山林莺·····306
 西林绿霸鹟·····253
 西美草地鹀·····358
 灰鸱鹀·····318
 灰鹡鸰·····271
 灰小鹀·····316
 灰白喉林莺·····306
 灰头皇鸠·····167
 灰头银嘴文鸟·····368
 灰顶绿鹀·····354
 灰林鹀·····199
 灰泽鹭·····94
 灰背信天翁·····49



灰背隼·····103
 灰背雀百灵·····267
 灰钟鹀·····383
 灰翅弯嘴吸蜜鸟·····329
 灰胸捕蛛鸟·····328
 灰鸵鹀·····382
 灰猫嘲鹀·····284
 灰斑鹀·····139
 灰喜鹊·····391
 灰雁·····74
 灰喉裸鼻雀·····345
 灰蓝蚋莺·····300
 灰腹绣眼鸟·····328
 灰鹳·····121
 尖羽树鸭·····72
 尖喙鸟·····263
 光彩辉椋鸟·····376
 吕宋鸡鸠·····165
 肉垂拟太阳鸟·····265
 肉垂秃鹫·····91





竹鸡·····112
朱红霸鹟·····254
朱胸朱顶雀·····362
朱腹岭裸鼻雀·····345
休里霸鹟·····251
优鸦鹟·····303
伪装情侣鹦鹉·····177
华丽琴鸟·····266
企雕·····98
杂色鹇·····323
壮丽果鸠·····167
安娜蜂鸟·····216
安第斯山峰鸟·····213
安第斯动冠伞鸟·····262
军舰鸟·····58
红头美洲鹭·····86
红头拟啄木·····234
红头缝叶莺·····304
红耳鸭·····81
红尾鹭·····96
红尾希鹇·····298
红顶侏儒鸟·····261



红背伯劳·····278
红背细尾鹟莺·····310
红背翠鸟·····222
红点颊·····287
红冠水鸡·····126
红冠蜡嘴鹀·····339
红冠蕉鹃·····187
红翅旋壁雀·····322
红翅黑鹇·····356
红隼·····102
红胸八色鸟·····264
红胸黑雁·····76
红眼绿鹇·····355
红领寡妇鸟·····372
红领瓣足鹇·····143
红脸地犀鸟·····231
红脸森莺·····304
红颈蜂鸟·····216
红颊鹇·····274
红喉鹇·····309
红喉鹦雀·····367
红喙弯嘴犀鸟·····230
红喙镰嘴鸟·····245
红腰穗鹇·····296
红腹灰雀·····364
红腹角雉·····113
红腹啄木·····240
红腿叫鹤·····129
红腿鸬鹚·····57
红寡妇鸟·····372
红褐雀·····366
红玉冠戴菊·····308
红额金翅·····361
红燕鸥·····153
红嘴鹇·····237
红嘴鸥·····150
红嘴蓝鹇·····391
红鹇·····71

七 画

寿带蜂鸟·····212
杜鹃·····188
杓鹇·····141
丽色彩鹇·····341
苇鹇·····282
花头鹇·····179
花鳧·····77
花彩雀莺·····308
花魁鸟·····157
苍头燕雀·····360

苍鹭·····58
苍鹰·····95
走鹃·····192
赤叉尾蜂鸟·····212
赤灰长尾鸠·····161
赤红山椒鸟·····272
赤足鹇·····142
赤须夜蜂虎·····224
赤胸拟啄木·····235
赤胸花蜜鸟·····326
赤黄拾叶雀·····274
赤褐钩嘴鹇·····279
折衷鹦鹉·····173
吼海雕·····90
呆头伯劳·····278
里海燕鸥·····152
针尾侏儒鸟·····259
秃吮蜜鸟·····330
秃鼻鹇·····394
秃鼻鹇·····394
秀丽伞鸟·····261
伯克氏鹦鹉·····176
角鹇·····195
角雕·····97
条纹侏儒鸟·····259
条纹鹰·····95
库氏地鹇·····291
库氏圆尾鹇·····51
沙燕·····269
沟嘴鹇·····189
陆地百灵·····268
阿德利企鹅·····45
鸡尾鹦鹉·····172
纵纹腹小鹇·····201
纹胸星喉蜂鸟·····215
纽西兰鸠·····168
纽西兰秧鸡·····124

八 画

环颈鹇·····140
环颈雉·····115
环喉雀·····368
环嘴鸥·····148
玫胸白翅斑雀·····340
青山雀·····322
青铜花蜜鸟·····327
青绿顶鹇·····183
青绿鹇·····176
林三趾鹇·····118
林岩鹇·····283

林柳莺·····305
林鸳鸯·····78
林铜翅鸫·····162
林鹳·····65
板嘴山鸫·····236
松金翅·····360
松雀·····363
刺草地鸫·····164
刺鹳·····265
杰克逊氏寡妇鸟·····373
奇异鸟·····42
拍尾佛法僧·····227
拍尾蜂鸟·····211
披肩笑翠鸟·····221
欧亚鸲·····286
欧洲八哥·····375
欧洲石鸫·····134
欧洲雨燕·····208
欧洲夜鹰·····207
欧斑鸫·····160
鸢鹰·····89
虎皮鹦鹉·····177
非洲灰鹦鹉·····175
非洲秃鹳·····67
鸣角鸲·····196
鸣冠雉·····107
帕拉拟黄鹂·····357
帕拉夜鹰·····206
岩鹳·····283
罗氏·····151
和尚鹦哥·····182
彼斯奎氏鹦鹉·····173
乳脂色啄木·····242
金丝雀·····360
金刚鹦鹉·····180
金色唐加拉雀·····347
金肩鹦鹉·····175
金厚头啸鹟·····319
金冠戴菊·····307
金翅·····361
金胸鹳·····334
金胸棕鸟·····376
金黄鹂·····379
金领侏儒鸟·····259
金斑鸫·····138
金腰歌雀·····346
金鹳·····271
狐色带鹳·····335
夜鹭·····62
河乌·····280

波纹林莺·····307
波斑穴鸫·····43
泽鳉·····82
宝石姬地鸫·····164
卷羽鹁鹑·····54
孤鸫·····42
线尾侏儒鸟·····260
线纹蚁鸫·····248

九 画

珍珠爬树雀·····247
珊瑚嘴地鸫·····192
树雀鹳·····337
胡兀鹫·····92
胡翁吸蜜鸟·····332
南大苇莺·····302
南方白顶林鸫·····276
南非丛林伯劳·····278
南非红翅棕鸟·····374
南美拟鹭·····129
草鹳·····194
草地鹳·····272
草莺·····301
草原拟黄鹂·····355
草绿篱莺·····302
茶腹鹳·····323
带鱼狗·····219
带斑蚁鸫·····248
厚嘴棉鳧·····77
点斑大亭鸟·····386
点斑耳夜鹰·····205
点斑鹳·····159
点额织布鸟·····370
虹彩吸蜜鹦鹉·····169
星蜂鸟·····216
钟吸蜜鸟·····331
种鹳·····146
皇苇鹳鸫·····282
皇帝企鹅·····44
皇雁·····75
鬼鹳·····202
须拟啄木·····235
食火鸡·····40
食猴雕·····98
食腐肉乌鸦·····395
哀鹳·····163
亮丝鹳·····280
弯嘴鸫·····140
弯嘴矢嘲鹳·····285
弯嘴林戴胜·····229



洪氏环企鹅·····46
洋红蜂虎·····225
美洲五彩鸟·····232
美洲白冠鸡·····127
美洲吃蜂鸟·····232
美洲红鹳·····69
美洲矶雁·····81
美洲隼·····102
美洲鸵鸟·····38
美洲家朱雀·····363
美洲斯皮孔雀·····339
美洲鹭鱼鹳·····197
冠叫鸭·····70
冠旋蜜鸟·····353
冠蓝鹳·····388
眉纹鹳鸫·····286
绒顶雀·····339

十 画

埃及雁·····76
桂红鸭·····80
桔黄雀鹳·····337
鸢鹳鸫·····283
栗鹳·····194
栗头凤鹳·····299
栗头丽棕鸟·····375
栗头侏秧鸡·····124
栗耳阿拉卡鸫·····236
栗虎鹭·····63
栗背蚁鸟·····249
栗冠弯嘴鹳·····296
栗翅鹰·····96
栗领铁爪鹳·····335
栗颈燕尾·····290



栗鹑鸫	295
夏威夷绿雀	352
鸫形唐纳雀	343
鸫侏儒鸟	258
鸫鹛	56
峭壁霸鹟	256
鹟鹛	315
秧鸡	123
秧鹤	122
笑鸥	150
笑隼	101
笑翠鸟	220
鸵鸟	39
鸳鸯	78
旅鸫	294
高山雨燕	208
高鹫	133
烟卤刺尾雨燕	209
海角喷背鹛	310
海角鸢	50
海鸥	149
流苏鹫	145
粉红凤头鹦鹉	172
粉红琵鹭	70
宽尾树莺	301
家八哥	377
家麻雀	370
家燕	270
扇尾啄果鸟	325
弱夜鹰	206
姬棕啄木	238

十一画

球拍夜鹰	207
彗星蜂鸟	215
桄啄花鸟	325

黄头亚马孙鹦哥	183
黄头金雀	320
黄头黑鹟	356
黄林莺	349
黄垂蜜鸟	333
黄昏蜡嘴雀	365
黄面九官鸟	378
黄冠鹎	273
黄翅澳吸蜜鸟	331
黄翅鹦哥	178
黄胸巨鹟莺	352
黄胸鹟莺	305
黄颈凤鹟	299
黄颈凤鹟	299
黄鹟	334
黄喉地莺	351
黄喉矿鸟	332
黄喉绿鹟	354
黄喉蜂虎	225
黄喉舞雀	340
黄腰白喉林莺	350
黄腰白喉林莺	350
黄腰白喉林莺	350
黄腹比蓝雀	344
黄腹吸汁啄木	240
黄腹绣眼鸟	329
黄腹鹟	274
黄端啄果鸟	326
黄褐森鸫	291
黄鹡鸰	270
黄额补鹭	235
黄额啄木鸟	239
黄嘴山鸦	393
黄嘴牛鹟	379
黄嘴鹟	190
鹟鹛	41
雪鹟	198
雪鹟	335
雪松太平鸟	279
雪雁	74
雪鹭	61
掘穴鹦哥	181
雀鹟鹛	317
眼纹噪鹛	297
眼斑织布鸟	371
眼斑冢雉	105
眼斑蚁鸟	250
眼镜鹟	196
蛎鹑	133
蛇鹫	57
蛇鹭	100
野火鸡	108
野鸡	114
野鸽	159
距翅水雉	131
银耳相思鸟	298
银喉长尾山雀	319
船嘴鹟	315
船嘴鹭	63
领航刺莺	312
领鹟	119
彩鹟	110
彩鹟	132
猛雕	99
旋木雀	324
淡色歌鹰	93
淡顶云扇尾莺	303
淡黑克洛雀	246
深山鹦鹛	185
寄生织布鸟	373
绯红奎利亚雀	371
绯红胸黑伯劳	277
绯红鹟鹛	317
绯红澳鹟	314
绿头鸭	79
绿头唐加拉雀	346
绿色隐蜂鸟	210
绿林戴胜	229



绿金唐加拉雀·····347
绿翅小水鸭····· 79
绿啄木·····243
绿猫鸟·····385
绿旋蜜雀·····347
绿颊咬鹃·····218
绿裸眼鹟·····380

十二画

斑鹑·····308
斑鸠·····161
斑尾林鸽·····160
斑纹比卡雀·····258
斑鱼狗·····220
斑胸草雀·····367
斑姬鹑·····309
斑啄果鸟·····325
斑喉娇莺·····303
斑嘴巨鹙鹳····· 47
斑噪钟鹊·····384
琵鹭····· 69
塔布吸蜜鹦鹉·····170
棕头侏霸鹟·····252
棕曲嘴鹳鹳·····280
棕灶鸟·····246
棕尾刈草鸟·····263
棕尾红雉·····114
棕顶蚁八色鸟·····250
棕岩鹟·····286
棕胁唧鹟·····338
棕柳莺·····304
棕眉胡椒鹟·····353
棕黑歌鹟·····337
棕膝鹟·····141
棕褐蜂鸟·····217
棕翠鸫·····223
棕额扇尾鹟·····316
棕鹳莺·····310
棕鹳鹳·····281
棘尾雷雀·····246
散库鲁冠蕉鹟·····187
喜鹊·····392
葵花凤头鹦鹉·····171
森燕·····383
紫青水鸡·····126
紫顶咬鹃·····219
紫背刺嘴蜂鸟·····215
紫啸鹟·····290
紫崖燕·····269
紫喉果鸦·····262

紫蓝饰雀·····365
紫蓝旋蜜雀·····348
紫蓝鸚鵡·····180
辉蓝细尾鹟莺·····311
喇叭鸟·····122
鹃鸫·····228
景风海燕····· 52
黑白苔莺·····349
黑头红翅伯劳·····277
黑头林鸫鹳·····318
黑头奇鹫·····299
黑头群栖织布鸟·····371
黑头蜡嘴雀·····365
黑色凤头鸚鵡·····171
黑色吸蜜鸚鵡·····169
黑尾蒂泰雀·····258
黑纹胸林莺·····350
黑顶林莺·····305
黑顶嘲鸫·····281
黑枕威尔逊森莺·····352
黑背钟鹊·····384
黑背黑鹟·····357
黑点裸眼雀·····250
黑翅雀鹛·····275
黑翅燕雀·····137
黑鹁·····292
黑铁匠雀·····138
黑胸蜂鸟·····211
黑脊鸥·····149
黑海番鸭····· 83
黑浮鸥·····152
黑菲比霸鹟·····254
黑领噪鹟·····297
黑脸田鸡·····125
黑脸唐纳雀·····342
黑脸黄眉林莺·····349
黑剪嘴鸥·····155
黑颈红卡丁伞鸟·····261
黑琴鸡·····108
黑斑蝗莺·····301
黑颊食蚊鸟·····251
黑喉鹟·····289
黑喉鸫鸦·····390
黑短脚鹛·····274
黑腰朱鹭····· 68
黑腹走雀·····136
黑额尼鹭·····233
黑鹳鸫·····111
锈带窜鸟·····251
锈背蚁鹁····· 49

短耳鸫·····203
短尾鸫·····223
短尾雕····· 93
短尾鹳鹳·····295
短翅水鸡·····127
短翅刺鹰·····312
短嘴鸦·····394
鸫鸫····· 47
鸫鸫拟啄木·····234
猩红比蓝雀·····344
鸫·····97
鲁佩氏鸚鵡·····177
鲁普氏林莺·····306
滑嘴犀鹳·····191
游隼·····105
普通鸫····· 53
寒鸦·····393
装脸水霸鹟·····255
强嘴砍林鸟·····245
缎蓝亭鸟·····385

十三画

槌头鹳····· 65
鹊色唐纳雀·····343
鹊鸭····· 84
鹊鹳····· 72
鹊鹟·····382
蓝孔雀·····116
蓝白细尾鹟莺·····311
蓝头黑鹟·····359
蓝头鸫哥·····182
蓝灰背霸鹟·····254
蓝极乐鸟·····387
蓝尾八色鸟·····264
蓝顶美洲咬鹃·····218





蓝点颊.....287
蓝冠短尾鸬鹚.....178
蓝翅希鹇.....298
蓝翅岭裸鼻雀.....345
蓝胸佛法僧.....226
蓝胸细尾鸬鹚.....311
蓝胸翠鸟.....221
蓝脚鲢鸟.....55
蓝脸吸蜜鸟.....330
蓝颈绿雀.....346
蓝颈鼠鸟.....217
蓝蕉鹇.....186
蓑鹇.....165
蒙面花鸟.....348
鹌鹑.....113
暗冠蓝鸦.....389
蜂鹰.....89
锡嘴雀.....364
矮企鹅.....45
雉鸡.....115
新几内亚鹌鹑.....294
新疆歌鸲.....287
煤山雀.....321



滨石鸻.....135
裸喉钟雀.....263
裸喉鹳.....112

十四画

歌带鹀.....336
歌带鹇.....354
歌鸲.....293
嘈杂薮鸟.....266
鸲.....88
漂泊信天翁.....48
漂鹳.....143
褐矢嘲鸫.....285
褐头牛鹂.....359
褐色小嘴刺莺.....312
褐色刺嘴莺.....313
褐拟鹇.....118
褐隼.....103
褐斑翅蓝彩鹀.....342
褐鹳.....54
翠鸟.....222

十五画

横斑吸蜜鸟.....329
横斑沙鸡.....158
横斑林鹀.....199
横斑梅花雀.....366
橡树啄木鸟.....238
槲鸲.....293
赭红尾鸲.....288
鞍背鸦.....381
蕉森莺.....348
震旦鸦雀.....300
箭尾维达鸟.....369
鹌鹑扇尾鹇.....316
瘤鸲.....73
潜海燕.....52
澳洲燕鸻.....136

十六画

靛蓝彩鹀.....342
橙尾鸬鹚.....351
橙顶杜鸲.....351
橙胸花蜜鸟.....326
橙胸林莺.....350
橙胸姬鹇.....309
橙胸彩鹀.....341
橙胸绿鸲.....166
橙腹木叶鸟.....275
橙腹红梅花雀.....366

橙腹拟黄鹀.....355
燕尾佛法僧.....226
燕尾侏儒鸟.....260
燕鸥.....153
燕隼.....104
髯鸲.....168
噪犀鸟.....230
镜斑王鹇.....315
鲸鸟.....51
鲸头鹳.....64

十七画

樨鸟.....390
戴胜.....228
戴菊鸟.....307
穗鹇.....289
簇山雀.....322
鸬鹚.....295
鸬鹚.....282
鹭鱼鸲.....197
鹭珠鸡.....117

十八画

鞭苔鸬鹚.....237
鹭鸶.....128
镰嘴蜂鸟.....210
镰嘴管舌鸟.....353
翻石鹳.....143
鳍脚鹳.....128
鹰头鹦哥.....184

十九画

攀雀.....320
蟹鸲.....132

二十画

鳞斑地宝鸟.....227
灌丛鸦.....389

二十一画

麝鸭.....86
麝雉.....193